

اعداد وتأليف :  
الدكتور محمد عامر الشيخ يوسف  
إخصائي في علم الأورام  
مركز الطب النووي - دمشق

# المعالجة الكيميائية منذى اقرأ الثقافي السرطان

[www.iqra.ahlamontada.com](http://www.iqra.ahlamontada.com)

منشورات دار علاء الدين



لتحميل أنواع الكتب راجع: (مُنْتَدَى إِقْرَأَ الثَّقَافِي)

براي دائلود کتابهای مختلف مراجعه: (منتدی اقرا الثقافی)

بۆدابه زاندنی جوهرها کتیب: سەردانی: (مُنْتَدَى إِقْرَأَ الثَّقَافِي)

[www.iqra.ahlamontada.com](http://www.iqra.ahlamontada.com)



[www.iqra.ahlamontada.com](http://www.iqra.ahlamontada.com)

للكتب ( کوردی , عربی , فارسی )

الدكتور  
محمد عامر الشيخ يوسف  
أخصائي بمعالجة الأورام  
مركز الطب النووي - دمشق

# المعالجة الكيميائية للسرطان

منشورات دار علاء الدين



**حقوق النشر محفوظة**  
**دمشق / ١٩٩٦ - ١٠٠٠ نسخة**

**التنضيد الضوئي : دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة**  
**الإخراج الفني : ناصر شهاب الدين**

**يطلب الكتاب على العنوان التالي :**

---

**دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة**

**دمشق ص.ب : ٣٠٥٩٨**

**هاتف : ٢٣١٧١٥٨ - ٥٦١٧٠٧١**

**تلكس : ٤١٢٥٤٥ - فاكس : ٢٣١٧١٥٩**

---

**الأفكار الواردة في الكتاب تعبر عن وجهة نظر المؤلف . وفي حال اخذ أية مادة  
من الكتاب يرجى الإشارة إلى المصدر .**

# مقدمة

يأتي اعداد وترجمة هذا الكتاب خلال فترة حرجة لعلم الأورام فالعديد من الباحثين والأطباء الأخصائيين يشعرون بالخيبة عندما يقيمون كمية وكلفة الجهود المبذولة في البحوث السرطانية ويبدو بشكل أوضح الآن أن المعالجة الدوائية للسرطان تشمل معرفة المشاكل الحيوية التي هي أكبر صعوبة وتعقيد مما كانت عليه لذلك يأتي اعداد هذا الكتاب باللغة العربية ليرفد المكتبة الطبية العربية بكتاب اختصاصي جديد والذي يعتبر بالمنظار العالمي من الكتب القلائل التي تتناول المعالجة الكيميائية بهذا الشكل الشامل والعملي .

أخيراً لا بد لنا أن نشكر الدكتور محمد عامر الشيخ يوسف على الجهد الكبير الذي بذله في اعداد وتحضير هذا الكتاب الذي يعتبر الأول من نوعه في المكتبة العربية متناولاً المعالجة الكيميائية للأورام بشكل شامل وعملي ونتمنى له التوفيق في اغناء المكتبة العربية الطبية بكتب جديدة لها صلة بعلم الأورام كما نتمنى أن يجد القارئ والباحث في هذا الكتاب حاجته ومبتغاه مما يوفر عليه البحث في العديد من المراجع المختلفة المبعثرة هنا وهناك توفيراً لجهد ووقته آمليين أن نكون قد نجحنا في ذلك والله ولي التوفيق .

د . نضال اسطفان

الاخصائي في معالجة الأورام

زميل الكلية الملكية البريطانية

# الانس العلمية للمعالجة الكيميائية للسرطان

## Scientific Basis Of Cancer Chemotherapy

### - مقدمة :

إن معظم الأدوية المتوفرة في الوقت الحالي والفعالة ضد الخلية السرطانية ماعدا بعض الاستثناءات النادرة قد اكتشفت مصادفة أثناء اجراء التجارب العلمية فاكشاف الخردل الآزوتي Nitrogen Mustard تم أثناء التجارب التي اجريت على الأسلحة الكيميائية وكذلك / الاكتينوماسين . د / الذي يعتبر ثاني الصادات الحيوية المكتشفة بعد البنسيلين ولكنه لم يستخدم لسميته الشديدة .

---

Agents that damage the DNA template
B. alkylating
Nitrogen mustards: mechlorethamine, cyclophosphamide, melphalan, ifosfamide, chlorambucil.
Nitrosoureas: carmustine (BCNU), lomustine (CCNU), semustine (methylCCNU), streptozocin, chlorozotri-in
Others: thiotepa, hexamethylmelamine, busulfan, dacarbazine, mitomycin C, procarbazine
Al. platinum coordination cross linking: cisplatin, carboplatin
B. double-strand cleavage via topoisomerase II
Antitubotics: doxorubicin, daunorubicin, mitoxantrone, idarubicin, epirubicin, ansacrine
Psychophyllotoxins: etoposide, teniposide
B. intercalation, blocking RNA synthesis: flutrimycin, mithramycin
B. uncertain mechanisms: bleomycin
Spindle poisons
Vinca alkaloids: vincristine, vinblastine, vindesine
Antimetabolites (enzyme inhibitors)
Pseudotate synthase: 5-fluorouracil
5-fluoro-2-deoxyuridine
flouxuridine
Thymidylate reductase: methotrexate
DNA polymerase: cytosine arabinoside (cytarabine)
Ribonucleotide reductase: hydroxyurea
Phosphoribosylpyrophosphate - aminotransferase: 6-mercaptopurine, 6-thioguanine
Adenosine deaminase: deoxycytosine (pentostatin)
Hormonal and antihormonal agents
Hormones: estrogens, androgens, progestins, corticosteroids
Antihormones: tamoxifen, aminoglutethimide, leuprolide, flutamide
Biological response modifiers
Interferons, interleukins, BC G, levamisole
Miscellaneous: Methot GAC, mitolane, asparaginase, prenisinustine, estramustine

---

جدول رقم ١ بين الأدوية الكيميائية المضادة للسرطان

إن أول دواء ناجح وفعال ضد السرطان تم تصنيعه من قبل العالم Heidel Berge هو الفلورويوراسيل 5-Flourouracil وخلال السنوات العديدة من البحوث المتتالية تم اكتشاف العديد من الأدوية ومعظمها كان صلبة والقليل منها تم تصنيعها وكذلك تم تطوير العديد من الأدوية المثبطة للاستقلاب Metabolic Inhibitors وهي أدوية تثبط الخماثر الضرورية لتكوين الحمض النووي الريبي DNA وتعمل على طور تركيب هذا الحمض من دورة حياة الخلية ويعمل على هذا الطور أيضاً مركبات الانثراسيكلين anthracyclin ، أما السيسبلاتين والبليومايسين ومجموعة العوامل المقلونة alkylating agents فإنها تعمل على كل أطوار دورة حياة الخلية .

ولقد اعتقد العلماء أن تسليط الضوء على دورة حياة الخلية وآلية تأثير الدواء سوف يؤدي إلى تأثير قاتل على الخلية أكثر من السابق وإن محاولة إعطاء الدواء بشكل يتزامن مع دورة الحياة الخلية السرطانية لم تعطي النتائج المرجوة منها . ولقد طورت عدة تقنيات لتحديد حساسية الخلية السرطانية للأدوية وبطرق تشابه تلك التي تستخدم لتحديد حساسية البكتريا للصادات وبالرغم من البحوث العديدة لمعايرة حساسية الأورام للأدوية إلا أن هذه الأبحاث لم تلعب دوراً هاماً في المعالجة الكيميائية للسرطان .

إنه ليس من العجيب أن يكون الخردل الآزوتي في اللمفوما و الميثوتركسات في ابيضاضات الدم الخادة من الأدوية التي تؤدي إلى حدوث الهجوع المؤقت إلا أن هذا الانتصار العلاجي أدى إلى حماس كبير عند الباحثين مما دفع بعضهم مثل هيرتز (Hertz) ومساعديه إلى تحقيق الشفاء للسرطانة المشيمية بواسطة دواء وحيد فقط والمراقبة بمعايرة الواسمة الورمية ( BHCG ) وكان هذا المثال الوحيد للمعالجة الكيميائية الشافية حتى تبين تأثير السيسبلاتين على أورام الخلايا المولدة حيث رفع من نسبة شفائها وكان ذلك مثلاً آخر على المعالجة الكيميائية الشافية .

إن معرفتنا الواسعة في حيوية الجزيئات molecular biology أدى إلى إيجاد وتصنيع أدوية تستغل بعض المظاهر الخاصة للعبث مثل antisense polynucleotides التي ترتبط بسلاسل خلوية خاصة ، كما أن تركيب بعض الأدوية التي تعمل على مستقبلات خاصة بها موجودة على غشاء الخلية الخارجي كلها تبشر بالأمل بزيادة نسبة الشفاء في السرطان . إن عجز العلماء والباحثين في إيجاد أدوية ذات نوعية عالية تجاه الخلية السرطانية أدى إلى العودة لاستغلال الفرق في حركية الخلية الطبيعية والخبيثة إذ تنمو الخلية الخبيثة بسرعة كبيرة مما يؤدي تعرضها بشكل أكبر للأذية الناجمة عن الأدوية المضادة للإنقسام .

#### قوانين سكيبر : Skippers Laws

منذ عدة عقود وفي المعهد الجنوبي للبحوث south Research institute انجز سكيبر ومساعدوه عدة تجارب على ابيضاض الدم عند الفئران / L 1210 / أدت إلى إيجاد بعض القوانين الخاصة بالمعالجة الكيميائية والتي لا تزال تستخدم حتى الآن بالرغم من أن التعرف على النمو من نمط كومبيرتس Gompertizan Growth جعل من هذه القوانين أكثر تعقيداً فخلايا L1210 تخضع للنمو الأسّي أو اللوغاريتمي فكل الخلايا تكون في طور الإنقسام ولا يوجد أي خلية في طور الراحة ويتم تضاعف عدد الخلايا بمعدل خاص بالورم وذلك مهم جداً لفهم قوانين سكيبر وللتعرف على الخلايا في طور الراحة إذ أن الخلايا التي تتكاثر هي التي تخضع لهذه القوانين فقط .

القانون الأول ينص على أن زمن التضاعف للخلايا الخبيثة التكاثرية proliferating cells ثابت ويشكل خطأ مستقيماً على المنحني semilog plot ولقد أثبت العالمان فيرث وكان ( Furth , Kahn ) في عام ١٩٣٧ أن خلية واحدة حية تكفي لأن تؤدي لفشل المعالجة كما أثبت سكيبر أن الموت يحدث عند بلوغ عدد الخلايا السرطانية لمستوى عال بالنسبة لوزن الفأر لذلك فإن معدل الحياة مرتبط بعدد خلايا الخبيثة المحقونة في جسم الفأر .



القانون الثاني ينص على أن نسبة الخلايا التي تموت بجرعة دوائية ما ثابتة دون النظر إلى درجة انتشار الورم في الجسم لذلك فإن الدواء الذي يؤدي إلى موت ٩٩ % من الخلايا الورمية سوف يؤدي إلى موت نفس هذه النسبة مهما كان حجم الورم وهذا مخالف لما يحدث في الأدوية المضادة للبكتيريا حيث تلعب وسائل الدفاع في الجسم الدور الأكبر في القضاء على ما تبقى من البكتيريا بينما في حالة الورم فإن دور الوسائل الدفاعية في الجسم ضعيف جداً .

من هذين القانونين يمكن أن نستنتج بطريقة حسابية إمكانية الشفاء في ابيضاض الدم عند الفئران L1210 كما يمكن إثبات إمكانية الشفاء تجريبياً .

#### نمو كومبيرتس Gompertzian Growth :

إن الاختلاف ما بين الخلايا التكاثرية والخلايا غير التكاثرية يشغل الجزء الهام في التأثير العلاجي على الأورام عند الإنسان حيث تبدي هذه الخلايا الورمية نمطاً للنمو مختلفاً عما لاحظته سكير في نمو الخلايا L1210 التي تنمو وفق خط مستقيم بينما تنمو الخلايا الورمية عند الإنسان وفق منحنى يدعى كومبيرتس .

لقد بين العالم تانوك Tannock أنه حتى في الأورام الصغيرة فإن الأكسجين الذي يصل إلى الخلايا بطريق الانتشار غير كاف لتزوية الخلايا الموجودة في المركز مما يؤدي لفقدان الأكسجين وبالتالي بطء في دورة حياة الخلية ودخول بعض الخلايا في المرحلة ( $G_0$ ) غير التكاثرية وكلما تباطأت دورة حياة الخلية كلما فقد قانون سكير قيمته وتصبح الخلية مقاومة للمعالجة الكيميائية بشكل مؤقت .

يأخذ منحنى كومبيرتس للنمو شكل الحرف S ( Sigmoid ) فعدد الخلايا في البداية يزداد بشكل بطيء لقلة عدد الخلايا المنقسمة ثم يلاحظ بعد ذلك أن معدل النمو يصل إلى ذروته عندما يصبح الورم بحجم يعادل ثلث حجمه الأعظمي ثم يتباطئ النمو بشكل تدريجي حتى يصل معدل النمو لحالة استقرار وذلك عندما يكون حجم الورم كافي لقتل المصاب .

- تقدم الورم والمقاومة الدوائية : إن تقدم الورم كعملية حدوث السرطان ينجم عن حدوث الطفرة ولذلك فإن معدل حدوث الطفرة له أهمية أساسية عند دراسة نمو وتقدم الورم وعند مقارنة الخلايا الخبيثة مع الخلايا الطبيعية من حيث معدل حدوث الطفرة فإن الخلايا الورمية تتميز بمعدل أعلى لحدوث الطفرة كما أن الدراسات أثبتت أن الأورام السريعة النمو تترافق بمعدل أعلى لحدوث الطفرات وهذه إحدى الفرضيات التي تفسر حدوث المقاومة للمعالجة الكيميائية بالإضافة لدور التغيرات في سلوك الخلية الورمية وهناك عدة آليات للمقاومة الدوائية منها :

- ١ - نقص في نقل المواد إلى الخلايا ( ميثوتركسات - ميلفالان - سيتارابين ) .
- ٢ - نقص في تفعيل الدواء ( Drug activation ) ميثوتركسات - فلورويوراسيل - ٦- ميركابتوبورين - سيتارابين - ٦- ثيوغوانين ) .
- ٣ - زيادة في ترميم أذية الحمض الريبي النووي DNA : مجموعة alkylating - سيسبلاتين - الصادات المضادة للأورام .
- ٤ - استخدام طرق بديلة كمصدر للمستقبلات عند كون الطرق الأساسية هي المستهدفة من قبل الدواء ( ميثوتركسات - فلورويوراسيل - ٦ ميركابتوبورين - ٦- ثيوغوانين ) .
- ٥ - ازدياد نقل الدواء لخارج الخلية ( Vinka alkaloides - الصادات المضادة للأورام - Etoposide )

٦ - التغير في هدف الدواء Target للاقلال من الارتباط بالدواء Drug binding ( فنكرستين - فلورويوراسيل - هيدروكسي يوريا أدرياميسين ) ويجب أن نؤكد على أن هذه المقاومة الدوائية تختلف عن المقاومة الحركية kinetic Resistance الناجمة عن دورة حياة الخلية فهذه الأخيرة يمكن أن تتراجع عند دخول الخلية بطور حساس من دورة الحياة أو عند دخول الخلايا الموجودة في المرحلة  $G_0$  في دورة الحياة .

إن المقاومة للمعالجة الدوائية عملية منظمة تزداد حدوثاً بازدياد الفترة الزمنية لوجود الورم وبازدياد حجم هذا الورم .

### فرضية كولدي - كولدمان Goldie - Goldman hypothesis :

إن أهم نتيجة لزيادة مقاومة الورم للمعالجة الدوائية بزيادة تقدمه هي أن معظم الخلايا الورمية تمتلك مقاومة للمعالجة الدوائية عند وضع التشخيص .

ولقد تمكن العالمان كولدي وكولدمان من تبيان دور هذه المقولة في معالجة السرطان فإذا فرضنا أن ١٠ غ من الورم يحوي على ١٠<sup>٩</sup> خلية ومعدل حدوث الطفرة هو ١٠<sup>-٦</sup> لكل مورث فإن هذا الورم يحوي على ١٠<sup>٣</sup> خلية مقاومة للدواء المستخدم في المعالجة ومن هنا يمكن أن نتوقع وجود خلايا مقاومة للمعالجة الدوائية حتى في الأورام الصغيرة جداً ولهذا فإن المعالجة بعدة أدوية سوف تكون أكثر فعالية من استخدام دواء وحيد إذ أدى استخدام المشاركة الدوائية إلى شفاء عدة أنواع من السرطانات وخاصة عند الأطفال وشفاء آفات الدم الخبيثة .

### المشاركة الدوائية الكيميائية : Combination Chemotherapy :

قبل وقت طويل من اكتشاف وفهم التطور الورمي تم اكتشاف المشاركة الدوائية تجريبياً وبالصدفة ثم بدأ استخدامها بشكل واسع وأخذت مبادئها بالوضوح تدريجياً وأول هذه المبادئ أن يكون الدواء المستخدم فعالاً إذا استخدم بمفرده وثانيها استخدام أدوية ذات آلية وتأثير مختلفين لتجنب حدوث المقاومة الدوائية أما المبدأ الثالث فهو استخدام أدوية ذات سمية مختلفة ولسوء الحظ فإن معظم الأدوية السرطانية لها سمية متشابهة فمعظمها لها تأثير مثبط على نقي العظم وهذا مايجد من جرعة الدواء فيؤدي لانقاص جرعة الأدوية في المشاركة .

ويجب أن نضيف مبدأ رابعا بعد اكتشاف المقاومة المتعددة للدواء Multiple drug Rrsistance ( M D R ) وهو المشاركة بين الأدوية ذات النمط المختلف للمقاومة الدوائية وأخيراً فإن هناك بعض المبادئ الكيميائية الحيوية التي يجب أن تؤخذ بعين

الاعتبار مثل استغلال معرفتنا بتأثير الـ Leucovorin على تدعيم الرابطة ما بين الفلورويوراسيل ( 5FU ) والهدف الذي يعمل عليه ( حميرة Thymidine synthetase ) .

#### - تركيز الجرعة الدوائية : Dose Intensity :

إن الانحدار الشديد لمنحنى الاستجابة للجرعة Dose - Response curve لمعظم الأدوية المضادة للسرطان يجعل استخدام هذه الأدوية بالجرعة القصوى الممكنة وبأقصر الفترات الفاصلة بينها مهماً جداً وحتى الانقاص البسيط من الجرعة الدوائية يمكن أن يؤدي إلى القلال من تحطم أو موت الخلية الورمية ومن هنا كان التشديد على تركيز العلاج بإعطاء جرعة اسبوعية وسطية خلال فترة العلاج وهناك عدة أمثلة على التوافق ما بين تركيز الجرعة الدوائية ومعدل الاستجابة في السرطانات المتقدمة وأهم هذه الأمثلة نجم عن تحليل نتائج المعالجة الداعمة في سرطان الثدي حيث لوحظ تأثير معدل الحياة بتركيز الجرعة الدوائية ، كما بين العالم Devita أن سبب الاختلاف في معدل الشفاء لمرضى داء هودجكن بين الدراسات المختلفة يعود إلى تركيز الجرعة الدوائية .

لقد تم تطوير عدة تقنيات لزيادة تركيز الجرعة الدوائية في منطقة ما كالحقن داخل السيساء وكذلك الحقن في الشريان الكبدي أو الوريد البائي لزيادة الجرعة الدوائية في معالجة سرطان الكبد أو النقائل الكبدية .

إن تركيز الجرعة الدوائية يزيد من معدل استجابة الورم إلا أنه لا يؤثر على معدل الحياة إلا في حالة حقن الميثوتركسات في السيساء عند المرضى المصابين بابيضاض الدم اللمفاوي الحاد إذ أثبتت الدراسات أنه يزيد معدل الحياة .

#### النقائل المجهرية Micro Metastases :

بات من المعروف أن النقائل المجهرية تحتاج لنفس التركيز العالي للجرعة الدوائية الذي تحتاجه الأورام العيانية ذلك لامكانية وجود خلايا ورمية مقاومة للمعالجة على الرغم من أن نمو هذه النقائل المجهرية سريع ( تأثرها بالمعالجة أكبر ) ومن هنا يأتي

فشل المعالجات المتممة Adjuvant chemotherapy في تحقيق النتائج التي كان من المتوقع أن تحققه نظرياً .

إذا كانت النقائل المجهرية مقاومة للمعالجة الكيميائية كمتأثير الدراسات الحالية فإنه من المهم التخطيط لتجارب سريرية قادمة تفسر هذه المقاومة وتجيّب على بعض الأسئلة الهامة : هل هي مقاومة حركية ؟ أم هي مقاومة وراثية ؟ وهل المقاومة تعود لنقص فعالية المعالجة الدوائية .

#### المعالجة الكيميائية المتممة الحديثة Neo Adjuvant chemotherapy :

للإجابة على السؤال التالي : لماذا تفشل عادة المشاركة الدوائية في شفاء معظم النقائل المجهرية ؟ قام بعض العلماء بتجريب المعالجة المتممة الحديثة وذلك بإعطاء المعالجة الكيميائية قبل العلاج الجراحي الأساسي إذ تؤدي هذه الطريقة إلى نقص متوسط في زمن التضاعف للنقائل المجهرية في المرحلة التي تتكون فيها المقاومة الوراثية . Genetic Resistance

هل هناك فوائد أخرى للمعالجة الكيميائية المتممة الحديثة ؟

لقد لوحظ في دراسات عديدة على حيوانات التجربة أن هناك تراجع مفاجيء في النقائل بعد استئصال الورم البدئي مباشرة فهل يعتبر ذلك من الفوائد الحركية للمعالجة؟

بالنسبة للمعلومات المتوفرة عن السرطان عند الإنسان قليلة ويدور أن هناك مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالمعالجة الكيميائية المتممة الحديثة تحتاج لدراسات سريرية مكثفة للإجابة عليها ولا يوجد أي دليل حتى الآن يشير إلى تأثير هذه المعالجة على معدل الحياة .

#### العوامل المقوية لتأثير المعالجة الكيميائية : potentiators of chemo therapy

إنه من الممكن زيادة موت الخلية الورمية بزيادة تأثير الجرعة الدوائية المستخدمة وهناك عدة أدوية ليست قاتلة للخلية السرطانية وإنما يمكن أن تزيد من فعالية الأدوية

المضادة للسرطان بعدة طرق منها :

- ١ - إدخال الخلية الورمية بطور تكون فيه أكثر حساسية للمعالجة مثل الأندروجين في سرطان البروستات .
- ٢ - تسريع الإنقسام الخلوي بحيث لا يكون هناك وقت كاف لتزيم أذية ال DNA في المرحلة  $G_2$  ( أمين فيلين ) .
- ٣ - إبطال مفعول المقاومة المكتسبة للمعالجة الدوائية ( فيرباميل ) في حالة المقاومة المتعددة للأدوية Multiple Drug Resistance .
- ٤ - التغيير في خصائص الغشاء الخلوي بحيث يسمح بدخول كميات أكبر من الدواء مثل ( amphoteric ineB ) .
- ٥ - تسهيل عمل الجذور الحرة Free Radicals ( misonidazol ) وهناك آليات أخرى غير مفهومة حتى الآن .

**Calcium channel blockers:** (verapamil, diltiazem, flunarizine, amiodarone, nicardipine, nifedipine). There is evidence for a mechanism via P-glycoprotein with reversal of MDR type resistance; however, other mechanisms are likely involved since there is also potentiation of non-MDR drugs such as cisplatin, bleomycin, and 5-FU. Membrane alteration has been suggested. Tamoxifen, vincristine, vinblastine, reserpine, and quinidine have weak calcium channel blocking actions and also potentiate chemotherapeutic agents.

**Calmodulin inhibitors:** (phenothiazines including trifluorpromazine, prochlorperazine, chlorpromazine, and thioridazine; non-phenothiazines including clomipramine, melittin, pimozide, lidocaine, propranolol, prenylamine, polysorbate, and others). There is evidence for a mechanism via reversal of MDR-type resistance but as with calcium channel blockers other factors are involved since non-MDR type drugs are also potentiated. Membrane alteration has been suggested.

**Antifungal agents:** (amphotericin B, ketoconazole and others). This effect involves virtually all agents tested in vitro. The mechanism is probably via membrane alteration with increased cell uptake of cytotoxic agent. Cyclosporin A has weak antifungal activity and also potentiates chemotherapeutic agents.

**Nitroimidazoles:** (metronidazole, misonidazole, and related agents). Virtually all drugs and radiation tested in vitro have been potentiated. The mechanism is complex but probably involves potentiation of damage to anoxic cells as a common denominator. Depletion of glutathione may be involved.

**Glutathione depleting agents:** (butathione sulfoximine, diethyl maleate, acetaminophen, and others). Depletion of glutathione scavenging of free radicals necessary for action of many drugs and radiation is accomplished by binding to glutathione-S-transferase or by direct detoxification of the free radicals. Reduction of glutathione in normal tissue occurs but does not seem to significantly enhance toxicity.

**Methylxanthines:** (caffeine, theobromine, pentoxifylline, theophylline, aminophylline, and others). The mechanism is acceleration of damaged tumor cells through  $G_2$  during which phase damaged cells usually delay entering mitosis so that repair of damaged DNA can take place; if damage is not repaired cell death is more likely. Thus these agents render the so-called nonlethal damage lethal by preventing repair. Some experiments show inconsistent results. The methylxanthine pentoxifylline may improve drug delivery by increasing red blood cell deformability.

**Agents that improve drug delivery:** (glycerol, mannitol, perfluorocarbons such as Fluosol-DA, angiotensin II, and others). The common denominator is increased blood flow with increased drug delivery and presumably better oxygenation.

الجدول رقم ٢ يبين العوامل المقوية لتأثير المعالجة الكيميائية

## الإستراتيجية الحالية للمعالجة الكيميائية :

إن الإستراتيجية الحالية لمعالجة السرطان المتقدم هي إستخدام المشاركات الدوائية وبتكريز عالي للجرعة الدوائية وبشكل مبكر مع إستخدام عدة تقنيات لزيادة تأثير الدواء وهدف المعالجة هو الحصول على المجهوع التام ( Complete Remission ) ثم بعد ذلك تعطى المعالجة الكيميائية لعدة كورسات ونادراً ماتستخدم معالجة الصيانة (Maintenance therapy) إلا في ابيضاض الدم اللمفاوي الحاد .

وفيما يلي بعض المصطلحات المستخدمة في المعالجة الكيميائية :

### ١ - إحداث المجهوع : induction

استخدام المشاركة الدوائية لإحداث المجهوع التام وهو مصطلح يستخدم عادة في أمراض الدم الخبيثة ويمكن أيضاً أن يستخدم في الأورام .

### ٢ - التثقيب : consolidation

وهو إعادة النظام الدوائي المستخدم لإحداث المجهوع في حالة حدوث المجهوع التام ويهدف لزيادة معدل الشفاء أو لإطالة فترة المجهوع .

### ٣ - التكريز : Intnsification

وهو معالجة كيميائية بجرعات عالية لنفس الأدوية المستخدمة لإحداث المجهوع أو بأدوية أخرى ولكن بجرعات عالية ويهدف لزيادة معدل الشفاء أو إطالة فترة المجهوع .

### ٤ - الصيانة : Maintenance

وهي عبارة عن معالجة لفترة زمنية طويلة و بجرعات منخفضة لدواء أو عدة أدوية في حالات المجهوع التام ، بهدف تأخير إعادة النمو للخلايا الورمية المتبقية .

٥ - المعالجة المتعمة أو الداعمة : Adjuvent chemotherapy وهي معالجة لفترة قصيرة و بجرعة عالية وعادة بمشاركة دوائية عندما لا يكون هناك أي دليل سريري أو شعاعي على وجود بقايا ورمية بعد العلاج الموضعي ( جراحة - أشعة ) وتهدف إلى قتل

الخلايا المتبقية المجهرية القليلة .

٦ - المعالجة المتممة الحديثة Neo Adjuvant chemotherapy وهي معالجة متممة تُعطى قبل

العلاج الموضعي .

٧ - المعالجة الكيميائية الأساسية : وهي مرادفة للمعالجة المتممة الحديثة .

٨ - المعالجة اللطيفة : palliative وهي معالجة كيميائية تهدف للسيطرة على الأعراض أو لاطالة الحياة عندما يكون الشفاء مستبعداً .

٩ - الإنقاذ salvage : وهي معالجة بجرعات عالية للمشاركات الدوائية بعد فشل العلاجات الأخرى .

- الاستراتيجيات المستقبلية :

لم يستغل حتى الآن المعرفة الحديثة المكتسبة عن حيوية السرطان ولم تستخدم الأدوية المقوية لتأثير الأدوية المضادة للسرطان ولكن يتم حديثاً تقييم استخدام الجرعات العالية المركزة من الأدوية الكيميائية التي تتطلب زرع نقي العظم .  
إن الزيادة السريعة والواسعة في معرفة المورثات الورمية oncogenes ومنتجاتها يعتبر من الأسس الهامة التي يجب أن تستغل في المعالجة المضادة للسرطان وأخيراً لاتزال الأبحاث مستمرة لاكتشاف عناصر دوائية جديدة تكون فعالة ضد الأورام كفعالية السيسيلاتين ضد أورام الخلايا المولدة .



## مبادئ علم الأدوية والحرائك الدوائية

إن الإستخدام الفعال للمعالجة الكيميائية يتطلب معرفة شاملة للخصائص الدوائية والخصائص الورم الخيوية و الفهم الدقيق للسير الطبيعي للسرطان مع الشرح الوافي لعائلة المريض عن أهداف المعالجة إختلاطاتها .

إن إنتقاء النظام العلاجي يتعلق بعدة عوامل منها الخبرة السريرية والفهم الجيد للخصائص الدوائية للأدوية المستخدمة وإختلاطات هذه الأدوية ، والحالة العامة للمريض وطريقة إعطاء الدواء وهي من العوامل المهمة جداً التي قد تؤدي إلى الإقلال من فعالية الدواء ( نقص امتصاص الدواء عن طريق الفم ) .


### آليات عمل الأدوية : General Mechanisms of Drug Action

١ - النقل عبر الغشاء الخلوي : Membrane transport

إن من المتطلبات الهامة لعمل الدواء هي وجود تركيز كافي من الدواء في مكان عمله ( Target ) وهذا يعتمد بشكل كبير على جريان الدم في سرير الورم والخصائص الحلولية للدواء في الأنسجة ويمكن أن يتأثر أيضاً بمدى ارتباط الدواء ببروتين البلازما وبالنسبة لإعطاء الدواء عن طريق الفم فإن عمله يتأثر بمدى امتصاصه من الأمعاء . ولكي يكون هناك تأثير قاتل للخلايا فإن معظم الأدوية المضادة للسرطان يجب أن تدخل إلى الخلية فيما عدا دواء الـ L - asparaginase وهو عبارة عن أنزيم يثبط نمو الخلايا بواسطة زيادة في ضياع الـ L - Asparagine .

وهناك عدة آليات يمكن للدواء من خلالها أن يعبر الغشاء البلازمي للخلية مثل الإنتشار المنفعل ( passive diffusion ) والنقل الفعال ( active transport ) بالنسبة للإنتشار الإيجابي وعبور الدواء من الغشاء الخلوي فإنه يتعلق بقابلية الانحلال بالدهن وحجم جزيئة الدواء .

وإذا كان تركيز الدواء خارج الخلية ثابتاً فإن تراكم الدواء داخل الخلية سوف



شكل رقم ١ بين الخطوات اللازمة لعمل الدواء

يستمر حتى يصبح معدل دخول الدواء إلى الخلية يعادل معدل خروجه منها وعند هذه النقطة يحدث التوازن الديناميكي إذ يتعادل تركيز الدواء داخل وخارج الخلية .  
إن من أهم خصائص الانتشار المنفعل إنه عملية غير مستقرة أي أنه كلما زاد تركيز الدواء خارج الخلية كلما زاد تدفق الدواء إلى داخل الخلية وبالتالي يمكن

الحصول على تركيز عالي للدواء داخل الخلية ولكن الانتشار المنفعل يبقى غير فعال وغير نوعي على الرغم من أنه قد يكون مهماً جداً عند النقل بواسطة الوسائط الحاملة ( carrier mediate ) كما يحدث في بعض حالات المقاومة الدوائية ضد الميثوتريكسات .

النقل بواسطة الوسيط الحامل ( carrier mediate transport ) تختلف عن الانتشار المنفعل بأنها تتميز بنوعية عالية ومستقرة على التركيز العالي خارج الخلية وتحتاج لوجود حامل وسيط في الغشاء البلازمي وعند ما تحتل جميع المستقبلات الموجودة في هذا الغشاء فإن استمرار تدفق الدواء يتوقف ما لم يبدأ عمل الانتشار المنفعل .

إن أهمية حركة الدواء عبر الغشاء الخلوي بالنسبة للتأثير الدوائي لهذا الدواء يتعلق بعدة عوامل منها معدل أو تركيز الدواء في الأنسجة فعالية عملية نقل الدواء لدخل الخلية ، والحوادث الكيميائية داخل الخلية الضرورية لعمل الدواء .

#### التفعيل داخل الخلية Intracellular Activation :

إن الكثير من الأدوية السرطانية تحتاج لتنشيط داخل الخلية قبل أن تستطيع أن تقوم بتأثيرها الدوائي القاتل للخلايا .

Drug	Site of
Antimetabolites	Activation
Methotrexate	Tumor cells
5 - Fluorouracil	Tumor cells
Cytosine arabinoside	Tumor cells
6 - Thioguanine	Tumor cells
6 - Mercaptopurine	Tumor cells
Alkylating Agents	
Cisplatin	Tumor cells
Cyclophosphamide	Liver

جدول رقم ٣ يبين تفعيل الأدوية داخل الخلية

عملية التنشيط قد تحدث بتفاعلات كيميائية أو أنزيمائية سواء داخل الخلية السليمة أو الخبيثة فمثلاً السيسبلاتين يتفاعل كيميائياً مع جزيء الماء داخل الخلية وينتج عن ذلك

جزيئات إيجابية الشحنة التي تهاجم الـ DNA أما تنشيط السيكلو فوسفاميد فإنه يكون بواسطة الأنزيمات الكبدية مع تحرر الجزيئات المقلونة alkylating species للدوران الجهازي .

إن التنشيط داخل الخلية بواسطة الخلايا الورمية يعتبر من الشروط المهمة اللازمة لإحداث التأثير الدوائي ، لكل مجموعة الأدوية المضادة للاستقلاب (antimetabolites) مثل cytosin arabinoside ، الفلورويوراسيل ومركبات البيورين ( ميركابتوبورين و ٦ - ثيوغوانين ) وكلها تحتاج للخضوع لعملية الـ ( phosphorylation ) لتشكيل النيكليوتيدات الفعالة التي تؤدي للتأثير الدوائي القاتل للخلايا وبالرغم ان الميثوتركسات من المثبطات للأنزيمات فإنه يحتاج لأن يتحول إلى ( polyglutamate ) ليزيد من تأثيره الدوائي ومن إرتباطه ببعض الأنزيمات .

إن عملية تفعيل الدواء داخل الخلية تتعلق بعدة عوامل منها معدل تدفق الدواء عبر الغشاء الخلوي ومعدل تحطم الدواء الفعال بالأنزيمات .

**تفاعلات الدواء مع الأهداف داخل الخلية Drug interaction with intra cellular targets :**

إن تصنيف الأدوية السرطانية يعتمد على آلية عملها أو على منشأها إلا أنها يمكن أن تصنف حسب الأهداف التي تعمل عليها إذ أن هناك خمسة أهداف داخل الخلايا يمكن أن تعمل عليها الأدوية وهي :

الأمحاض النووية - الأنزيمات - الأغشية الخلوية - الأنابيب الدقيقة ( Microtubules ) ، وأخيراً مستقبلات الهرمونات وعوامل النمو ( Hormon / growth Factor receptors ) .

بالنسبة للأمحاض النووية فإن الـ DNA يمكن أن يستهدف أكثر من الـ RNA وهناك عدة آليات يمكن من خلالها أن يرتبط الدواء بالـ DNA أشيعها عملية المقلونة alkylating لمواضع الـ nucleophilic في السرة المضاعفة Double Helix ، معظم الأدوية من مجموعة ( العوامل المقلونة alkylating agents ) تستطيع أن تنتج شاردة الكاربون

التي ترتبط مع المواقع السلبية في الـ DNA مثل ( O6 أو N7 ) من الغوانين *guanine* .  
أما الآلية الثانية التي يتم بها إرتباط الدواء بالحموض النووية هي الاقحام *intercalation* وذلك باقحام حلقة خطية بين النيكليوتيدات المتجاورة وهذه العملية مميزة للعديد من الصادات الحيوية المضادة للأورام والدراسات الحديثة تشير على أن معظم هذه الصادات مثل ( أدرياميسين ) يمكن أن تثبط أنظيم ( *topoisomerase II* ) وتؤدي لتحطيم سلاسل الـ DNA .

الآلية الثالثة لتأذي الحموض النووية بالدواء يمكن ايضاحها بدراسة دواء البيلومايسين حيث يقحم البيبتيد النهائي منه بين الغوانين والسيروزين والبيبتيد في الطرف المعاكس يقوم بارجاع جزيء الأوكسجين إلى *Superoxide* أو جذر الهيدروكسيل والتي تؤدي إلى تحطم الـ DNA أيضاً .

يمكن أن تكون الأنزيمات أيضاً أهداف تعمل عليها الأدوية المضادة للسرطان . فالأدوية المضادة للاستقلاب تثبط الأنزيمات التي تؤدي لتركيب البيورين *purine* أو تثبط حميرة *DNA polymerase* ولأن معظم هذه الأنزيمات تكون نشطة في مرحلة تركيب الـ DNA فإن الأدوية المضادة للاستقلاب تكون فعالة عندما تكون بتركيز عالي وفي مرحلة S من دورة حياة الخلية .

أما الهدف الثالث الذي تعمل عليه الأدوية الكيميائية فهو التراكيب المغزلية الأنبوبية الدقيقة وخاصة مجموعة الـ *Vinka alkaloid* ( الفنكرستين *Vincristine* و الفنبلاستين *Vinblastine* ) يتم تأثيرها الدوائي القاتل للخلايا بارتباطها مع مواقع خاصة من الـ *tubulin* وتثبط تحوله إلى الأنابيب الدقيقة وبالنهاية تؤدي لانحلال التراكيب المغزلية المنقسمة *Mitotic spindle structures* أما التاكسول وهو من القلويدات النباتية *plant alkaloid* فيثبط الإنقسام الخلوي بواسطة تقوية تشكل الأنابيب الدقيقة *micro tubules* وزيادة تشكل *tubulin* .

إن البحث عن مثبطات نوعية للورم أو لمستقبلات عوامل النمو يتبوأ مكانة خاصة

ومهمة منذ اكتشاف تأثير الأدوية المضادة للأستروجين في سرطان الثدي في حال كون مستقبلات الأستروجين إيجابية وكذلك فإن استخدام دواء الـ Flutamide في معالجة سرطان البروستات وبعد توفر المعلومات الكافية عن خاصية تنظيمه لنمو الببتيدات الناجمة عن المورث الورمي onco gene ومستقبلاتها الخلوية ، أخذ هذا الدواء يزداد أهمية في المعالجة الكيميائية الحديثة .

### ترميم الأذيات الخلوية الناجمة عن الدواء :

إن الخلايا التي تعرضت للأذية بواسطة الدواء غالباً ما يكون لديها القدرة على ترميم هذه الأذية وبآليات متنوعة وإن تأثير الدواء القاتل للخلايا يمثل التوازن ما بين الأذية وترميمها وفي حالة زيادة الترميم فقد يكون ذلك أحد آليات مقاومة الخلية للدواء .

كما أن بعض الخلايا قد تحوي على أنزيمات يمكن أن ترمم الأذية في الـ DNA فمثلاً بروتين D6-alkyl thioguanine transferase الذي يرمم أذية الـ DNA الناجمة عن nitrosourea فالخلايا الخاوية على كميات كبيرة من هذا البروتين تكون مقاومة نسبياً لهذا الدواء وتحوي الخلايا أيضاً على جذور حرة يمكن أن تحميها من الأذية الناجمة عن الأشعة والأدوية مثل ( البيلومايسين ) الأنتراسيكلين التي تؤدي لإنتاج جذور الأوكسجين الحرة داخل الخلية وأخيراً يمكن للخلية أن تقلل من تأثير الدواء بزيادة إنتاج الأنزيمات التي تعمل عليها هذه الأدوية ، فلقد لوحظ تجريبياً أن التعرض للمثوتركسات أو الفلورويواسيل يزيد من إنتاج حمض ثنائي الفوسفات Dihydrofolate reductase و thymidylate synthase .

### مبادئ الحرائك الدوائية Principle of pharmacokinetics :

الحرائك الدوائية : هي دراسة خصائص الدواء من ناحية الامتصاص والتوزيع والاستقلاب والإفراز وتصفية الدواء وإزالة الدواء من الجسم تشابه تصفية الكرياتين وهي من الناحية السريرية العملية لا تحسب مباشرة وإنما تحسب وفق المعادلة التالية :

$$\text{التصفية ( clearance )} = \frac{\text{الجرعة Dose}}{\text{Auc}}$$

حيث Auc : area under concent ration-time curve وهي تمثل التعرض الكلي للدواء خلال زمن ما وهي مقياس هام للحرائك الدوائية ودراسة ديناميكية الدواء .

في حال إعطاء الدواء بالثريب الوريدي المستمر وعند الوصول لحالة الإستقرار

$$\text{التصفية ( clearance )} = \frac{\text{معدل التريب infusion rate}}{\text{C}_{ss}}$$

حيث  $C_{ss}$  هي تركيز الدواء في البلازما . ويمكن اعتبار تصفية الدواء كوظيفة لتوزيع

الدواء وإزالته من الجسم وفق المعادلة :  $\text{clearance} = VK$

حيث K هو ثابت الإزالة ( Elimination ) و V هو حجم السوائل التي حلت بها جرعة الدواء ولذلك كلما زاد حجم V قل تركيز الدواء البدني و K يتناسب عكساً مع نصف العمر وهو الفترة الزمنية اللازمة لبطوط تركيز الدواء في البلازما إلى ٥٠٪ من قيمتها الأولية وعندما يكون نصف العمر قصيراً فإن قيمة K سوف ترتفع ويتناقص بسرعة تركيز الدواء في البلازما .

#### النمط الخطي لحركية الدواء : Linear pharmacokinetic Model

بالرغم من أن تحاليل حركية الدواء يمكن أن تتم دون النجوء لأي طريقة حسابية إلا أن استخدام الطرق الحسابية يمكن أن يكون مؤشراً مساعداً في إتخاذ القرار العلاجي .

هناك العديد من الخصائص الدوائية ذات الحركية الخطية linear pharmacokinetics

ومفتاح هذا النمط الخطي من الحركية الدوائية هو المعادلة الثانية :

$$\frac{dc}{dt} = Kc$$

حيث c تركيز الدواء K ثابت الإزالة t الزمن والنسبة  $\frac{dc}{dt}$  معدل التغير في تركيز الدواء وهذا يعني أن التغير في تركيز الدواء يعتمد على التركيز الحالي فقط للدواء

ونصف العمر سوف يبقى ثابتاً مهماً كان تركيز الدواء عالياً وإن أحد استخدامات هذا المبدأ وهو أن التعرض للدواء ( Drug exposuer ) لا يتأثر بطريقة إعطاء الدواء Drug schedule فمثلاً الـ ( AUC ) بعد ٦٠ ملغ / م ٢ دفعة واحدة من الأديرياميسين تعادل القيمة الكلية لـ ( AUC ) لإعطاء ٣ جرعات يومية أو إسبوعية من ٢٠ ملغ / م ٢ لنفس الدواء والتي تعادل أيضاً الـ AUC لنفس الجرعة ( ٦٠ ملغ / م ٢ ) بتثريب وريدي خلال ٩٦ ساعة .

### النمط غير الخطي للحركية الدوائية nonlinear pharmacokinetics Model :

الحركية الدوائية غير الخطية تشير إلى أن سلوك الحركية الدوائية مستقر وبالمقارنة مع النمط الخطي للحركية الدوائية فإن أي تغير في طريقة إعطاء الدواء قد يؤدي إلى تأثير واضح على الـ AUC .

تحدث عادة الحركية الدوائية غير الخطية عندما يكون هناك استقرار في طرق إستقلاب الدواء الرئيسية وهذا يؤدي إلى نقص تصفية الدواء في الجرعات العالية أكثر من الأزددياد المتناسب للـ AUC ويزداد الـ AUC أيضاً عندما تقل فترة التثريب الوريدي ، وينجم ذلك عن التصفية البطيئة عند وصول تركيز الدواء في البلازما إلى ذروته وهذا مانشاهده كثيراً في الفلورويوراسيل وربما يعود إلى الإستقرار في انقلابه إلى الديهدروفلورويوراسيل Dihydro flourouracil بواسطة أنظيم Dihydrouracil Dehydro genase ولقد لاحظ العالم Schaaf أن مضاعفة جرعة الفلورويوراسيل من ٧,٥ ملغ إلى ١٥ ملغ / كغ ( وريدي ودفعة واحدة ) يزيد الـ AUC بنسبة ١٣٥٪ ولهذه الخاصة غير الخطية في الحركية الدوائية التي يتمتع بها الفلورويوراسيل فإنه كثير الإستخدام بطرق علاجية متنوعة .

وبالمقابل فإذا كان إمتصاص الدواء ( أو إعادة امتصاصه من الأنابيب الكلوية مستقراً ففي هذه الحالة زيادة جرعة الدواء تؤدي إلى زيادة أقل من الزيادة النسبية في AUC وهناك أمثلة عديدة للأدوية المضادة للسرطان ذات الحركية المستقرة فالميليفالان



Mclphalan يمتص من الجهاز الهضمي وكذلك السيسبلائين الذي يتميز باستقرار في إعادة إمتصاصه من الأنابيب الكلوية .

**تبدلات حركية الدواء داخل جسم المريض interpatient pharmacokinetics variability :**

إن التبدلات في حركية الدواء داخل جسم المريض قد تنجم عن إختلافات وراثية في إستقلاب الدواء أو عن إضطرابات مكتسبة كما أن مريض السرطان قد يعاني من إضطرابات في وظائف الكبد والكلية بالإضافة لتشوهات أخرى قد تؤثر على حركية الدواء ولقد لوحظ أن الإضطرابات في حركية الدواء الناجمة عن أسباب وراثية تترافق بازدياد خطر الإصابة ببعض الأمراض الخبيثة .

إن الفهم الدقيق للتبدلات في الحركية الدوائية التي تحدث داخل جسم المريض له أهمية كبيرة في إختيار العلاج المثالي المضاد للسرطان والتبدلات بامتصاص الدواء يمكن إهمالها في حالة تناول الدواء عن طريق الفم بالرغم من أن هناك أدوية عديدة تستخدم فموياً مثل الكلورامبيوسيل chlorambucil المستخدم في علاج ابيضاض الدم اللمفاوي المزمن والميلفالن Mclphalan المستخدم في ورم النقي المتعدد .

أما التغيرات في توزيع الدواء Durg Distribution قد تنجم عن تبدلات في حجم الجسم أو بتغير النسبة ما بين الشحوم وكتلة الجسم كاملة وهذه الحالة الأخيرة قد تؤثر على توزيع الأدوية المنحلة في الدسم والتي تشمل كل مضادات السرطان الطبيعية ومشتقاتها وأكثر حالات التغير في التوزيع مشاهدة هي تأخر تصفية الميثوتركسات الناجم عن تراكم الدواء في سائل الحبن أو انصباب الجنب .

إن الكثير من مرض السرطان يعانون من اضطراب في وظائف الكبد أو من نقائل كبدية التي تترافق عادة مع سوء التغذية ومن المعروف أن كثير من الأدوية المضادة للسرطان تستقلب أو تفرز بواسطة الكبد وكل هذه العوامل يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار عند اختيار العلاج الكيميائي وعند اختيار الجرعة الدوائية إلا أن اضطراب

إستقلاب الدواء في الكبد من الصعب أن تتوقعه فبعض المرض الذين لا يعانون من ارتفاع البيليروبين ولكن هناك إنخفاض في الألبومين في المصل يمكن أن يتعرضوا لزيادة في سمية الدواء نظراً لنقص في إزالته بواسطة الكبد لذلك فإن علاج هؤلاء المرضى يجب أن يكون بجرعات أقل للأدوية التي تستقلب في الكبد لتجنب السمية الزائدة ، بالمقابل فإن اضطراب وظائف الكلى يترافق بزيادة تصفية الدواء بواسطة الكلى وهذا مثبت خاصة في الكاربوبلاين حيث تتناسب تصفية الدواء الكلوية مع مستوى الكرياتين وبالتالي يمكن تعديل جرعة الدواء وفقاً لذلك .

#### فرضية نورثون - سيمون The Northon - Simon hypothesis :

في كثير من الأحيان يعتمد علم الأورام على ظاهرة التراجع في حجم الورم كاستجابة للمعالجة الكيميائية المضادة للسرطان وقد تكون هذه الاستجابة في بعض الحالات النادرة الكبيرة بحيث نصل للهجوع التام ( وقد يكون مكافئاً لشفاء ) إلا أنه في غالب الأحيان يكون الهجوع غير تام في الدرجة و المدة مؤدياً إلى تحسن الأعراض وإطالة أمد الحياة . ولقد دأب العلماء في السنوات الأخيرة بإجراء الأبحاث لمعرفة كيفية حدوث هذا الهجوع وكيفية حدوث الإستجابة للمعالجة الكيميائية وفي عام ١٩٧٠ وفي المعهد الوطني للسرطان National cancer institute طور العالمان سيمون ونورثون اسلوباً حسابياً لنمو الورم وتراجعته معتمدين على النمط الأسّي في النمو ( Skipper - schabel model ) بالنسبة للإبيضاض وعلى نمط كومبيرتس للنمو بالنسبة لباقي الأورام ولقد تمكن العالمان سيمون ونورثون من إيجاد تفسير لفشل المعالجة الكيميائية في إحداث الشفاء وإيجاد حججاً على أفضلية إعطاء المعالجة الكيميائية لإحداث الهجوع ثم تكثيف هذه المعالجة بعد الوصول للهجوع التام .

#### نمط سكيبر - سكايل The Skipper - Schable Model :

إن أول مفهوم أساسي لنمط النمو الورمي وطريقة الإستجابة للمعالجة الكيميائية كان النمط اللوغارمي لموت الخلايا ( log - kill model ) الذي طور بواسطة العالمان

سكبير وسكايل وهذا النمط يتمتع بأهمية تاريخية كبيرة ويعتمد على ملاحظة أن خلايا الإيبضاض / L1210 / في الفتران تنمو وفق علاقة أسية منذ فترة الزرع وحتى وفاة الفأر وفي هذا النمط من النمو لا تتغير كثيراً مقادير النمو وزمن الدورة ( cycle time ) بنمو الورم. مما يؤدي إلى زمن تضاعف ثابت غير معتمد على الحجم الأولي للورم . لنفرض مثلاً أن الزمن اللازم لـ  $10^6$  خلية لتصبح  $200$  خلية هو  $11$  ساعة فإن الزمن اللازم لتحويل  $10^6$  خلية إلى  $2000$  خلية هو  $11$  ساعة أيضاً وهذا المبدأ صحيح بالنسبة إلى أي زيادة ثابتة أي أنه إذا كان الزمن اللازم لتحويل  $10^6$  خلية إلى  $10^7$  خلية هو  $40$  ساعة فإن الزمن اللازم لتحويل  $10^7$  خلية إلى  $10^8$  خلية هو  $40$  ساعة أيضاً وعندما يعالج ورم ينمو وفق هذا النمط بالمعالجة الكيميائية فإن الخلايا التي تقتل بهذه المعالجة هي واحدة وليست لها علاقة مع حجم الورم البدئي يعني أنه إذا أدت جرعة ما إلى اقلال عدد الخلايا الورمية من  $10^7$  إلى  $10^6$  فإن هذه الجرعة سوف تؤدي لاقلال عدد الخلايا من  $10^8$  إلى  $10^7$  وكل من هذه المثالين يمثل النمط اللوغاريتمي لموت الخلايا الذي يعني (  $90\%$  ) نقص في عدد الخلايا وفي معظم الأدوية السرطانية فإن زيادة الجرعة سوف يؤدي لزيادة في موت الخلايا بالإضافة إلى أن استخدام أكثر من دواء سوف يؤدي لتضاعف عدد الخلايا الميتة . مثال : إذا كانت جرعة ما لدواء ( أ ) تؤدي لإنقاص عدد الخلايا لـ  $90\%$  وجرعة مامن الدواء ( ب ) تؤدي لإنقاص عدد الخلايا لـ  $90\%$  ، فإن الدوائين أ و ب سوف يؤديان لقتل  $90\%$  من الـ  $90\%$  أي  $99\%$  من الخلايا وهذا يعني أنه إذا استخدمت عدة أدوية بجرعات كافية في سرطان صغير الحجم فإن عدد الخلايا المتبقية سوف يكون ضئيلاً وبالتالي لزيادة امكانية الشفاء .

ويبدو من الضروري جداً اختبار النتائج المذكورة سابقاً كما فعل سكبير وذلك من خلال التجارب السريرية وإن استخدام المعالجة المتممة الكيميائية Adjuvant

chemotherapy عند المريضات بسرطان الثدي وفي حال وجود عقد إبطيه مصابة يعتبر مثلاً جيداً فمنذ عام ١٩٦٠ أثبت العالم Green span أن المعالجة بالمشاركة الدوائية يمكن أن تؤدي لتراجع الكثير من الحالات المتقدمة لسرطان الثدي وكان أفضل هذه المشاركات دراسة هي CMF ( سيكلو فوسفاميد - ميثوتركسات - فلوروراسيل ) مع أو بدون الفينكسيتين والبريدنيزون هذه المشاركة اكتشفت من قبل العالم COOPER وأدى استخدامها إلى تراجع ٣٤ - ٦٨ ٪ من حالات سرطان الثدي المتقدمة وإلى هجوع تام في ٣ - ١٩ ٪ من الحالات وهذه الاستجابة استمرت لـ ٦ - ١١ شهر .

في سرطان الثدي مرحلة أولى ومرحلة ثانية ، إذا تم استئصال الورم البدئي والعقد الإبطية إما بالجراحة أو الجراحة والأشعة معاً وكانت كل الفحوص الشعاعية والسريية تشير إلى عدم وجود أي بقايا أو نقائل ورمية ولكن بالمتابعة لفترات زمنية طويلة وجد أنه المريضات اللاتي عولجن فقط بالاستئصال الجراحي دون المعالجة الكيميائية ٣٠ ٪ منهن فقط تماثلن للشفاء و ٧٠ ٪ من الحالات كان هناك نقائل مجهرية والتي سوف تتظاهر سريراً إذا تركت دون معالجة وكانت المشاركة الدوائية CMF هي من أول المشاركات التي إستخدمت لمعالجة الحالات المبكرة من سرطان الثدي وساهمت هذه المشاركة في زيادة فترة الهجوع التام وفي زيادة معدل الحياة ففي الدراسة التي أجريت في ميلان كان معدل الحياة لـ ١٠ سنوات ٤ و ٣١ ٪ في الحالات التي لم تعالج بالمعالجة الكيميائية الداعمة بينما كان معدل الحياة لـ ١٠ سنوات ٤ و ٤٣ ٪ عند المعالجات بال CMF ولمدة سنة كاملة .

المشاركة CMF إذا أثبتت فعاليتها ولكن كان من المتوقع أن تكون هذه المشاركة أكثر فعالية أي أن هناك اختلاف ما بين النظرية والخبرة التجريبية سبب هذا الاختلاف قد يكون إيقاف المعالجة المبكر أما السبب الآخر لفشل المعالجة هو أن بعض الخلايا قد تكون مقاومة للأدوية المستخدمة في المشاركة والشفاء الحقيقي لا يمكن حدوثه إلا بغياب الخلايا المقاومة للمعالجة وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هو بدء المعالجة باكراً

عندما يكون حجم الورم صغيراً جداً وربما في بدء التحول للبحث حيث تكون الخلايا في هذه المرحلة حساسة جداً للمعالجة أما المقاومة فتحدث فيما بعد من هذا المفهوم السابق يبرز سؤلان هامان :

١ - كيف نتمكن من تشخيص الورم بشكل مبكر لكي يعالج ويكون الشفاء ممكناً ؟

٢ - في أي وقت تحدث المقاومة الدوائية خلال نمو الورم ؟

حركية الخلية الورمية Tumor cellular Kinetics :

بعد حدوث الإنقسام مباشرة فإن الخلية الناجمة إما أن تكون بالمرحلة  $G_1$  أو بالمرحلة  $G_0$  وفي هذه الحالة وفي حال غياب الإضطرابات الوراثية فإن الخلية الجسمية الطبيعية تحوي على العدد المضاعف من الصبغيات  $2N$  ويمكن لهذه الخلية أن تدخل في المستقبل في مرحلة تركيب الـ DNA أما إذا لم تدخل في هذه المرحلة فإنها تعتبر في المرحلة  $G_0$  .

مرحلة تركيب الحمض النووي S تستمر من ١٢ - ٢٤ ساعة وفيها يجب أن يتضاعف الـ DNA الموجود في الخلية من  $2N$  إلى  $4N$  وبالرغم من وجود بعض الخلايا في حالة الراحة في هذه المرحلة وتدعى (  $S_0$  ) ويكون محتوى هذه الخلايا من الـ DNA ما بين  $2N$  و  $4N$  .

وعندما يتضاعف عدد الصبغيات فإن معدل تركيب DNA يبدأ بالتناقص بشكل كبير وتدخل الخلية في المرحلة التالية وهي  $G_2$  والتي تنتهي بمرحلة الإنقسام M وهي المرحلة الأقل مدة في دورة حياة الخلية حيث تستمر ساعة واحدة أما دورة حياة الخلية تتراوح ما بين ٢ - ٤ أيام .

بعد الإنقسام تواجه الخلية ثلاث احتمالات الأول الدخول بدورة إنقسام أخرى أي بالمرحلة  $G_1$  وتعتبر من الخلايا التكاثرية في هذه الحالة .

في حالة الأورام الخبيثة ٥ - ٢٠% من الخلايا تكون في المرحلة S في أي وقت من نمو الورم أما الخلايا التكاثرية فتشكل ٢٠ - ٣٠% .

الإحتمال الثاني هو دخول الخلية بالمرحلة  $G_0$  أي الخلايا غير التكاثرية وهي خلايا لا تنقسم على الرغم من وجود إمكانية لدخولها في دورة الانقسام في حال وجود التنبيه المناسب ( مثل إستخدام الإستروجين في حالة سرطان الثدي ) اما الإحتمال الثالث ، فهو موت الخلية .

#### المقاومة للمعالجة الدوائية Drug Resistance :

إن أول دواء له تأثير دوائي ضد بعض الأمراض الخبيثة تم إكتشافه واستخدامه سريرياً بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ورغم أنه إعتبر بداية المعالجة الكيميائية إلا أنه كان هناك حالات من المصحوع السريري ولوحظ أيضاً أنه غالباً ماينكس الورم ويصبح غير مستجيباً للمعالجة الكيميائية .

خلال الخمسينات استطاع عدد من الباحثين إثبات بعض التبدلات الكيميائية الحيوية في الخلايا المقاومة للمعالجة كسوء النقل عبر الغشاء الخلوي أو تغير في الهدف داخل الخلية الذي يعمل عليه الدواء كما أثبتت الدراسات حديثاً أنه يمكن لأي دواء مضاد للسرطان أن تشكل ضده المقاومة من قبل الأنواع المختلفة للسرطان وتعتبر المقاومة للدواء أحد التحديات الأساسية التي تواجه إيجاد معالجة كيميائية شافية .

#### الأسس البيولوجية للمقاومة الدوائية biological Basis of drug Resistance :

إن من المناسب أن تتساءل عن المنشأ الحيوي للمقاومة الدوائية ولماذا تتشارك بشكل دائم تقريباً مع الحالة الورمية ، ولقد ظل المنشأ الحيوي لمقاومة الجراثيم للصادات مصدراً للجدل والنقاش حتى جاءت الدراسة التجريبية للعالمين لوريا وديلبورك Luria and Delburg حيث أثبتا أن المقاومة في الجراثيم تنشأ عن الطفرة ولقد أثبت العالم Law أيضاً أن الخلايا للمقاومة الخبيثة المزروعة في الفأر لها القدرة على إيجاد مقاومة ضد دواء الميثوتركسات كما توفرت حديثاً عدة أدلة على أن منشأ هذه المقاومة هووراثي وينجم عن الطفرة Mutation .

## المقاومة الدوائية الناجمة عن حركية الخلية :

بالإضافة للمقاومة الوراثية فإن الخلية يمكن أن تكون أقل حساسية للدواء في موقع مامن دورة إنقسامها ففي حالة الدواء الذي يعمل على مرحلة محددة من دورة حياة الخلية مثل مرحلة تركيب الـ DNA فإنه يمكن للخلية ألا تتأثر بالمعالجة الدوائية إذ لم تدخل في مرحلة تركيب الـ DNA خلال فترة التعرض للدواء وأكثر من ذلك فإن الخلية التي تكون في المرحلة  $G_0$  فإنها قد لا تتأثر بكثير من الأدوية المضادة للسرطان ويطلق على هذه الحالات المذكورة السابقة المقاومة الحركية Kinetic Resistance ، ولكنها ظاهرة مؤقتة بشكل عام فإذا استمر تركيز الدواء عالياً لفترة طويلة فعندئذ يمكن أن تمر كل الخلايا بالمرحلة التي يعمل عليها الدواء وبالتالي تتعرض لتأثيره وكذلك الخلايا في المرحلة  $G_0$  يمكن أن تتعرض لمنبه يدخلها في دورة الإنقسام وبالتالي تصبح حساسة للمعالجة الدوائية إذا كانت وراثياً حساسة لهذه المعالجة .

## الآلية الكيميائية الحيوية للمقاومة الدوائية Biochemical Mechanism of Drug

### : Resistance

إذا توفرت المعلومات عن آلية عمل الدواء فإنه يمكن عندئذ أن نتعرف على أي تغيير يحدث داخل الخلية التي تميل لإضعاف قدرة الدواء على إحداث تأثيره القاتل للخلية ولكي يستطيع الدواء بشكل عام إحداث تأثيره القاتل على الخلية فإنه يجب أن يتم نقله عبر الغشاء الخلوي وقد يحتاج أيضاً عندئذ لتنشيطه داخل الخلية ثم بعد ذلك يرتبط مع أهداف داخل الخلية ثم تحدث الأذية الخلوية وقد تكون هذه الأذية قاتلة للخلية ولكن ذلك يعتمد إلى حد ما على قدرة الخلية على ترميم الأذية الناجمة عن الدواء وإن المقاومة الدوائية يمكن أن تنجم عن أي تغيير في إحدى أو جميع العمليات المذكورة سابقاً ، والتي سوف نستعرضها فيما يلي بشيء من التفصيل :

### ١. سوء نقل الدواء عبر الغشاء الخلوي ،

بالرغم من أن هناك بعض الأدوية التي لها القدرة على الدخول إلى داخل الخلية بواسطة

الإنتشار المنفعل *passive diffusion* ، إلا أن هناك الكثير من الأدوية المضادة للسرطان تحتاج إلى النقل عبر الغشاء الخلوي لكي تتمكن من الدخول إلى الخلية حيث يكون للدواء في هذه الحالة تركيماً كيميائياً يشابه المستقبلات الطبيعية وبالتالي يمكن أن يستخدم نفس جهاز النقل الذي تستخدمه هذه المستقبلات وهذه العملية تتضمن ارتباط الدواء مع مستقبل بروتيني على غشاء الخلية ثم ينتقل هذا المركب عبر الغشاء ويحرر الدواء ويدخل لداخل الخلية فإذا حدث تغير بينية المستقبل البروتيني أو كان هناك نقص في كمية هذا المستقبل على غشاء الخلية فإن عملية نقل الدواء إلى داخل الخلية تسوء وهذا يؤدي إلى تركيز منخفض للدواء داخل الخلية وقد لا يصل هذا التركيز إلى الحد الذي يؤدي إلى إحداث التأثير الدوائي القاتل للخلية وأشهر الأمثلة على ذلك هو دواء الميثوتركسات والخرادل الآزوتي .

وهناك آلية جديدة للتغيير في النقل داخل الخلية تم التعرف عليها حديثاً وهي زيادة إفراز الدواء من قبل الخلية بعد وصوله إليها وهذا ما نشاهده عند الخلايا التي تتميز بالمقاومة المتعددة للدواء .

وسوف نستعرضها بشيء من التفصيل فيما بعد .

٢ - نقص في تنشيط " تفعيل " الدواء داخل الخلية : *reduced intracellular activation* إن العديد من الأدوية المضادة للأورام وخاصة مركبات البيورين والبريميدين تحتاج لأن تتحول إلى نيكليوتيدات قبل أن تستطيع إحداث تأثيرها الدوائي ، وبما أن النيكليوتيدات يصعب نقلها عبر الغشاء الخلوي فإن الدواء بعد دخوله للخلية يتم تفعيله بواسطة أنزيمات خاصة داخل الخلية فإذا حدث أي نقص في هذه الأنزيمات فإن ذلك يؤدي إلى نقص في تأثير الدواء على الخلية وأشهر الأمثلة على هذه الآلية هي ٦-ميركايتوبورين - *cytosin arabinoside* و فلورويوراسيل وإن زيادة تركيز الدواء داخل الخلية لا يمكن أن يعاوض هذا النقص في تفعيل الدواء .



### ٣ - تغير أو زيادة في كمية الأهداف التي يعمل عليها الدواء داخل الخلية

Altered or increased amount of intra cellular target

إن الكثير من الأدوية المضادة للأورام تعطي تأثيرها الدوائي السام للخلية بواسطة ارتباطها ببعض الأنزيمات الهامة وتبطل من فعاليتها والمثال الهام على هذه الآلية هو الميثوتركسات الذي يثبط أنزيم tetra hydro folates فيمنع تركيب الثيميدين والبورين مما يؤدي إلى توقف تشكل الـ DNA والخلايا التي تبدي مقاومة للميثوتركسات قد تظهر ازدياد في كمية هذا الأنزيم .

### ٤ - زيادة في قدرة الخلية على الترميم increased Repair Capacity

إن الكثير من الأدوية المضادة للسرطان تؤدي إلى حدوث الأذية الخلوية بأي طريق وذلك بإحداث تغيير في تركيب الـ DNA وبالقابل فإن الخلية ترد على هذه الأذية بآلية معقدة يتم فيها ترميم الـ DNA والخلايا التي تبدي مقاومة للأذية التي تحدث هذه للأدوية تظهر استطاعة أو قدرة زائدة على الترميم وذلك باستبدال الجزء العلوي في السلسلة النووية بجزء آخر مركب حديثاً .

### المقاومة الدوائية المتعددة Multiple- Drug Resistance :

في السنوات القليلة الماضية تم التعرف على آلية مهمة جداً للمقاومة الدوائية حيث بين العديد من الباحثين في السبعينات من هذا القرن أن الخلايا الورمية التي تبدي مقاومة لمجموعة دوائية تظهر مقاومة واضحة للعديد من الأدوية المضادة للسرطان التي لا تنتمي لتلك المجموعة الدوائية وفي عام ١٩٧٦ استطاع العالمان جوليان ولنيك أن يثبتا أن هذه المقاومة تحتاج لوجود وسيط على سطح الخلية وهو عبارة عن بروتين يدعى p-glycoprotein ويعمل هذا البروتين كمضخة تخرج المواد السامة للخلية من داخلها إلى المحيط الخارجي للخلية وهذا البروتين يوجد بالعديد من الخلايا الطبيعية ولكن بتركيزات منخفضة وعلى ما يبدو أن الكثير من الخلايا الورمية لها القدرة على إنتاج كميات كبيرة من هذا البروتين إما بزيادة تركيبه أو بتقوية الشيفرة الوراثية genes coding الخاصة بـ p-glycoprotein .

يتوضع قسم من هذا البروتين على الوجه الداخلي للغشاء الخلوي وهناك عدة مواقع للإرتباط بمركبات مختلفة ثم يتم نقلها باستخدام ATP خارج الخلية وأكثر هذه المركبات شيوعاً هي المركبات المشتقة من الطبيعة ، القلويدات النباتية والصادات .

### **Biochemical Modulation of drug الحيوي للمقاومة الدوائية**

#### **: Resistance**

لقد كان من المتوقع أن كلما زادت المعرفة عن آلية المقاومة الدوائية كلما استطعنا إيجاد طريقة علاجية تستطيع التغلب على هذه الآلية وبالتالي تكون أكثر فاعلية إلا أن ذلك بقي توقعاً نظرياً أما من الناحية العملية فإن إيجاد مثل هذه الطريقة التي تتغلب على المقاومة الدوائية كان صعباً للغاية . لقد جرت العديد من المحاولات التجريبية لتحسين نقل الدواء للداخل الخلية أو لتثبيط التزميم الخلوي للأذيات ولقد أثبتت التجارب أن هذه المحاولات يمكن أن تزيد من الإستجابة للدواء إلا أن محاولة تطبيق هذه التجارب سريراً واجه صعوبات متعددة ربما لأن المقاومة الدوائية السريرية متعددة الأسباب والعوامل ، وبعض هذه العوامل لم تفهم بشكل جيد حتى الآن وبعضها الآخر لم يتم التعرف عليه .

لقد استطاع العالم TSURO أن يبرهن مخبرياً أن حاصرات الكالسيوم Calcium chanal blocking مثل الفيراباميل Verapamil بتركيزه العلاجي يمكن أن تثبط عمل البروتين p-glycoprotein ، وبالتالي تمنعه من تأثيره الخافض لتركيز الدواء داخل الخلية وهذا الإكتشاف شجع العلماء على استغلاله سريراً إلا أنه وجد أن هناك أنواع من البروتين المذكور سابقاً بعضها يتأثر بحاصرات الكالسيوم والآخر لا يتأثر كما أن الجرعة المطلوبة من دواء ال Verapamil لها سمية عالية ، وتجري الدراسات السريرية للتأكد من قدرة حاصرات الكالسيوم على عكس المقاومة الدوائية المتعددة . وهناك أبحاث أخرى لإكتشاف مواد مثبطة لتأثير البروتين المسمى p-Glyco protein وليس لها آثار جانبية شديدة .

والطريقة العلاجية الأخرى التي يتم بها تعديل المقاومة الدوائية هو استخدام حمض الفوليك Folinic acid مع الفلورويوراسيل فلكي يعطي الفلورويوراسيل تأثيره الدوائي لابد من أن يتحول إلى نيكليوتيد يرتبط مع أنزيم thymidylate synthetase وقوة هذا الارتباط تزداد بشكل ملحوظ إذا إزداد تركيز الـ Reduced Folate داخل الخلية كما وجد أيضاً إن استخدام الفلورويوراسيل مع حمض الفوليك يزيد من معدل الإستجابة وقد يكون ذلك لوجود عدد من الخلايا الورمية المقاومة للفلورويوراسيل ويتم تعديل هذه المقاومة باستخدام حمض الفوليك مع الفلورويوراسيل .

## المعالجة الكيميائية المتممة أو الداعمة Adjuvent Chemotherapy

بالتعريف : هي إعطاء المعالجة الكيميائية بعد استئصال الورم البدئي بشكل تام ودون وجود أي بقايا ورمية .

وهي طريقة تم الوصول إليها بعد عدة إكتشافات تجريبية ما بين الخمسينات والستينات من القرن الحالي حين بينت التجارب أن هناك تناسباً عكسياً ما بين الإستجابة للمعالجة الكيميائية في الحالات المبكرة أما في الحالات المتقدمة فلإن الإستجابة ضعيفة جداً . كل هذه التجارب شجعت على إيجاد المعالجة الكيميائية المتممة .

ثم بعد ذلك بدأت عدة دراسات سريرية لتحديد فائدة هذه المعالجة في سرطان الجهاز الهضمي والرئة والثدي وفيما عدا سرطان الثدي فإن النتائج كانت غميمة للأمال وكان يعتقد أن السبب يعود إلى استخدام أدوية غير فعالة ثم فيما بعد وفي العقدين الماضيين تم استخدام أنواع عديدة من الأدوية الفعالة في تجارب سريرية ومخبرية وتم الحصول على معلومات أساسية تتعلق بالمعالجة المتممة وبالرغم من أن النتائج كانت مشجعة في بعض الحالات مثل ورم ويلمز وسرطان الثدي إلا أنه في معظم السرطانات الصلبة لم تكن النتائج بحجم الآمال التي عقدت عليها .

المعالجة المتممة الحديثة Neo - Adjuvent chemotherapy :

تستحق الذكر هنا حيث عرفت لأول مرة عام ١٩٨٢ وسميت المعالجة الكيميائية البدئية primary chemotherapy وهي إعطاء المعالجة الكيميائية قبل المعالجة الموضعية في الأورام المتقدمة موضعياً ، وسوف نستعرض محاسن ومساوئ هذه المعالجة فيما بعد وفي بحث مستقل .

إنه من المهم أن نلاحظ أن معظم الدراسات السريرية والمخبرية اختبرت فعالية


المعالجة الكيميائية المتممة بعد الاستئصال الجراحي علماً بأن المفاهيم الأساسية لهذه المعالجة يمكن أن تطبق بعد المعالجات الموضعية الأخرى مثل المعالجة الشعاعية .

**المفاهيم العامة للمعالجة الكيميائية المتممة General concept of Adjuvant**

**: chemotherapy**

أ - حركية الخلية : cell kinetics

إن الفهم الشامل لحركية الخلية ولتكاثر الخلايا البدئية يعتبر من الأسس الهامة لفهم المعالجة الكيميائية المتممة ومنذ اكتشاف دورة حياة الخلية عام ١٩٥١ تعاقبت الأبحاث



شكل رقم ٢ يبين دورة حياة الخلية

المتعددة التي سلطت الضوء على حركية الخلية وتتألف دورة حياة الخلية من عدة أطوار وهي طور التركيب S - طور مابعد التركيب G<sub>2</sub> - طور الانقسام M وطور الراحة G<sub>1</sub> ( طور مابعد الانقسام ) ، أما الطور G<sub>0</sub> فيتكون من خلايا غير تكاثرية ولكن تحت التنبيه المناسب يمكن أن تتكاثر بالانقسام الخلوي .

معظم التجمعات الخلوية تتكون من خلايا تكاثرية وأخرى غير تكاثرية ولكن تحت تأثير بعض المنبهات يمكن لبعضها أن تصبح تكاثرية بينما الباقي لا يتأثر بالمنبهات وتبقى بحالة غير تكاثرية وإن نسبة الخلايا التكاثرية بالنسبة للعدد الكلي للخلايا يدعى ( Growth Fraction ) .

إن الخلايا الجذعية ( Stem cell ) هي الخلايا ذات القدرة غير المحدودة على التكاثر وهي توجد في النسيج السليمة وتشير الدراسات على تواجدها في النسيج الخفيّة أيضاً وفي هذه الحالة يمكن أن تهاجر لتشكيل النقاثل ولقد أثبتت الدراسات المعبرية

على أنه في الأورام الخبيثة نسبة قليلة جداً من الخلايا أقل من ١٪ تكون خلايا جذعية أو ( clonogenic ) .

ب - نمو الورم وموت الخلايا : Tumor Growth and Death

قام الباحثون وخاصة من المعهد الجنوبي للبحوث والمعهد الوطني للسرطان على زراعة خلايا إبيضاض الدم ( L1210 ) في الفئران ثم وصلو إلى الملاحظات التالية :


١ - أن نسبة مئوية ثابتة تقريباً من الخلايا الخبيثة تموت بعد جرعة معينة من الدواء الفعال .

٢ - أن خلية واحدة خبيثة كافية لأن تؤدي للموت .

٣ - أن هناك علاقة ما بين الجرعة والاستجابة من قبل الخلايا الورمية تجاه دواء معين فعال .

٤ - نتيجة المعالجة النهائية تتأثر بعدد الخلايا الورمية .

إن الـ Growth Fraction بالنسبة للخلايا الإبيضاضية في هذه التجربة يكون ١٠٠٪ وبالتالي فإن غمط النمو في هذه الحالة يكون أسياً بينما في الكثير من الأورام عند الإنسان والحيوان تأخذ غمطاً آخراً للنمو وهو غمط كوميترس وعلى عكس النمط



شكل رقم ٣ يبين أنماط نمو الورم ( الخط المستمر غمط كوميترس والخط المقطع النمط الأسي )

الأساسي الذي يكون فيه الـ Growth Fraction ثابت أما في نمط كومبيرتس يزداد الـ Growth Fraction حتى يصل إلى قيمته الأعظمية عندما يبلغ حجم الورم ٣٧٪ من حجمه الأعظمي .

إن الدراسات المخبرية المختلفة افترضت عدة مفاهيم أخرى فيما يتعلق بتطور ونمو الورم منها :

١ - بزيادة تقدم الورم يقل الـ Growth Fraction وتقل أيضاً حساسية الورم للأدوية المضادة للإستقلاب بينما يزداد زمن التضاعف .

٢ - بتقص كتلة الورم فإن الـ Growth Fraction للبقايا الورمية يزداد .

٣ - الأورام التي تنمو بسرعة أكثر حساسية للمعالجة الكيميائية .

٤ - المعالجة الكيميائية فعالة في الأورام الصغيرة والمتشرة أكثر من الأورام الصلبة ذات الحجم الكبير .

لقد بين العالم سكينر أن زمن التضاعف ذو قيمة ثابتة إلا أنه من المهم أن نعرف أن زمن التضاعف لا يعكس تماماً معدل تكاثر الخلايا فمثلاً من الممكن أن يكون للورم معدل عالي من ضياع الخلايا ( Cell loss ) وقد يترافق بمعدل عالي للتكاثر وبالتالي فإن زمن التضاعف لا يتناسب مع الخلايا الناتجة عن التكاثر ولذلك فإن الأورام بطيئة النمو لا تعني أن لها Growth Fraction منخفض وهذا ما يعكس أحياناً الإستجابة غير المتوقعة لبعض الأورام ذات الزمن الطويل للتضاعف .

جـ - الأدوية : drugs

بالرغم من أننا سوف نستعرض خصائص الأدوية المضادة للسرطان في بحث مفصل إلا أنه من المهم أن نذكر هنا أن أحد العوامل الهامة في فعالية المعالجة الكيميائية المتممة هو إنتقاء الدواء المضاد للسرطان فالكثير من هذه الأدوية تعمل على طور معين من دورة حياة الخلية أما بعض الأدوية الأخرى فتؤثر على الخلايا التكاثرية وغير التكاثرية ولذلك فإن تأثير الدواء وسميته يتأثر بشكل ملحوظ ليس فقط بكون الخلية حساسة

لهذا الدواء وإنما بدورة حياة الخلية ايضاً .

إن من الضروري أن نلاحظ أن فعالية الدواء في المعالجة المتممة لا يعتمد على فعاليته في معالجة الحالات المتقدمة من الورم وإنما بشكل عام يمكن القول أن الأدوية الفعالة في المعالجة المتممة تميل عادة لأن تكون فعالة في الحالات الورمية المتقدمة والأدوية المستخدمة في المعالجة المتممة يجب أن تكون قادرة على السيطرة على النقائل البعيدة ويجب أن تمنع النمو الموضعي للورم أيضاً .

#### العوامل التي تؤثر على الإستجابة Factors influencing Response :

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على الإستجابة في المعالجة الكيميائية تم التوصل إليها من خلال التجارب المخبرية على الحيوانات وسوف نستعرضها فيمايلي:

١ - عوامل متعلقة بالورم :

كما ذكرنا سابقاً فإن من أهم مبادئ المعالجة الكيميائية المتممة هي العلاقة العكسية ما بين عدد الخلايا الورمية والإستجابة للمعالجة الكيميائية ونقد افترضت الدراسات المختلفة أنه :

- أ - هناك علاقة عكسية بين نسبة الشفاء وكتلة الورم في وقت إجراء العمل الجراحي .
- ب - أن هناك تناسب طردي ما بين حجم الورم ونسبة الإصابة بالنقائل البعيدة .
- ج - هناك علاقة مباشرة ما بين حجم الورم عند إجراء العمل الجراحي وإمكانية الشفاء باستخدام المعالجة الكيميائية المتممة ولكن من المهم أن نذكر أن الأورام المختلفة نسيجياً لا تنتقل إلى البعد بنفس النسبة فبعض الأورام الكبيرة مثل ( الميلانوم B 16 ) قد تشفى بالجراحة فقط أو بالمشاركة مع المعالجة الكيميائية بينما بعض الأورام الأخرى وبنفس الحجم لا تشفى وبأي وسيلة علاجية .

#### ٢ - الجرعة الدوائية : Dose

إن الجرعة الدوائية أو كثافتها ( الجرعة في واحدة الزمن ) لها أهمية كبيرة في الإستجابة للمعالجة الكيميائية للأورام المتقدمة أو المتممة ولقد أثبتت الدراسات المخبرية المختلفة أهمية إعطاء الدواء بجرعته الأعظمية وإن أي إنقاص من هذه الجرعة سوف يؤدي إلى



الإقلال من تأثير الدواء فمثلاً في السرطانة الغدية للثدي عند الفئران فإن إنقاص جرعة السيكلوفوسفاميد وال CCNU إلى ٣٣٪ في المعالجة المتممة يؤدي إلى انخفاض معدل الشفاء من أكثر من ٨٠٪ إلى أقل من ٥٠٪ ويقلل من معدل حياة الحيوان أيضاً .

### ٣ . المشاركة الدوائية أو استخدام دواء واحد ،

لقد أثبتت التجارب على أن استخدام المشاركة الدوائية أكثر فعالية من استخدام دواء وحيد ولكن فعالية هذه المشاركة تتعلق أيضاً بمعدل التكاثر في الورم وفعالية كل دواء على حدة وطريقة إعطاء المشاركة الدوائية .

### ٤ . نمط إعطاء الدواء Schedule of drug Administration ،

يمكن أن تعطى المعالجة الكيميائية قبل العمل الجراحي أو بعده ويمكن أيضاً أن تعطى هذه المعالجة قبل أو بعد المعالجة الشعاعية إلا أن معظم الدراسات والتجارب المخبرية أثبتت على أن الجراحة هي العلاج الموضوعي الأساسي كما بينت هذه الدراسات على فعالية المعالجة الكيميائية المتممة إذا أعطيت بعد ٥ أيام من العمل الجراحي ، بينما بينت بعض الدراسات الأخرى على الفائدة الكبيرة الناجمة عن إعطاء المعالجة المتممة قبل العمل الجراحي .

أما معدل الحياة فيمكن أن يتأثر بوقت إعطاء المعالجة الكيميائية ( قبل الجراحة – بنفس وقت الجراحة – بعد الجراحة ) ، كما لوحظ أن هذه المعالجة الكيميائية والفواصل الزمنية فيما بين الجرعات تؤثر على فعالية المعالجة الكيميائية المتممة .

### ٥ . المقاومة الدوائية Drug Resistance ،

إن المقاومة الدوائية من العوامل المهمة المؤثرة على فعالية المعالجة الكيميائية المتممة وهذه المقاومة يمكن أن تكون مؤقتة أو دائمة .

المقاومة المؤقتة :

وتنجم عن الخصائص التكاثرية للخلية التي تقلل من حساسية الخلية الورمية للدواء أو تنجم عن نقص فيزيولوجي في تعرض هذه الخلية للدواء أما المقاومة الدائمة فهي التي تنجم عن الطفرة وقد تكون هذه المقاومة لدواء وحيد أو لعدة أدوية .

### سمية المعالجة الكيميائية الداعمة Toxicity of Adjuvant therapy :

إن السمية الناجمة عن المعالجة الكيميائية المتممة قضية هامة جداً إذ تبين أن هذه السمية هي أحد العوامل التي تحد من جرعة الدواء ( Dose limiting Factor ) وهل الفائدة الناجمة عن هذه المعالجة تستحق أن يكون الثمن هو السمية الزائدة ؟ وبالرغم من أن معظم الآثار الجانبية للمعالجة الكيميائية هي آثار عابرة وجيدة التحمل من قبل المريض " تساقط الشعر - اضطرابات هضمية - تثبط نقي العظم " . ولكن يمكن حدوث الآثار المزمنة " مثل السمية على العضلة القلبية " وكذلك يمكن أن تترافق هذه الآثار بالوفاة و بزيادة امكانية حدوث السرطانات الأخرى إذ أثبتت العديد من الأدوية المضادة للسرطان قدرتها على إحداث سرطان في الحيوانات أما عند الإنسان فلقد أظهرت عدت دراسات حول المعالجة المتممة أن هناك زيادة في امكانية حدوث أورام خبيثة أخرى .

ففي سرطان الثدي سجل العالم " فيشر Fisher ٢٧ حالة ابيضاض دم في ٥٢٩٩ مريضة عولجت بالمعالجة المتممة حوالي ٥,٠٪ بالأنظمة العلاجية الحاسوبية على L-Phenylalanine Mustard وعدة دراسات أخرى تثبت زيادة إمكانية حدوث ابيضاض دم في المعالجة المتممة وباستخدام أدوية أخرى مثل ثيوتيبيا ( thiotep ) - سيكلوفوسفاميد - كلورامبوسيل والخردل الآزوتي .

وفي النهاية نؤكد على أن معرفة سمية المعالجة وطرق التغلب عليها لا يمكن أن تهمل وخاصة في المعالجة الكيميائية المتممة .

### المعالجة الكيميائية المتممة بعد العمل الجراحي مباشرة perio preative therapy :

إن الوقت المناسب لإعطاء المعالجة المتممة لا يزال غير معروفاً إلا أن معظم الباحثين يفضل إعطاء هذه المعالجة بعد ٤ أو ٦ أسابيع من العمل الجراحي وأن إعطاء هذه المعالجة الكيميائية المتممة بعد العمل الجراحي مباشرة يواجه عدة صعوبات منها :  
أ - الآثار الجانبية السمية الحادة للأدوية المضادة للسرطان يمكن أن تزيد من الاختلاطات

التالية للعمل الجراحي كالانتان والألم الشديد .

٢ - تأخر في شفاء الندبة الجراحية ويمكن أن يتأثر ذلك بنوع الدواء المستخدم .

٣ - هذا النوع من المعالجة يتطلب تعاوناً تاماً مابين اخصائي الأورام والجراح ويحتاج لعناية تمريضية خاصة وذلك ما يصعب تحقيقه في كثير من الأحيان .

وبالرغم من كل هذه الصعوبات إلا أن هناك تجارب سريرية عديدة أجريت لإظهار فائدة هذه المعالجة ومن هذه الدراسات الدراسة الاسكتندنافية حول المعالجة المتممة بعد العمل الجراحي مباشرة في سرطان الثدي حيث استخدم في المجموعة الأولى من هذه الدراسة السيكلوفوسفاميد ولمدة ٦ أيام أما المجموعة الثانية فلم تعطى أي علاج ولوحظ أن هناك تحسن في الفترة الزمنية الخالية من النكس في المجموعة التي أعطيت المعالجة بالسيكلوفوسفاميد .

وفي دراسة اسكتندنافية أخرى جرى مقارنة استخدام معالجة بالمشاركة الدوائية وبعد العمل الجراحي مباشرة أو استخدام هذه المعالجة لمدة سنة كاملة عند المريضات بسرطان الثدي في حال إصابة العقد الأبطية ولقد لوحظ إزدیاد في الفترة الزمنية الخالية من النكس Relaps - Free survival في المجموعة المعالجة لمدة سنة كاملة أما إعطاء المعالجة الكيميائية المتممة بعد العمل الجراحي مباشرة في الأورام الأخرى مثل سرطان الرئة غير صغيرة الخلايا Non Small cell lung cancer وسرطان الكولون فلم تبدي أي تحسن بالنتائج وبالرغم من أن هناك أدلة واضحة على الفائدة السريرية للمعالجة الكيميائية بعد العمل الجراحي مباشرة إلا أنها تحتاج لدراسات سريرية أخرى لتحديد الأدوية المؤثرة ولإظهار فعالية هذه المعالجة .

**المعالجة الكيميائية المتممة البدئية " أو المعالجة الحديثة " Neo - Adjuvent**

**: chemotherapy**

المعالجة البدئية عادة ماتستخدم في معالجة سرطانات الأطفال الصلبة ولقد أصبح استعمالها أكثر شيوعاً في سرطانات الكبار في الوقت الحاضر وفائدة هذه المعالجة

ليس فقط السيطرة على النقائل المجهرية بل وعلى الورم البدئي أيضاً ولقد أثبتت عدة تجارب سريرية على زيادة معدل الشفاء بالمقارنة مع المعالجة المتممة التالية للعمل الجراحي أما العوامل المؤثرة على فعالية هذه المعالجة فهي نفسها المؤثرة على المعالجة الداعمة بشكل عام ومن الفوائد الأخرى لهذه المعالجة السيطرة على الورم البدئي وبالتالي يمكن أن تكون الجراحة محافظة والمعالجة الشعاعية محدود ضيقة وهذا مهم جداً في أورام الرأس والعنق والسراركومات حيث تكون النتائج التجميلية والوظيفية للعالجة أفضل .

والفائدة الأخرى أيضاً هي أن إعطاء الدواء قبل العمل الجراحي يؤمن توزيع جيد لهذا الدواء إذ تكون الأوعية المغذية للورم سليمة وغير متعرضة للأذية الشعاعية والجراحية .

ويمكن أيضاً أن تزيد الأدوية المستخدمة في المعالجة الكيميائية قبل إعطاء المعالجة الشعاعية من حساسية الخلية للأشعة .

وأخيراً يمكن لهذه الطريقة العلاجية تقييم التأثير الحيوي والتشريحي المرضي للمعالجة الكيميائية على الورم بعد استئصاله جراحياً .

- أما الآثار الجانبية لهذه الطريقة من المعالجة فهي :

- ١ - زيادة سمية المعالجات التالية .
  - ٢ - في حالة عدم مقدرة المعالجة الدوائية على إحداث تراجع للورم فيمكن أن يكون هناك نمواً زائداً للورم غير ملاحظ سريرياً .
  - ٣ - عدم الاستفادة من زيادة حركية النقائل المجهرية بعد العمل الجراحي وبالتالي تكون أكثر حساسية للمعالجة الكيميائية .
- وبالرغم من هذه المساوئ فإن المعالجة البدئية تبشر بالأمل الكبير في نجاح المعالجة للعديد من الأورام الصلبة .

فائدة مثبتة ومحددة	فائدة ممكنة	لا يوجد فائدة أكيدة
سرطان الثدي	سرطان الرئة صغير الخلايا ( Scic )	سرطان البنكرياس
أورام الخلايا المولدة في المبيض ovarian germ cell tumor	سرطان الرأس والعنق	سرطان المعدة
الغرن العظمي osteosarcoma	سرطان الرئة غير صغير الخلايا (Nscic)	سرطان عنق الرحم
سرطان الكولون والمستقيم	ساركوما النسيج الرخوة	الميلانوم
سرطان الشرج	سرطان المثانة	سرطان الخصية
سرطانات الأطفال ( ويلمز ايوبنغ - ورم الأرومات العنصية والغرن العظمي المخطط )	سرطان المري	

جدول رقم ( ٤ ) يبين دور المعالجة الكيميائية الداعمة في السرطانات الصلبة عند الإنسان.

## المعالجة الكيميائية بالمشاركة Combination Chemotherapy

بدأت المعالجة الكيميائية خلال الحرب العالمية الثانية وكتيجة لتجارب العلماء كودمان Goodman - وينتروب Wintrobe وداميشيك Dameshek في معالجة داء هودجكن باستخدام دواء Mechlore thamine وفي السنوات العشر التالية عولج الكثير من الأورام الخبيثة وبعدة أدوية ولكن النتائج كانت مخيبة للآمال والاستجابة للمعالجة كانت مؤقتة ، هذا العهد من المعالجة الكيميائية كان يقوم على فرضيات تفسر آلية عمل الأدوية المتوفرة آنذاك والتي كان معظمها غير فعال إذا استخدم بمفرده وإذا استخدم مع أدوية أخرى فيترافق ذلك مع سمية زائدة للمعالجة ولقد أطلق العالم Devita على هذه المرحلة من المعالجة الكيميائية اسم المرحلة التجريبية ( period of empiricism ) ثم دخلت المعالجة الكيميائية بعد ذلك مرحلة التحريب المستنير ( enlightened empiricism ) ( ١٩٦٠ - ١٩٧٥ ) .

تميزت هذه المرحلة بدراسات العالم سكيبر وزملاؤه عن المعالجة الكيميائية ونمو الورم والتي أضافت كثيراً من المعلومات عن حيوية الورم ووضعت الأسس النظرية للمشاركة الدوائية وباستخدام هذه المبادئ أصبح من الممكن نظرياً إحداث المجموع التام بالمعالجة الكيميائية بالمشاركة كما أن التحسن الملحوظ في معدل الحياة في حالات ابيضاض الدم اللعائوي الحاد وداء هودجكن كان أحد نتائج هذه المرحلة .

إن من المبادئ الأخرى لإستخدام المشاركة الدوائية هي الإستفادة من الفروق الكيميائية الحيوية ما بين الخلية السليمة والخلية السرطانية وفي هذه المرحلة أيضاً توصل العالم sartorelli لأحد الأسس الهامة للمشاركة الدوائية ألا وهو مفهوم التعاضد Synergism ما بين الأدوية المختلفة التي تعمل على طرق استقلابية مختلفة أو أنها تعمل على مواقع مختلفة من نفس الطريق وتتعاون هذه الأدوية على تثبيط انتاج العناصر الخلوية الهامة بالتالي لموت الخلية ويتطور الأسس الحيوية الكيميائية للمشاركة الدوائية

تم التوصل لعدة آليات لعمل هذه المشاركة منها :

١ - القفل المتتالي Sequential blockade : أو تثبيط أنزيمين أو أكثر التي تلعب دور الوسيط في إنتاج المستقبلات الخلوية الهامة ومثال على هذه الآلية هي المشاركة ما بين الهيدروكسي يوريا hydroxyuracil ( المثبط لخميرة Ribonucleotide reductase ) ودواء الستيارابين ara-c المثبط لخميرة ( أنزيم ) DNA polymerase .

٢ - القفل المتزامن Concurrent blockade : أو تثبيط طريقين متوازيين لتركيب المستقبلات الهامة .

٣ - التثبيط المتمم complementary inhibition : أو التداخل مع عمليتين كيميائيتين حيوية مرتبطتين ومثال عليها استخدام دواء daunorubicin ودواء ( ara-c ) المثبط لخميرة DNA polymerase في أبيضاض الدم الحاد غير اللمفاوي وهي عملية تداخل ما بين عملية تركيب وترميم الحمض النووي DNA .

إن الأنظمة العلاجية التي اعتمدت على هذه الآليات لم تؤدي إلى إيجاد مشاركات ناجحة على الرغم من أن المشاركة ما بين الستيارابين ( ara-c ) ودواء 6-thioguanine في علاج الإبيضاض الحاد غير اللمفاوي كانت من المشاركات الناجحة التي اعتمدت على تلك الآليات ( قبل استخدام مركبات الأنتراسيكلين ) .

المفاهيم الحديثة للمشاركة الدوائية :

إن المفاهيم المهمة التي ساهمت في وضع أسس المعالجة بالمشاركة الدوائية هي المقاومة الدوائية للخلايا الورمية والتي سوف نتعرض لها في بحث قادم في هذا الكتاب إلا أنه يمكن القول باختصار أن هذه المقاومة الدوائية للخلية الورمية لوحظت منذ سنوات طويلة ولقد حاول العالمان كولدي وكولدمان أن يفسرا ملاحظتهما للتغير الحيوي الكيميائي الذي يجعل الخلية أقل حساسية للمعالجة الكيميائية التي كانت فعالة في وقت سابق وفي أبحاثهما الحديثة وضع هذان العالمان مفاهيم جديدة تصف بشكل أوضح المقاومة الدوائية ومن هذه المفاهيم هي العلاقة ما بين المقاومة الدوائية ونمو الورم

حيث لوحظ أنه في المراحل المبكرة للورم تكون نسبة الخلايا المقاومة ضئيلة وكلما زاد نمو الورم وبالتالي عدد الخلايا الورمية ازدادت نسبة الخلايا المقاومة للدواء وهذه المفاهيم اعتمدت على الافتراض القائل أن وجود المقاومة الدوائية يعتبر سبباً هاماً لفشل المعالجة الموجهة ضد الورم وكلما تمكنا من التخلص المبكر من الخلايا الحساسة للمعالجة كلما قلت نسبة حدوث المقاومة الدوائية وبالتالي يمكن زيادة نسبة الشفاء .

هذه المفاهيم والملاحظات السريرية قادت العالمان كولدي وكولدمان إلى إيجاد مشاركات دوائية فعالة حيث تقل نسبة المقاومة الدوائية باستخدام أدوية متعددة كل واحد من هذه الأدوية يعمل بآلية مستقلة ويمكن أن نشير هنا إلى ملاحظة العالم Frei حول استخدام الأدوية غير المتشابهة بالسمية *non overlapping toxicity* التي تعتبر من الأسس الهامة لنجاح المشاركة الدوائية الموجهة لعلاج ابيضاض الدم اللمفاوي الحاد عند الأطفال حيث أشار إلى أن الأدوية المختلفة في آلية التأثير وفي السمية يمكن أن تعطي تأثيراً متعاضداً *Synergistic effect* .

أما الأدوية ذات السمية الواحدة فلا يمكن استخدامها مع بعض إلا بعد انقاص الجرعة وبالتالي تكون الإستجابة ضعيفة ولقد اعتمد هذا المفهوم في معظم المشاركات الدوائية إلا إنه يتم حديثاً إعطاء الأدوية وجرعات كاملة على الرغم من تأثيراتها الجانبية الخطيرة على المريض كوسيلة حديثة فعالة في المشاركة الدوائية وسوف نستعرضها في بحث قادم .

يمكن أن نلخص فترة التحريب المستنير *enlightened empiricism* هي الفترة التي تم فيها تطوير الأسس العلمية للمشاركة الكيميائية حيث تم التوصل لعدة مبادئ اشتقت إما من خصائص الأدوية المستخدمة أو من حيوية الورم وبشكل عام يمكن القول أن الأدوية المستخدمة كانت تتداخل مع عملية تشكّل الـ DNA أو تعمل على تثبيط تركيب النيكلوتيدات والأدوية التي تستخدم في المشاركات الدوائية يجب أن تكون فعالة إذا استخدمت بمفردها ويجب أن تعمل بآليات مختلفة وليس لها سمية



متشابهة أو مشتركة ومن المبادئ الهامة الأخرى هو انتقاء أدوية تعمل بشكل متعاقد.

أما هدف انتقاء هذه الميزات في الأدوية المستخدمة هو زيادة معدل موت الخلية الورمية في وقت يكون حجم الورم فيه صغيراً وذلك لزيادة معدل الشفاء ومن المبادئ الهامة التي استندت على حركية الخلية هو إعطاء الأدوية بفترات مختلفة وذلك لقتل الخلايا الورمية التي تدخل في الأطوار المختلفة لدورة حياة الخلية .

ويمكن أيضاً إعطاء الدواء بشكل متزامن مع الطور الذي تكون فيه الخلية أكثر حساسية للدواء ويمكن أن نطلق على العهد الذي يمتد من عام ١٩٧٥ وحتى وقتنا هذا اسم عهد التجربة العلمية Scientific empiricism وتميز هذا العهد بالمفاهيم التي توصل إليها العالمان Dainon و Cadman من مفاهيم علمية عن التعاقد الحيوي الكيميائي التي ساهمت في تطوير المشاركات الكيميائية وقد بين هذان العالمان على أن هناك طريقتين استقلائيتين الأول وهو البدئي وهو عبارة عن تثبيط الطريق الاستقلالي ويحدث داخل النواة بواسطة تثبيط أحد نواتج الاستقلاب بإبطال عمل أنزيمين وبشكل متتالي وإن استخدام مثبطين غير متنافسين يؤثران على أنزيم واحد أو تثبيط طريقتين استقلائيتين يؤديان إلى ناتج واحد يؤدي لمستوى عال من التثبيط أو لزيادة تحول الدواء إلى شكله الفعال .

أما الطريق الثاني وهو الطريق الثانوي ويدعى تثبيط الجزئيات الكبيرة Macro Molecule inhibition ويتضمن تثبيط تشكّل الـ DNA ويمكن أن نلخص هذا البحث بمايلي إن المشاركة الكيميائية قد تطورت من التجربة إلى أسلوب علاجي علمي ومفاهيم هذه المشاركة نتجت عن دراسات وتجارب على مدى سنين عديدة وأهم مبادئ المشاركة الدوائية :

١ - التعاقد الكيميائي الحيوي

٢ - حركية الخلية الورمية

- ٣ - موت الخلية الجزئي Fractional cell kill
- ٤ - الجرعة الدوائية
- ٥ - تركيز الجرعة والجرعة والكلية
- ٦ - عدم وجود سمية مشتركة للأدوية المستخدمة
- ٧ - استخدام عناصر دوائية فعالة
- ٨ - المقاومة الدوائية للخلية الورمية
- ٩ - عدم استخدام عناصر دوائية لها مقاومة متشابهة non - cross - Resistant agents
- ١٠ - إنقاذ المريض .

## عوامل النمو الدموية

### Hematopoietic Growth Factors


وهي عبارة عن بروتينات سكرية Glyco protein تنظم تطور الخلايا الدموية وتلعب حديثاً دوراً هاماً في معالجة الأورام بالرغم من حداثة استخدامها السريري إلا أنها تمكنت من تحسين نتائج المعالجة الكيميائية وذلك لدورها في الإقلال من تثبيط نقي العظم الناتج عن هذه المعالجة وسوف نستعرض في هذا البحث بشيء من التفصيل هذه العوامل وآلية تأثيرها واستخداماتها السريرية .

ملحة عامة :

إن الرواد الأوائل من الباحثين استطاعوا أن يثبتوا قدرة الخلايا الدموية السلفية progenitor hematopoietic cell على إنتاج خلايا دموية وبدرجات مختلفة من النضج ولقد لوحظ أنه عند الفأر الذي تلقى جرعة شعاعية قاتلة وعند زرع نقي العظم له بأنه يمكن أن تتشكل مجموعات خلوية ومستعمرات colonies في طحال هذا الفأر وهذه المستعمرات تشابه نسيجياً الجزر الخلوية الصغيرة من الخلايا الدموية وبدرجات مختلفة من النضج .

عدد الخلايا التي تستطيع أن تكون مثل هذه المستعمرات تدعى الواحدات المكونة للمستعمرة ( CFUs ) Colony Forming Units وبشكل عام فإنه كل ١٠<sup>٥</sup> خلية منوأة محقونة تؤدي لتشكيل مستعمرة colony تظهر عادة في الطحال وفي تجارب تالية تم إثبات أن هناك عوامل قابلة للإلحاق يمكن أن تنبه الخلايا في نقي العظم لإنتاج المستعمرات الخلوية ، فمثلاً عند زراعة الخلايا في نقي العظم في الأوساط الحاوية على الأغرة ( agar ) فإنه يمكن أن تتشكل المستعمرات الخلوية ( كل واحدة مكونة من أكثر من ٥٠ خلية ) وتكون الخلايا المحيية هي المسيطرة لذلك تسمى الواحدات المكونة للخلايا المحيية ( CFUs ) Colony Forming Units وكذلك الواحدات المكونة

للخلايا الوحيدة النواة والبلاعات ( CFU - M ) Colony Forming Unit - Monocyte  
 Macrophage والواحدات المكونة للخلايا الحمراء Colony Forming Unit - Erythro cytes  
 وأطلق عليها جميعاً العوامل المنبهة للمستعمرات ( CSF ) Colony Stimulating Factors أو  
 عوامل النمو الدموية وهي العوامل التي تحت على تشكل الخلايا الدموية في المخير وفي  
 داخل الجسم .



شكل رقم ٤ بين العلاقات ما بين عوامل النمو الدموية

**التثريب الوريدي المستمر لعوامل النمو الدموية الإنسانية Continuous infusion of ( rh GM - CSF )**

هناك عدة دراسات أجريت للدراسة تأثير إعطاء العوامل المنبهة للمستعمرات (rhGM - CSF) عن طريق الوريد ولملاحظة التغيرات الدموية التي حدثت وفي هذه الدراسات تم حقن الحيوان بهذه العوامل وبثريب وريدي مستمر لمدة ٧ - ١٠ أيام وبجرعة ( ١ إلى ٢ x ١٠<sup>٧</sup> وحدة ) كل يوم ولمدة ٧ أيام وكانت النتيجة هي زيادة كبيرة ( أكثر ب ٧ مرات من القيم الوسطية قبل الحقن ) في عدد الكريات البيض ودراسة نقي العظم أظهرت زيادة في الخلوية وتحدث هذه الزيادة في الكريات البيض في اليوم ١ - ٣ من بدء العلاج ويستمر خلال مدة إعطاء الدواء وتشمل الزيادة كل أنواع الكريات البيض على الرغم من أن أكثر الكريات البيض زيادة هي محبات الحامض أما الصفائح الدموية فلا يضرأ عليها أي تبدل ولقد أثبتت عدة دراسات على أنه يمكن ملاحظة ارتفاع الكريات الشبكية في بعض الأحيان .

**إعطاء عوامل النمو الدموية ( rh CM - CSF ) حقناً تحت الجلد :**

لقد أثبتت الدراسات الحديثة على أن إعطاء ( rh GM - CSF ) حقناً تحت الجلد يؤدي إلى زيادة واضحة في عدد الكريات البيض والجرعة الدوائية تتراوح ما بين ١ إلى ١٠ ميكرو غرام / كغ إما كجرعة وحيدة أو مقسمة على دفعتين في اليوم والواحد ولمدة تتراوح ما بين ٧ و ١٤ يوم ولوحظ أن التأثير الدوائي في هذه الحالة يماثل التأثير الناجم عن إعطاء الدواء بالتثريب الوريدي المستمر إلا أنه لوحظ ارتفاع فوري في عدد الصفائح الدموية عند الحيوانات في حالة الحقن تحت الجلد وتفسير هذا الفرق بين طريقي الحقن لا يزال يحتاج للدراسة كما أن تحمل الدواء عند إعطائه تحت الجلد جيد مع ارتكاسات جلدية موضعية قليلة .

- تأثير الـ ( rh GM - CSF ) على الصورة الدموية في حالة المعالجة الكيميائية المرافقة مع زرع نقي العظم :

هناك العديد من الباحثين قاموا بدراسة تأثير عوامل النمو ( rh GM - CSF ) على الحيوانات بعد تعرضها لجرعات عالية من المعالجة الكيميائية مع أو بدون زرع نقي العظم ومن هؤلاء الباحثين العالم Nienhuis وزملاؤه حيث أجرى دراسة هامة حول إعطاء عوامل النمو في زرع نقي العظم عند الحيوانات وقد تم في هذه الدراسة إعطاء عوامل النمو بطريقتين :

أ - إعطاؤها على عدة أيام قبل وبعد الزرع .

ب - إعطاؤها فقط بعد إجراء الزرع .

إن عملية زرع نقي العظم تسبق بتشعيع كامل الجسم Total body irradiation حيث يتم إعطاء ١٢٠٠ راد تعطى بمعدل ١٢ راد / بالدقيقة وبعد ذلك يتم حقن الحيوان من ٢ - ٥ × ١٠<sup>٨</sup> خلية / كغ ثم يخضع حيوان للعناية المركزة بعد ذلك . في الحيوانات التي عولجت بعوامل النمو ( rh GM - CSF ) يرتفع تعداد المعتدلات إلى ١٠٠٠ كرية / مم<sup>٣</sup> في اليوم الثامن أو التاسع بعد الزرع بينما عند الحيوانات التي لم تعطى عوامل النمو فإن ذلك يحتاج إلى ١٧ - ٢٤ يوم . أما أهم الآثار الجانبية الملاحظة عند إعطاء عوامل النمو فهي انخفاض البومين المصل وذمة في الأطراف - الإسهال وانخفاض بوتاسيوم المصل وجميعها تزاجع بعد إيقاف الدواء .

الدراسات السريرية لاستخدام عوامل النمو عند الإنسان :

لقد تم خلال المستتين الماضيتين إنجاز مجموعة من الدراسات السريرية عن استخدام عوامل النمو عند الإنسان وفي هذا البحث سوف نستعرض بعض هذه الدراسات التي بحثت في تأثير درجة الأمان لهذه العوامل كما بحثت في التوجهات المستقبلية لاستخدام هذه العوامل :

١- عوامل النمو ( rh GM - CSF ) في عوز المناعة المكتسب ( AIDS ) ،  
العالم غرومان ( Groo pman ) كان أول من جرب استخدام عوامل النمو عند  
١٦ مريض من مرضى الإيدز المصابين بنقص في الكريات البيض حيث تلقى هؤلاء  
المرضى أولاً جرعة وريدية من عوامل النمو ثم بعد ٤٨ ساعة تم إعطاء هذه العوامل  
على مدى ١٤ يوم وبترتيب وريدي مستمر وجرعة يديّة ١,٣ × ١٠<sup>٣</sup> وحدة / كغ  
في اليوم ثم تزداد تدريجياً حتى ٢ × ١٠<sup>٤</sup> وحدة / كغ .  
ولقد بينت هذه الدراسة على أن عوامل النمو ( rh GM - CSF ) يمكن أن تؤدي  
لزيادة في الكريات البيض وهذه الزيادة معتمدة على الجرعة الدوائية .  
أما الآثار الجانبية فهي حمى بسيطة - الآلام العضلية - التهاب الوريد والتوهج  
Flushing ومن هذه الدراسة تم الاستنتاج إلى إن عوامل النمو ( rh GM - CSF ) فعالة  
حيوياً في رفع الكريات البيض للطبيعي في مرض الإيدز وأنها جيدة التحمل أما بالنسبة  
لنقي العظم فيلاحظ زيادة في الخلوية بعد إعطاء هذه العوامل وبشكل خاص يلاحظ  
ارتفاع الحمضات أما الخضاب والصفائح والشبكيات فلا تتغير خلال المعالجة .  
إن إعطاء عوامل النمو في مرضى متلازمة عوز المناعة المكتسب أثبت أنه قادر  
على تصحيح النقص الوظيفي في المعتدلات والدراسات قائمة لتقييم الفائدة السريرية  
من هذه الخاصية في مرضى الإيدز .  
هناك العديد من الدراسات الحالية تحاول دراسة إعطاء ( rh GM - CSF ) حقناً  
تحت الجلد في مرضى الإيدز حيث يتم إعطاء المرضى جرعة يومية تتراوح ما بين ٢,٥  
وحتى ٨ ميكروغرام لكل غرام من الوزن لمدة ٦ أشهر والتأثير الأولية تشير إلى  
ارتفاع في الكريات البيض لدى جميع المرضى ومستوى أكثر بثلاث مرات من  
مستواها قبل المعالجة خلال الست أسابيع من المعالجة كما لوحظ علاقة هذا الارتفاع  
في الكريات البيض مع الجرعة المستخدمة .

## ٢- عوامل النمو ( rh GM - CSF ) في متلازمة عسر التصنع النقوي Myelo dysplastic : Syndrom

في دراسة أجراها العالم vodhinaraj تم إعطاء عوامل النمو ( ثنائي مرضى مصابين بعسر التصنع النقوي ومعالجين سابقاً بعدة وسائل منها زرع نقي العظم وبالمشاركة الدوائية ara - c + daunorubicin وبأدوية أخرى من مجموعة العوامل المقلونة alkylating agents تم إعطاء الـ ( rh GM - CSF ) بتثريب وريد مستمر ولمدة أسبوعين ثم توقف المعالجة لمدة اسبوعين يكرر العلاج كل ٢٨ يوم أما الجرعة الدوائية فتتراوح ما بين ٣٠٠ - ٥٠٠ ميكروغرام / ٢م من مساحة الجسم ولقد أظهرت النتائج الأساسية لهذه الدراسة ازدياداً واضحاً في تعداد الكريات البيض ولوحظ ازدياد تعداد الصفيحات والشبكيات أيضاً عند ٣٧٪ من المرضى بحيث استغنى هؤلاء المرضى عن نقل الصفيحات والدم أما دراسة نقي العظم فقد أظهرت ازدياد في الخلوية وتراجع في عدد الأروميات ( Blasts ) والنتيجة الهامة هذه الدراسة هي أن الـ ( rh GM - CSF ) قادرة على تنبيه الأنسجة المكونة للدم بشكل واضح مما يؤدي إلى تحسن الصورة الدموية وفي فترة قصيرة .

## ٣- عوامل النمو ( rh GM - CSF ) مع المعالجة الكيميائية :

لقد استخدمت عوامل النمو ( rh GM - CSF ) لتعديل تأثير المعالجة الكيميائية المكثفة على نقي العظم وخاصة باستخدام الأدريناميسين - ( DTIC ) Ifosfamide والميزنا Msna ( المشاركة MAIA ) . وفي دراسة للعالم Antman استطاع أن يثبت فعالية فزيولوجية لعوامل النمو قبل البدء بالمعالجة الكيميائية وفي هذه الدراسة تم إعطاء المرضى الـ ( rh GM - CSF ) لزيادة تعداد البيض قبل إعطاء المعالجة الكيميائية ثم بعد ذلك بقليل يتم إعطاء هذه العوامل في الدورة الأولى من المشاركة " MAID " أما بعد الدورة الثانية فلا تعطى عوامل النمو بمقارنة الدورة التي تم فيها إعطاء عوامل النمو مع الدورة التي لم تعطى فيها لوحظ أن عدد الكريات البيض الكلي أعلى ، وكذلك نسبة المعتدلات وعدد الصفيحات . أما الجرعة في هذه الدراسة فتبدأ من ٤ ميكروغرام /



كغ يومياً بثرريب وريدي مستمر وتزداد الجرعة حتى تصل إلى ٦٤ ميكرو غرام / كغ يومياً . أما السمية فكانت احتباس السوائل وحدوث الصمات الوعائية في الدماغ (في الجرعات العالية ) وهذه الآثار الجانبية تعود لارتفاع عدد الكريات البيض ونستنتج من هذه الدراسة أن عوامل النمو ( rh GM - CSF ) جيدة التحمل بجرعة ٣٢ ميكرو غرام لكل كغ يومياً وتستطيع أن تعدل من نقص الكريات البيض الناجم عن المعالجة الكيميائية .

#### ٤ - عوامل النمو ( rh GM - CSF ) في زرع نقي العظم .

لقد تم تقييم تأثير عوامل النمو الدموية وفي دراسات مكثفة في المعالجة الكيميائية للسرطان مع زرع نقي العظم وفي دراسة للعالم Brandt حيث تم إعطاء ( rh GM - CSF ) للمرضى المعالجين بزرع النقي وجرعات عالية من الأدوية التالية BCNU ( الكارموستين ) - سيكلوفوسفاميد والسيسلاتين ( سرطان الثدي - الميلاتوم ) أما الجرعة الـ ( rh GM - CSF ) فكانت تتراوح ما بين ٢ و ٣٢ ميكرو غرام / كغ من وزن الجسم وطريقة الإعطاء بالثرريب الوريدي المستمر ولمدة ١٤ يوم تبدأ بعد ٣ ساعات من زرع نقي العظم ، وبالمقارنة مع مجموعة المراقبة لوحظ أن ازدياد عدد الكريات البيض والمحبيات أسرع في المجموعة المعالجة بعوامل النمو كما لوحظ أن ازدياد عدد الكريات البيض مرتبط بالجرعة الدوائية لعوامل النمو ( rh GM - CSF ) ولم يلاحظ أي تأثير على الصفائح أما الآثار الجانبية الأساسية في هذه الدراسة ( rh GM - CSF ) فكانت زيادة الوزن - الآلام العضلية والوذمة في الأطراف في الجرعات العالية كما لوحظ أن الجرعات المنخفضة كانت جيدة التحمل من قبل المريض وتوافق بشفاء سريع لنقي العظم من التأثير المثبط للأدوية الكيماوية أما معدل حدوث الإنتانات والوفيات فكان منخفضاً في هذه الدراسة في المجموعة المعالجة بعوامل النمو الدموية كما لوحظ انخفاض السمية ( مستوى الكرياتين - والبيلووين الكلبي ) ونستنتج من هذه الدراسة على أن عوامل النمو الدموية تساعد على تسريع شفاء نقي العظم من

التأثير المثبط للمعالجة الكيميائية وتقلل من سمية هذه المعالجة على الأعضاء المختلفة .

٥. عوامل النمو الدموية في فقر الدم اللاتنسجي ( rh GM - CSF ) :  
على الرغم من أن التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع لاتزال تمهيدية إلا أن هناك مجموعة من الدراسات تقيم عوامل النمو ( rh GM - CSF ) في علاج فاقات الدم اللاتنسجية المتوسطة والشديدة ففي دراسة للعالم champlin تم إعطاء المرضى هذه العوامل بجرعة تتراوح ما بين ٤ و ١٦ ميكرو غرام / كيلو غرام في اليوم ف لوحظ ازدياد المحييات عند كل المرضى وهبوطها بعد إيقاف الدواء كما لوحظ أن زيادة الوسطية في المحييات تعادل ١,٤ x ١٠<sup>٩</sup> / لتر .

## المشاركة مابين المعالجة الشعاعية والمعالجة الكيميائية

### Combined Modality Therapy

خلال العقدين الماضيين كان هناك إهتماماً واضحاً في استخدام المعالجة الشعاعية والمعالجة الكيميائية لتحسين نسبة السيطرة على الورم ومعدل الحياة عند المرضى المصابين بالآفات الخبيثة ، وعلى الرغم من كثرة المعلومات الناجمة عن التجارب والدراسات السريرية العديدة إلا أن الشكل المناسب للمشاركة مابين نمطي المعالجة لايزال غير واضح .

ويهدف هذا البحث إلى توضيح الأساس النظري لهذه المشاركة وإلى تحليل نتائج الدراسات والنتائج السابقة للبحث عن مداخل جديدة لزيادة فعالية المشاركة . أما المفاهيم العامة التي تعتمد عليها المشاركة فيما بين المعالجة الكيميائية والشعاعية فهي :

١ - في الأمراض الخبيثة الجهازية الحساسة للمعالجة الكيميائية مثل داء هودجكن - ابيضاض الدم اللمفاوي الحاد وسرطان الرئة صغير الخلايا Small cell lung cancer عادة ما يحدث النكس في أماكن الإصابة البدئية أو في الأماكن التي لا يمكن للأدوية دخولها مثل ( الجهاز العصبي المركزي و الخصية ) ولذلك فإن السيطرة الموضعية Local control في هذه المواقع يؤدي لتحسين معدل الحياة كما أن استخدام المعالجة الشعاعية مع المعالجة الكيميائية في هذه الأمراض يوجه نحو الأماكن التي يكون فيها الورم كبيراً والذي يحوي على نسبة عالية من الخلايا المقاومة .

٢ - قد يكون سبب الوفاة عند بعض المرضى ناجماً عن فشل المعالجة الشعاعية في السيطرة موضعياً على الورم ، وعند إدخال المعالجة الكيميائية فبالإضافة إلى تأثيرها على حجم الورم لأنها تقتل الخلايا الورمية بآلية مستقلة عن الأشعة وبالتالي تزيد من معدل السيطرة الموضعية فإنها أيضاً يمكن أن تؤدي لزيادة معدل الحياة .

٣ - في الحالات التي يكون فيها الورم موضعاً ظاهرياً ( loclized ) فإنه غالباً مايتظاهر سريراً بالنقائل فيما بعد هذا يعود للإفتراض القائل بأن هناك نقائل مجهرية غير مكشوفة سريراً خلال المعالجة الموضعية وبما أن امكانية السيطرة على الورم بواسطة المعالجة الكيميائية تكون أكبر كلما صغر حجم الورم فإن اعطاء العلاج الكيميائي قبل أو بعد العلاج الموضعي يمكن أن يقضي على النقائل المجهرية وبالتالي لزيادة معدل الحياة.

إن أهم المفاهيم للمشاركة ما بين المعالجة الشعاعية والكيميائية هو أن زيادة السيطرة الموضعية على الورم يؤدي لزيادة معدل الحياة كما أن السيطرة الموضعية على الورم أحد المتطلبات الهامة لشفائه .

في حالات النكس الموضعي القابلة للاستئصال الجراحي يمكن أن يكون معدل السيطرة يتراوح ما بين ١٠ و ٨٠٪ للعديد من السرطانات مثل ( سرطان الرأس والعنق - جسم الرحم - المثانة - الثدي ) . أما أورام الدماغ مثل الأورام الدبقية Glioma فإنها غالباً ماتؤدي للوفاة بسبب فشل السيطرة الموضعية على الورم .

إن الفائدة النظرية للمشاركة ما بين المعالجة الشعاعية والكيميائية يمكن أن نستخلصها من فرضية كولدي كولدمان : Goldie - Coldman والتي تنص على أن المقاومة الدوائية أو المقاومة للأشعة تنشأ بشكل عفوي وتواتر يعتمد على العدد الكلي للخلايا الورمية القادرة على التكاثر وعلى تواتر الطفرة وبالتالي فإن المشاركة بين غطتين من المعالجة غير المتشابهين بآلية المقاومة non cross - Resistant Modalities يعتبر علاجاً مثالياً .

### التفاعلات فيما بين المعالجة الشعاعية والكيميائية :

إن هدف المشاركة ما بين الإسلولين هو تحسين النتائج العلاجية إما بزيادة موت الخلية الورمية أو بالإقلال من سمية النسيج السليمة .

لقد قسم العالم ستيل steel تأثير المشاركة ما بين المعالجة الشعاعية والكيميائية إلى أربع آليات هي :

١- التعاون المكاني Spatial Cooperation ، ويقصد به إذا أخطأ أحد الإسلولين المرض في موقع محدد يمكن أن يعالج بالإسلوب الآخر وهذه الآلية لا تفترض وجود أي تفاعل ما بين العلاجين وكذلك فإن كلاً من العلاجين يعطى بجرعته الكاملة ويتم ذلك بإطالة الفاصل الزمني ما بين المعالجة الكيميائية والشعاعية وتستخدم هذه الطريقة في الحالات التي يكون فيها احتمال وجود المرض خارج الساحة الشعاعية كبيراً أو أن هناك منطقة يتوقع أن تشمل المعالجة الكيميائية في السيطرة على المرض فيها مثل ( الجهاز العصبي المركزي والخصية في ابيضاض الدم اللمفاوي الحاد ) .

٢ - الاختلاف في السمية Toxicity independance ، ويتم في هذه الآلية المشاركة ما بين علاجين فعالين جزئياً ولكل منهما سمية مختلفة وبالتالي يمكن استخدام كلاً منهما بجرعته الكاملة تقريباً . إن الافتراض الهام لهذه الآلية هو أن إضافة المعالجة الكيميائية سوف يؤدي لزيادة موت الخلية الورمية أكثر من الجرعات العالية للمعالجة الشعاعية والتي تؤدي إلى أذية الأنسجة الطبيعية ، وبالرغم من أن أكثر حالات السيطرة الموضوعية بواسطة استخدام المعالجة الشعاعية والكيميائية تتضمن هذه الآلية إلا أن تأثير المعالجة الكيميائية في زيادة قدرة المعالجة الشعاعية على قتل الخلايا الورمية قد يكون ضئيلاً .

لنفترض أن كتلة ورمية وزن ١٠٠ غ ونحوي على ١٪ من الخلايا القادرة على التكاثر clonogenic cell فإن الجرعة الشعاعية اللازمة للسيطرة على هذا الورم إذا كان حساساً للأشعة هي ٦٠ غري تعطى بـ ٣٠ جلسة إذا أضفنا المعالجة الكيميائية وكان معدل الاستجابة الجزئي عند استخدامها لوحدها ٩٠٪ فإن الجرعة الشعاعية اللازمة للسيطرة على نفس الورم يمكن أن نخفضها لـ ٥٤ غري ويمكن أ، نخفض هذه الجرعة لـ ٤٠ غري فقط في حالة كون المعالجة الكيميائية قادرة على تحقيق الاستعابة التامة

complete Response ومن هنا فإن المعالجة يمكن أن تحسن من السيطرة الموضعية على الورم وبجرعات شعاعية متوسطة . في داء هودجكن وفي دراسات مختلفة تبين أنه في حال عدم وجود كتلة منصفية فإن معدل النكس ينخفض من ١٦٪ إلى ٨٪ عند استخدام المعالجة الكيميائية بنظام ( MOPP ) مع المعالجة الشعاعية بجرعة ٤٠ غري ويمكن الحصول على نفس النتيجة بزيادة جرعة الأشعة بمقدار ٥ غري عند استخدام هذه المعالجة لوحدها ولذلك فإنه حتى في أكثر الأورام حساسية للمعالجة الكيميائية مثل اللنفوما وسرطان الرئة صغير الخلايا يميل الكثير من أخصائيي المعالجة الشعاعية لإعطاء الجرعة الشعاعية الكاملة في المشاركة مابين المعالجة الكيميائية والشعاعية للوصول لأعلى نسبة من السيطرة الموضعية .

### ٣ - حماية الأنسجة السليمة من الأذية الشعاعية ،

في بعض التجارب وجد أن المعالجة الكيميائية تزيد من الجرعة الشعاعية التي تتحملها الأنسجة السليمة فمثلاً وجد أن السيكلوفوسفاميد يزيد من حياة الفئران إذا أعطي قبل تشعيع كامل الجسم يوم إلى ثلاثة أيام .

### ٤ - تقوية استجابة الورم للمعالجة ،

وهذه الآلية تعني أن استخدام أحد الأسلوبين ( معالجة كيميائية ) يمكن أن يزيد تأثير الآخر ( المعالجة الشعاعية ) ولذلك فإن المشاركة بين الأسلوبين سوف يؤدي إلى نتائج أفضل من استخدام كل منهما على حدة وهذا المفهوم يجب أن يميز عن زيادة الحساسية sensitization وفي هذه الحالة يكون أحد الأسلوبين غير فعال إذا استخدم لوحده .

### آليات التفاعل بين المعالجة الشعاعية والمعالجة الكيميائية :

هناك عدة آليات ممكنة لتفاعل المعالجة الكيميائية مع المعالجة الشعاعية وتؤدي لتحسين الإستجابة العلاجية وهذه الآليات هي :

- ١ - تعديل انحدار منحنى حياة الخلية وتعديل منحنى الجرعة - الإستجابة للمعالجة الشعاعية ( Dose - Response Curve ) .

٢ - تعديل الـ shoulder في منحنى الجرعة - الإستجابة وذلك بتثبيت ترميم الأذية الشعاعية تحت القاتلة ( sublethal X - ray damage ) .

٣ - تثبيت ترميم الأذية الشعاعية القاتلة المحتملة potentially lethal damage .

٤ - زيادة حساسية الخلايا ناقصة الأكسجة للأشعة بواسطة المعالجة الكيميائية .

٥ - منع حدوث خلايا مقاومة .

٦ - إحداث التزامن الخلوي cell synchrony مما يؤدي لزيادة الإستجابة الخلوية للمعالجة الشعاعية .

٧ - تثبوت عودة تكاثر الورم خلال المعالجة الشعاعية المجزأة Fractionated R.T .

٨ - إن انقاص حجم الورم بواسطة المعالجة الشعاعية يؤدي إلى توزيع أفضل لأدوية المعالجة الكيميائية .

٩ - زيادة الحساسية للمعالجة الشعاعية أو الكيميائية وذلك بانقاص حجم الورم وتحسن الأكسجة .

١٠ - انقاص حجم الورم بواسطة المعالجة الكيميائية يسمح بزيادة الجرعة الشعاعية وباستخدام ساحات أصغر .

**التداخل ما بين الفلورويوراسيل والمعالجة الشعاعية :**

يؤثر دواء الفلورويوراسيل على تركيب الحمض النووي المنقوص الأوكسجين DNA بواسطة تثبيط أنزيم thymidylate synthetase يؤدي لانتاج حمض نووي ناقص RNA وذلك بإدخال 5-Fluorodine Triphosphate لهذا الحمض .

وفي عام ١٩٥٨ لاحظ العالم Heidelberg لأول مرة أن إعطاء المعالجة الشعاعية مع الفلورويوراسيل يؤدي لتراجع في الخلايا الورمية المزروعة في حيوانات التجربة بشكل أكثر من إعطاء المعالجة الشعاعية لوحدها كما لاحظ العالم vietti أن موت خلايا اللمفوما الخبيثة في الفئران بعد تعريضها لجرعة من المعالجة الشعاعية مع إعطاء الفلورويوراسيل يعتمد على الفترة الزمنية فيما بين الإسلوبين العلاجين فعند إعطاء

الفلورويوراسيل قبل المعالجة الشعاعية بـ ٢٠ - ٤٨ ساعة فإنه يقوي من تأثير المعالجة الشعاعية القاتل للخلايا أما التأثير الأقوى فيلاحظ عند إعطاء الفلورويوراسيل بعد خمس دقائق إلى ٨ ساعات من الجرعة الشعاعية ويعتقد أن هذا التأثير المقوي لفعل الأشعة على الخلية بعد إعطاء الفلورويوراسيل مع المعالجة الشعاعية ناجم عن تثبيط في ترميم الأذيات الشعاعية غير القاتلة . كما أثبتت الدراسات الأخرى على أنه يجب أن يبلغ تركيز الفلورويوراسيل في الدم حداً يؤدي لحدوث بعض السمية حتى يؤدي لتغير ملحوظ في انحدار منحنى حياة الخلية للمعالجة الشعاعية ( RT survival curve ) كما لوحظ أن الفلورويوراسيل يؤثر على كل من الخلية المؤكسجة والخلية قليلة الأكسجة وبالتالي يمكن الاستفادة منه في زيادة حساسية الخلايا قليلة الأكسجة للمعالجة الشعاعية ومن هنا يمكن أن نستنتج أن التأثير المقوي للمعالجة الشعاعية لدواء الفلورويوراسيل يعتمد كلياً على تركيزه في الدم وعلى مدة التعرض له .

يمكن أن تكون المشاركة ما بين المعالجة الشعاعية والتثريب الوريدي المستمر للفلورويوراسيل فعالة في السيطرة المرضية على سرطانات المري والشرح كما يمكن أن تكون فعالة في سرطانات المعدة والبنكرياس .

#### التفاعل ما بين المعالجة الشعاعية والميسبلاتين ( cisplatin ) :

لقد أثبتت المعلومات السريرية والتجريبية على أن السيسبلاتين يقوي من تأثير المعالجة الشعاعية ففي عام ١٩٧١ لاحظ العالمان zak و drobnik أن الوفيات الناجمة عن تشعيع كل الجسم عند الفتران زادت بإضافة السيسبلاتين كما لوحظ أن إعطاء السيسبلاتين قبل المعالجة الشعاعية يؤدي إلى زيادة انحدار منحنى الجرعة - الاستجابة للمعالجة الشعاعية Dose - Response curve ويمكن أن يقوي تأثير المعالجة الشعاعية إذا أعطي بعدها .

ولكن من المهم أن نذكر أن زيادة أذية النسيج الطبيعية عند استخدام السيسبلاتين مع المعالجة الشعاعية ناجم عن قتله للخلايا بشكل مستقل وليس عن تقوية تأثير



الأشعة ولذلك فإن الارتكاسات الحاصلة في نقي العظم والجلد والرئة لم تختلف في حالة المشاركة عن تلك التي تحدث في المعالجة الشعاعية لوحدها وأكثر الإستخدامات السريية لهذه المشاركة في سرطان الرئة صغير الخلايا - المثانة - وسرطانات الرأس والعنق .

- اعتلال العضلة القلبية الناجم عن المشاركة ما بين المعالجة الشعاعية والأدرياميسين .  
الأذية القلبية هي أحد الآثار المتأخرة للمشاركة ما بين المعالجة الشعاعية والأدرياميسين وهذا الأخير دواء مضاد للسرطان يعمل على تثبيط تركيب الـ DNA وسميته على العضلة القلبية ناجمة عن تشكل الجذور فائقة الأكسدة Super Oxide Radical بواسطة مركب Doxorubicin - Iron complex كما برهنت جميع الدراسات في الحيوان والإنسان على أن سمية الأدرياميسين على العضلة القلبية تنجم عن انحلال الألياف العضلية دون التأثير على النسيج الضامة أما الأذية القلبية الناجمة عن المعالجة الشعاعية فهي بسبب تأثير الأشعة على النسيج الضامة وحدوث التليف المنتشر في هذه الأنسجة وعند مشاركة الأدرياميسين والمعالجة الشعاعية تزداد السمية على العضلة القلبية .

## مبادئ المعالجة المناعية - معدلات الإستجابة الحيوية

### Biologic Response Modifiers - Immunotherapy

إن المعالجة التقليدية للسرطان تشمل على ثلاثة أنماط الجراحة - المعالجة الشعاعية والمعالجة الكيميائية وخلال السنوات القليلة الماضية تم إضافة غمطاً رابعاً ألا وهو المعالجة الحيوية biotherapy وهي لاتشمل فقط مناعة الورم tumor immunology وإنما مشتقة أيضاً من الحيوية الجزيئية molecular biology والوراثة .

أما معدلات الإستجابة الحيوية biologic response modifiers فهي عبارة عن مركبات حيوية طبيعية يمكن بواسطتها أن تغير من ارتكاس الإنسان للورم وبالتالي تؤدي لحدوث تأثير مضاد للورم .

الانتروفيرون Interferon :

وهي عبارة عن عائلة من البروتينات glyco proteins تمتلك تأثيراً مضاداً للحمات الراشحة وللأورام وصفات معدلة للإستجابة المناعية اكتشفت هذه العائلة لأول مرة في عام ١٩٥٧ بواسطة العالمان Isacs و Lindenman خلال تماريهما على الحمات الراشحة ثم بعد ذلك وخلال ٣٠ سنة من التجارب تم التعرف على تأثيرها الحيوي في معالجة الأحماج والاضطرابات المناعية وبعض الأمراض الخبيثة .

هناك ثلاث أنواع للانترفيرون :

ألفا (  $\alpha$  ) - بيتا (  $\beta$  ) وغاما (  $\gamma$  ) وتختلف فيما بينها بالتأثير الحيوي والصفات الكيميائية ، وبالرغم من أن الآلية المضادة للأورام للانترفيرون لاتزال غير معروفة إلا أن الكثير من المعلومات تم الحصول عليها عن تأثيره على نمو الخلية . على الرغم من أن هناك أكثر من ٢٢ نوع للانترفيرون إلا أنه حتى وقتنا الحاضر فإن أكثرها استخداماً هو الانترفيرون ألفا -  $2A^1$   $\alpha$  Interferon والانترفيرون ألفا -  $2B$   $\alpha$  Interferon وكلا النوعين يتمتعان بفعالية تقارب  $2 \times 10^6$  وحدة لكل ملغ

من البروتين .

التجارب السريرية الأولية للانترفيرون كانت لتحديد الجرعة القصوى التي يمكن تحملها والسمية والجرعة المثالية واستخدم عند المرضى المصابين بالآفات الدموية الخبيثة وبعض الأورام الصلبة بعد تعرضهم للنكس التالي للعلاجات المختلفة ولوحظ أن أكثر الآثار الجانبية التي تحد من زيادة الجرعة هي الحمى المترافقة مع التعب العام والعرواءات كما لوحظ أن تحمل الدواء يكون أفضل إذا أعطي بالحقن العضلي أو تحت الجلد ولثلاث جرعات اسبوعية ( الفاصل بين كل جرعة أقل من ٣ أيام ) .

- الإستخدامات السريرية :

١- ابيضاض الدم بالخلايا للشعر **Hairy cell leukemia** :

وهو من الأمراض الدموية الخبيثة النادرة يتميز بانخفاض الخلايا الشامل مع زيادة خلوية النقي ووجود الخلايا المشعرة **Hairy cell** و ضخامة الطحال .

في البداية كان العلاج هو استئصال الطحال وفي عام ١٩٨٤ عالج العالم Quesada ٧ مرضى بالانترفيرون الفا بجرعة ٣ مليون وحدة يومياً ولاحظ استجابة تامة عند ثلاثة مرضى واستجابة جزئية عند الباقي بعد ٨ - ١٢ إسبوع من المعالجة ثم استمر بالعلاج سواء بالجرعة اليومية أو ثلاث جرعات اسبوعياً لمدة ٦ أشهر وهذا مادفع العلماء للاهتمام بعلاج باقي أنواع الأيضاضات واللمفوما بالانترفيرون .

ثم تالت التجارب السريرية بعد ذلك باستخدام الانترفيرون المصنع ( الفا - ٢ أ والفا ٢ ب ) في علاج ابيضاض الدم بالخلايا المشعرة و بجرعة تتراوح ما بين ٢ - ٣ مليون وحدة يومياً ولثلاث جرعات اسبوعياً ولمدة ٦ أشهر على الأمل ولوحظ أن نسبة الإستجابة تصل حتى ٨٠ - ٩٠٪ ومعظم المرضى يحدث لديهم المحجوع الجزئي، ويمكن أن تستمر المعالجة حتى ٨ أشهر أما نسبة النكس بعد إيقاف المعالجة فتتراوح ما بين ١٣ و ٤٥٪ والفترة الزمنية الوسطية لحدوث النكس تتراوح ما بين ٧ - ٢٤ شهر أما الجرعة المثالية للانترفيرون فهي ٢ مليون وحدة / ٢م ثلاث مرات اسبوعياً .

ولاتزال الدراسات العديدة قائمة لمقارنة العلاجات المختلفة مثل مشاركة الانترفيرون واستئصال الطحال أو المشاركة مابين الانترفيرون والعناصر الكيميائية الأخرى مثل ( البتوستاتين ) .

## ٢ - الابيضاض النقوي المزمن CML :

هناك عدة دراسات سريرية تمت لمعرفة تأثير الانترفيرون في معالجة ابيضاض الدم النقوي المزمن وبجرعة تتراوح ما بين ٣ و ٩ مليون وحدة حقناً عضلياً أو تحت الجلد يومياً أما معدل الإستجابة فيتراوح ما بين ٥٠ و ٧٠٪ بعد فترة وسطية ٣ - ٤ أشهر ولوحظ أن فترة الهجوم تصل حتى الثلاث سنوات أما مايميز الانترفيرون عن باقي الأدوية الكيميائية بالنسبة لمعالجة ( CML ) هو أن المرضى المستجيبين للانترفيرون لوحظ أن عند ٣٣ إلى ٥٠٪ منهم اختفاء صبغي فيلادلفيا بعد ٩ أشهر ( كفترة وسطية ) من المعالجة .

أما الدراسات الحديثة فتحاول تقييم استخدام الانترفيرون الفأ وغاما واستخدام الانترفيرون مع الأدوية الأخرى مثل هيدروكسي يوريا و arac ( سيتوزين أرابينوزيد ) وكلها دراسات تبشر بأمل زيادة معدل الحياة .

## ٣ - اللمفوما Lymphoma :

التجارب السريرية الأولية في معالجة اللمفوما لاهودجكن بالانترفيرون أظهرت فعالية جيدة في بعض الأنواع النسيجية مثل النوع العقدي قليل الخبث Low Grade Nodular Lymphoma وفي اللمفوما الجلدية بالخلايا التائية T cell lymph بالمقابل لم يلاحظ أي استجابة في اللمفومات عالية الخبث High Grade Diffuse المنتشرة وفي ابيضاض الدم اللمفاوي المزمن . أما الجرعة المستخدمة في علاج اللمفوما فكانت تتراوح ما بين ٢ مليون وحدة / م<sup>٢</sup> و ٥٠ مليون وحدة لكل م<sup>٢</sup> ثلاث مرات اسبوعياً وفي الجرعات العالية كان هناك ضرورة لتخفيض الجرعة في معظم الأحيان بسبب الأعراض السمية أما مدة المعالجة تتراوح ما بين ٤ و ٣٦ شهر وبمعدل وسطي ١٨ شهر تقريباً ولوحظ أن العوامل التي تساعد على توقع الإستجابة وهو الشكل العقدي نسيجياً وعدم وجود

معالجة كيميائية سابقة وحالياً يتم تقييم إعطاء الانترفيرون مشاركة مع المعالجة الكيميائية إما بشكل مترافق أو كعلاج صيانة .

#### ٤- الداء النقوي العنيد Multiple Myeloma :

لوحظ أن المعالجة بالانترفيرون للداء النقوي يمكن أن تؤدي لمعدل استجابة ما بين ١٥ و ٣٠٪ كما أن الجرعة المثالية هي ٢ - ٣ مليون وحدة / ٢م يومياً ولثلاث مرات اسبوعياً وإذا استمر العلاج كصيانة لوحظ أن أكثر من ٥٠٪ من المرضى المستجيبين للمعالجة يبقى المرض لديهم حاجعاً لأكثر من سنة ولوحظ أن هناك زيادة في معدل الاستجابة عند مشاركة الانترفيرون والمعالجة الكيميائية .

#### ٥- سرطان الكلية Renal cell carcinoma :

التجارب السريرية الأولية أظهرت أن الانترفيرون يمكن أن يؤدي لمعدل إستجابة ضئيل في سرطان الكلية المتأخر ( معدل الإستجابة يتراوح ما بين ٢٠ و ٣٠٪ ) أما الجرعة فتراوح ما بين ٥ - ١٠ مليون وحدة في اليوم ومؤشرات الإستجابة هي استئصال الكلية - الحالة العامة الحسنة - وجود نقائل رئوية متفرقة ولوحظ أن الإستجابة تحدث متأخرة بعد تسعة أشهر تقريباً .

#### ٦- الميلانوم Melanoma :

التجارب الأولية في معالجة الميلانوم المتفصل بالانترفيرون كانت مخيبة للآمال وربما كانت بسبب إستخدام جرعات قليلة وفترات قصيرة إلا أن التجارب السريرية الحديثة باستخدام الانترفيرون ألفا وجرعات عالية وفترات أطول حققت معدل إستجابة يتراوح ما بين ٥ و ٢٩٪ ( وسطياً ١٩٪ ) أما الجرعة المستخدمة فكانت ما بين ١٠-١٨ مليون وحدة كل يومين وتعطى إما عضلياً أو وريدياً ولمدة ٣ إلى ٦ أشهر .

#### ٧- الأورام الأخرى :

يمكن أن يستخدم الانترفيرون في معالجة غرن كابوزي - سرطان المثانة وسرطان المبيض الناكس وفي دراسة تم فيها إعطاء الانترفيرون لمعالجة غرن كابوزي المترافق مع الايدز

تبين أن هناك معدل إستجابة يصل حتى ٣٤ إلى ٤٠٪ والجرعة المستخدمة هي ٥٠ مليون وحدة يومياً وتترافق مع نسبة عالية من الأعراض السمية أما الدراسات الأخرى فأثبتت فعالية الانترفيرون إذا أعطي حقناً موضعياً في المثانة لعلاج الأورام السطحية وكذلك لإعطائه حقناً داخل البيريتوان في علاج سرطان المبيض المنتشر .

#### الانترلوكين interleukin :

وهي عبارة عن بروتينات تفرز من الكريات البيض وتؤثر على نمو ووظيفة الكريات البيض المختلفة وهناك تسع أنواع للانترلوكين إلا أنه فقط لانترلوكين - ٢ . يمكن أن يستخدم في التجارب السريرية وهو يفرز بشكل أساسي من الخلايا T المساعدة وكذلك من الخلايا للمفاوية في اللوزة والطحال وتأثيره الحيوي يشمل على تقوية الفعل الحال للخلايا T وإنتاج باقي أنواع الـ lymphokines مثل الانترفيرون ألفا وعامل تموت الورم Tumor Necrosis Factor وعوامل النمو للخلايا B والخلايا القاتلة الطبيعية Natural Killer cells وفي عام ١٩٨٤ تم إنتاج الانترلوكين - ٢ - بكميات كبيرة تسمح بإجراء التجارب السريرية وبدأت، فعلاً الدراسات وتبين على أن إعطاء الانترلوكين يترافق بآثار جانبية وخاصة عندما يعطى بجرعة عالية ١٠,٠٠٠ وحدة / كغ في الساعة بثرية وريدي مستمر ومن هذه الآثار انخفاض التوتر الشرياني - وذمة الرئة - زيادة الوزن - شح البول إلا أنه لوحظ أن معدل الإستجابة يصل حتى ٣٥٪ في بعض الحالات الخبيثة .

#### عامل تموت الورم Tumor Necrosis Factor :

اكتشف لأول مرة عند الفئران المحقونة بـ BCG ولوحظ أن أصل المرض من هذه الفئران وحققها في الفئران المصابة بالساركوما تموت نزفي للورم ومن هنا جاء اسمه عامل تموت الورم ويوجد نوعين عامل تموت الورم ألفا (  $\alpha$  ) الذي ينتج من وحيدات النوى Monocyte وعامل تموت الورم بيتا (  $\beta$  ) ( وتسمى اللمفوتوكسين Lymphotoxine ) وينتج بتثبيته الخلايا للمفاوية T وتأثيرها الحيوي هو تقوية تأثير بعض

الأدوية الكيميائية ويتداخل مع الانتزفيرون وخاصة غاما والانتزفولوكين .  
أكثر الآثار الجانبية هي الحمى - التعب العام - انخفاض التوتر الشرياني والصداع،  
الجرعة القصوى هي ٢٠٠ ميكرو غرام / ٢م في اليوم بالحقن الوريدي .  
تم تجريبه على معظم الأورام وخاصة سرطان المستقيم والكولون - سرطان الثدي  
- الميلانوم - سرطان الكلية ويتم حالياً دراسة مشاركته مع الانتزفيرون ألفا  
والانتزفولوكين.

#### الأضداد وحيدة النسيلة Monoclonal antibodies :

في عام ١٩٧٥ وصف العالمان كوهلر kohler وميلستين milstein تقنية جديدة  
لإنتاج الأضداد وحيدة النسيلة مما فتح أبواباً جديدة في تشخيص وعلاج السرطان .  
الأضداد عبارة عن غلوبولين مناعي immunoglobuline ينتج بواسطة الخلايا اللمفاوية ( B )  
أو من الخلايا البلازمية عند حدوث تنبيه بواسطة مستضد ( حمى راشحة - أو جرثوم -  
جزئي ) فهذه الأضداد يمكن أن يكون لها تأثيراً حاداً للخلايا cytolytic بتأثيرها مع  
المستضد على سطح الخلية وتؤدي لحدوث أذية الغشاء الخلوي وبالتالي لموت الخلية .  
تتكون الأضداد وحيدة النسيلة من سلسلتين خفيفتين وسلسلتين ثقيلتين  
وتشكلان جزئين الجزء ( Fab ) ويعتبر الموقع الذي يتم فيه الاتحاد مع المستضد والجزء  
Fc وهو موقع الاتحاد مع المتممة أو الخلايا الحالة المؤثرة ( البالعات ) .

هناك خمس أنواع تقليدية للغلوبولين المناعي ( IgD - IgE - IgA - I gG- IgM )  
وأكثرها شيوعاً هي IgM وتختلف بقدرتها على تثبيت المتممة والارتباط مع الخلايا  
الحالة المؤثرة lytic effective cells فمثلاً الـ IgM يمكن أن يثبت المتممة بشكل فعال  
ولا يمكن الارتباط بالخلايا الحالة المؤثرة .

- أول الأضداد المستخدمة في التجارب السريرية كانت الأضداد وحيدة النسيلة الفأرية  
Murine وأكثر الحالات الخبيثة قابلية للعلاج هي ابيضاض الدم واللمفوما وأكثر  
الصعوبات هي توزيع وإيصال الأضداد إلى الورم - الارتكاسات التحسسية - إنتاج

أضداد إنسانية للأضداد الفأرية Human anti murine antibodies .

وتغير في المستضد الورمي ، حيث لوحظ غياب عابر للمستضد السطحي للخلية الورمية بعد التعرض للأضداد .

في عام ١٩٨١ عولج أول مريض مصاب بلمفوما جلدية cutaneous T cell lymphoma بواسطة الأضداد من قبل العالمين ميلر miller وليفني levy حيث أعطي ١٧ جرعة وريدية من الأضداد بدأت بـ ١ ملغ وزيدت تدريجياً حتى الـ ٢٠ ملغ وبعد كل جرعة كانت الكريات البيض تهبط ولكن تعود للطبيعي بعد ٢٤ - ٤٨ ساعة أما طريقة الإعطاء هي جرعتين اسبوعياً ولم يلاحظ أي آثار جانبية مزعجة كما لوحظ إستجابة جزئية يتراجع التضخمات العقدية والآفات الجلدية بالإضافة لاستخدام الأضداد في معالجة السرطان بتأثيرها المناعي يمكن إستخدامها كحوامل للمواد الكيميائية السامة للخلية أو للعناصر المشعة ، فخلال العقود الماضية أقيمت عدة دراسات سريرية تستخدم الأضداد الموسومة بالعناصر المشعة والأضداد الوحيدة النسيطة الموسومة للكشف عن السرطان وأكثر العناصر الشعاعية إستخداماً هو اليود المشع ١٣١ <sup>131</sup>I و ١٢٥ <sup>125</sup>I - الانديوم ١١ <sup>111</sup>In والتكنسيوم <sup>99m</sup>Tc إلا أن هناك عدة صعوبات تقنية تعترض إستخدام الأضداد وحيدة النسيطة في التجارب السريرية .

أول هذه الصعوبات هي تفاعل الأضداد مع النسيج السليمة - وكيفية رسم هذه الأضداد والتوزيع الحيوي داخل الجسم وبالرغم من كل هذه الصعوبات إلا أن بعض الدراسات حققت نتائج جيدة في تحديد موقع الورم بواسطة الأضداد الموسومة .

سجل العالمان Goldenberg و Deland نتائجهما التجريبية على ٤٠٠ مريض باستخدامها أضداداً موسومة خاصة بالمستضدات الورمية مثل : CEA - ألفا فيتو

بروتين CSAP - HCG - AFP و ( PAP ) prostatic Acid Proosphatase .

أكبر مجموعة لديهما كانت سرطان المستقيم والكولون حيث كان معدل الإصابة يصل حتى ٩١٪ وتم تحديد موقع السرطان البدئي والنقائل وتم الحصول على نتائج



مشابهة بوسم أضداد AFP ( ألفا فيتو بروتين ) لكشف أورام الخلايا المولدة وأورام الكبد .

كما تمت خلال العقود الماضية عدة دراسات سريرية لتقييم استخدام الأضداد الموسومة في معالجة السرطان وسميت هذه الطريقة المعالجة المناعية الشعاعية Radioimmun othcrapy ففي مشفى Holkins تم استخدام اليود المشع  $^{131}\text{I}$  ( في علاج أورام الكبد حيث بدأ العلاج بالأشعة الخارجية والمعالجة الكيميائية ثم بعد ذلك أعطي ٣٠ ملي كوري من اليود المشع  $^{131}\text{I}$  في اليوم الأول و ٢٠ ملي كوري في اليوم الخامس مما أدى لإعطاء ١٠٠٠ - ١٢٠٠ راد للورم وتم تحقيق ٥٠٪ كمعدل إستجابة وكانت السمية الكبدية مقبولة ثم بعد ذلك قام العالم PRESS باستخدام أضداد antiCD - 37 monoclonal antibodies الموسوم باليود المشع  $^{131}\text{I}$  في علاج ١٠ مرضى مصابين بلمفوما لاهودجكن والجرعة المستخدمة هي ٥ - ١٠ مغ / كغ من الأضداد الموسومة بـ ٥ - ١٠ ملي كوري من اليود المشع  $^{131}\text{I}$  وحدث الهجوع التام عند كافة المرضى واستمر هذا الهجوع لأكثر من ٤ أشهر .

أكثر الآثار الجانبية هي تثبط نقي العظم مما أدى إلى إجراء زرع نقي العظم عند اثنين من المرضى ويمكن أيضاً حقن الأضداد الموسومة داخل الأجواف مثل حقن أضداد الموجهة ضد خلايا سرطان المبيض الموسومة باليود المشع داخل البيريتوان أو حقن الأضداد داخل الشريان .

يمكن إستخدام الأضداد وحيدة النسيلة كحوامل للمواد الكيميائية السامة التي تسمى السموم المناعية ( immunotoxins ) وهي عبارة عن بروتينات سامة مشتقة من مزارع البكتريا وأكثرها شيوعاً : Ricin - abrin - dephteria toxin - saporin - amanitin و pseudomonas toxin ، هذه السموم هي عبارة عن حمائر ( أنزيمات enzymes ) تحتاج إلى نقل للداخل الهبولي وهناك يبدأ عملها بتثبط تركيب البروتين وهي تعمل على الخلية غير المنقسمة بخلاف باقي الأدوية الكيميائية ومعظم هذه





السموم مكونة من ببتيدات عديدة وتشمل على سلسلتين سلسلة ألفا (  $\alpha$  ) وهي الجزء الفعال الذي يثبط تركيب البروتين وسلسلة بيتا وهي المسؤولة عن الارتباط بسطح الخلية ويمكن حديثاً ربط سلسلة ألفا بالأضداد الوحيدة النسيلة والموجهة ضد مستضد ورمي معين واستخدامها في معالجة هذا الورم ، أما أهم الصعوبات التي تواجه هذه الطرق فهي أن السموم المناعية هي جزيئات ثقيلة وتوزعها الحيوي محدود كما أنها مستضدات قوية تولد عند المضيف إستجابة مناعية بإنتاج الأضداد وإتحادها مع هذه المركبات وبالتالي الإقلال من مدة تأثيرها .

# الادوية المستخدمة في المعالجة الكيميائية

## Chemotherapeutic Drugs

أولاً : العوامل المقلونة alkylating agents :


وتعمل على الحمض النووي المنقوص الأوكسجين DNA حيث ترتبط به عن طريق مجموعة alkyl وهي مجموعة تشترك فيما بينها بآلية التأثير وتختلف عن بعضها البعض بالخصائص الدوائية والسمية .



شكل ٥ يبين تركيب أدوية مجموعة العوامل المقلونة

## ١ - السيكلوفوسفاميد cyclophosphamide :

ويمكن أن يعطى وريدياً وعن طريق الفم بعد التأكد من تعداد الدم العام وبأنه ليس هناك أي علامات تخفاف أو انسداد في الجهاز البولي وقد يحتاج الأمر لوضع قطره بولية لمنع حدوث التهاب المثانة النزفي Haemorrhagic cystitis كما أن الحقن الوريدي خلال فترة أقل من ٥ إلى ١٠ دقائق قد يؤدي إلى أعراض جهازية مثل الغثيان والقيء . يستقلب هذا الدواء في الكبد وينشط بواسطة الخمائر الكبدية .



الشكل رقم ٦ يبين استقلاب السيكلوفوسفاميد

إن التأثير المضاد للسرطان لهذا الدواء ينجم عن فعالية المستقلب ٤ - هيدروكسي سيكلوفوسفاميد والـ phosphamide mustard وهناك عدة عوامل تؤثر على حركية الدواء داخل الجسم فلقد لوحظ أن إعطاء الباريبورتات يقصر من نصف العمر plasma half - life أما السيميتدين cemitidine فيطيل من نصف العمر ويزيد من المساحة تحت المنحنى area under the curve ( auc ) للهيدروكسي سيكلوفوسفاميد .

الفشل الكلوي يزيد من مستقلبات السيكلوفوسفاميد وكذلك الفشل الكبدي الشديد وكلا الحالتين تزيد من نصف الزمن اللازم لإزالة الدواء من الجسم .  
- الآثار الجانبية : تساقط الشعر - غثيان - إقياء - تثبيط نقي العظم - تليف رئة والتهاب رئة خلالي - التهاب المثانة النزفي - تثبيط المناعة - ونادراً الصدمة التأقية anaphylaxia .  
- السمية القلبية : شوهدت بعض الحالات عند استخدام الجرعات العالية قبل زرع النقي .

- زيادة إمكانية حدوث السرطان مثل سرطان المثانة - اللمفوما وإبيضاض الدم .  
- الإستطبابات : يستخدم كدواء وحيد أو في المشاركة لعلاج اللمفوما - سرطان الرئة صغير الخلايا وورم الأرومة العصبية neuroblastoma - إبيضاض الدم اللمفوي الحاد - ايزينغ Ewing's sarcoma - سرطان الثدي - سرطان المبيض - سرطان بطن الرحم ويمكن أن يستخدم كمشاركة دوائية في علاج حالات سرطانية أخرى .

- الحالات غير السرطانية : يستخدم كمثبط للمناعة ويشارك مع اليريدنزولون أو السترويدات الأخرى ويعتبر السيكلوفوسفاميد الدواء الأساسي لعلاج wegner's granulomatosis وهو عبارة عن ورم قاتل في حالة عدم إعطاء المعالجة الكيميائية ويستخدم أيضاً السيكلوفوسفاميد في الأمراض الرئوية Rheumatic Diseases مثل التهاب المفصل الرثوي والتهاب المفصل العديد العقدي والتهاب الأوعية والذآب الحمائي ( L . M ) وباقي أدواء النسيج الضامة إلا أن آثاره الجانبية المتقدمة تمنع من استعماله بشكل روتيني في علاج هذه الأمراض وحديثاً يتم دراسة تأثيره في علاج

التصلب العنيد Multiple Sclerosis وعلى الرغم من تأثيره وقدرته على اختراق الحواجز الدماغية إلا أن دوره لا يزال غير واضح .

## ٢ - كلور امبيوسيل Chloram Bucil :

. حركية الدواء pharmacokinetics :

بعد إعطاء الدواء عن طريق الفم بجرعة ٠,٦ مغ / كغ فإن ذروة تركيزه في البلازما ( ١,١ + - ٠,٦ ميكرو غرام / مل ) ويصل إلى أعلى تركيز في البلازما خلال ٤٠ - ٧٠ دقيقة عند إعطائه بجرعة فموية ١٥ - ٣٠ / ٢م .

. الآثار الجانبية : تثبيط نقي العظم - نقص الخلايا الشامل ويمكن أن يستمران لفترة طويلة بعد إيقاف الدواء. عند عطاء الدواء بشكل مستمر ويومياً فإن ذلك يتطلب إجراء تعداد دم عام مرتين اسبوعين ومن خلال ذلك تعدل جرعة الدواء يمكن أن يؤدي لانخفاض في الحيوانات المنوية بجرعة كلية تفوق ٤٠٠ مغ أماعند النساء فيمكن أن يؤدي الدواء لانقطاع الطمث المؤقت أو الدائم ويمكن أن يؤدي لأذية الجنين عند الحوامل ( تشوهات خلقية ) .

يمكن أن يحدث الغثيان والإقياء وكذلك الإسهال وتقرحات الفم - سجلت حالات من تليف الرئة والتهاب الرئة الخلالي interstitial pneumonitis وقد يؤدي لإعتلال أعصاب محيطي والاختلالات عند الأطفال والبالغين .  
- هناك زيادة بمعدل الإصابة بورم خبيث ثاني وخاصة ابيضاض الدم غير اللمفاوي الحاد ( ANLL ) .

. الاستطبابات : ١ - ابيضاض الدم اللمفاوي المزمن بجرعة يومية ٠,١ مغ / كغ أو بجرعة ٣٠ مغ / ٢م جرعة واحدة كل اسبوعين مع البيريدينزولون ٨٠ مغ يوميا لمدة ٥ أيام .

٢ - اللمفومات قليلة الخبيث وكلدواء وحيد

- ٣ - داء هودجكن يعطى مشاركة مغ باقي الأدوية ( CHLVPP ) مثل الفنبلاستين + Vinblastine + procarbazine والبريدنيزولون .
- وهذه المشاركة يمكن أن تكون فعالة مثل النظام العلاجي MOPP ولكن بسمية أقل .
- ٤ - سرطان المبيض واحمرار الدم Polycythemia vera ولكن استخدامه في هذه الأمراض استعيز عنه حديثاً بأدوية أخرى أكثر فاعلية .
- ٣ - بوسلفان Busulfam ( Myleran ) :
- الإمتصاص الفموي لهذا الدواء تام وهذا ماأثبتته الدراسات للبوسلفان الموسوم بالعنصر المشع  $H^3$  والكربون المشع  $C^{14}$  .
- السمية ، Toxicity ، نقص الخلايا الشامل pancytopenia مغ نقص في خلوية النقي إذا استمر إعطاء الدواء بالرغم من هبوط قيم تعداد الدم . وفي مرض ابيضاض الدم النقوي المزمن والمعالجين بهذا الدواء تنخفض لديهم الكريات البيض حتى بعد إيقاف الدواء لفترة طويلة لذلك يجب إيقاف الدواء عندما يصبح تعداد الكريات البيض ١٥,٠٠٠ - ٢٠,٠٠٠ كرية / م .
- تساقط الشعر Alopecia غير شائع الحدوث .
- تشوهات في الجنين إذا استخدم عند الحوامل .
- فرط التصبغ الجلدي عند ٥ - ١٠٪ من المرضى المعالجين بهذا الدواء .
- الساد cataracts وخاصة من الإستخدام المديد للبوسلفان .
- متلازمة أديسون الناجمة عن نقص نشاط النخامة الثانوي يمكن أن تحدث بعد الإستخدام المديد للبوسلفان وهي قابلة للتراجع بعد إيقاف الدواء .
- السمية الرئوية لوحظت عند ٤٪ من المرضى وهي لاتستجيب للمعالجة بالستروئيدات وغالباً ماتكون مميتة .
- السمية نادرة إذا كانت الجرعة الكلية للبوسلفان أقل من ٥٠٠ مغ .

- يمكن أن يؤدي البوسلفان لحدوث ابيضاض دم وكذلك انقطاع الطمث والعقم عند النساء وتندرة الحيوانات المنوية وضمور الخصية عند الذكور .

الإستطبابات : بعد استخدام الانترفيرون ألفا وزرع نقي العظم في الحالات المستقرة من ابيضاض الدم النقوي المزمن أصبح استخدام البوسلفان أقل شيوعاً من السابق بالإضافة إلى أن الهيدروكسي يوريا Hydroxy urea أقل سمية ويعتبر البديل عند عدم التحمل للانترفيرون ألفا أو لزرع نقي العظم وفي عدة دراسات لم يكن واضحاً أن البوسلفان يؤدي لزيادة معدل الحياة في ابيضاض الدم النقوي المزمن .

حديثاً يتم اعطاء Busulfan بجرعات عالية مشاركة مع السيكلوفوسفاميد والـ Etoposide قبل زرع نقي العظم والجرعة المستخدمة في هذه الحالة ١٦ مغ / كغ على أربعة أيام بالنسبة للدواء Busulfan و ١٢٠ مغ / كغ على يومين للسيكلوفوسفاميد .

#### ٤ - الميلفالفان ( Melphalan ) ( alkeran ) :

وهو دواء شديد الارتباط بالبروتين وخاصة الألبومين ولا يرتبط مغ الغلوبولين المناعي .

السمية : بعد الجرعة الدوائية النظامية ٠,٢٥ مغ / كغ يومياً لمدة ٤ أيام أو ١,٢٠ مغ / كغ يومياً لمدة ٥ أيام فإن أكثر الآثار الجانبية تحديداً للجرعة هو تثبيط نقي العظم .

- التهاب الفم - الغثيان - الإقياء - الإسهال - ولكنها غير شائعة نسبياً .

- تساقط الشعر وخاصة بالجرعات العالية المستخدمة قبل زرع نقي العظم .

- اندفاعات جلدية - التهاب الأغشية - تليف الرئة وكلها آثار جانبية نادرة .

- امكانية حدوث ابيضاض دم غير لمفاوي حاد .

- إنقطاع الطمث وعادة دائم عند النساء في سن النشاط التناسلي والمعالجين بلملفالفان من أجل سرطان الثدي .

#### الإستطبابات : indications

الميلفالفان والريدينزولون هما العلاجين الأساسيين للداء النقوي المتعدد ،



والميلفалан فعال أيضاً في سرطان الثدي والمبيض إلا أن المشاركات الحاوية على السيسبلاتين أكثر فعالية . وخاصة للمرحلة الثالثة والرابعة من سرطان المبيض .  
- بالجرعات العالية المستخدمة قبل زرع النقي لوحظ أن للميلفان تأثيراً على الميلايوسوم وسرطان الكولون وهو غير فعال بالجرعات النظامية .  
- يمكن أن يكون فعالاً في سرطان الثدي ويكون أكثر فاعلية بالجرعات العالية .  
- بالرغم من معدل الإستجابة العالي ٥٠٪ من الأورام الصلبة إذا استخدم بجرعات عالية ويعقبها زرع النقي إلى أن مدة الإستجابة قصيرة مما يجعل دوره في معالجة الأورام الصلبة و بجرعات عالية بحاجة للإثبات .

#### ٥ - ثيو تيبا Thiotepe :

وهو من أقدم العوامل المقلونة ومتوفر منذ أكثر من ٣٠ سنة ويحتاج لتنشيط استقلابي ليقوم بتأثيره المضاد للأورام .  
السمية ، عند استخدامه كدواء وحيد بجرعة تتراوح ما بين ١٢ مغ / ٢م و ١٥ مغ / ٢م كجرعة واحدة single dose ويمكن إعطائه بجرعة ٠,٣ - ٠,٤ مغ / كغ كل ٣-١ اسبوع اعتماداً على درجة تثبيط نقي العظم . الجرعات العالية ( ٧٥ مغ/ ٢م ) يمكن أن تتزافق بتثبيط شديد في نقي العظم - تساقط الشعر - التهاب الفم - أما الآثار السمية العصبية فهي غير شائعة بجرعة أقل من ٦٠ مغ / ٢م .  
- الغثيان والإقياء شائعين بالجرعات العادية ولكنها تستجيب لمضادات الإقياء .  
- الطفح الجلدي نادر الحدوث .  
- الاختلاطات العصبية - اختلاجات وتغيم الوعي وخاصة في الجرعات العالية ١٠٠ مغ/ ٢م وما فوق .  
- الإستطبايات indication : - سرطان الثدي : كدواء وحيد أو في مشاركة دوائية و بجرعات نظامية .  
- يمكن استخدامه حقناً في السيساء أو في الجنب أو في اليريتوان ( الحقن داخل الجنب

ليس أكثر فاعلية من حقن التتراسيكلين ) .

حقن الثيوتيبيا داخل اليريتوان يؤدي إلى دخوله السريع إلى الدم وبالتالي حدوث تثبيط نقي العظم .

- الحقن داخل المثانة في السرطانات المبكرة وهو فعال مثل الميتومايسين و أقل سمية منه ويمكن أن يحدث تثبيط نقي العظم في هذه الحالة لذلك يجب أن يجرى تعداد الدم العام قبل الحقن .

٦ - إيفوسفاميد Ifosfamide ( Holoxan ) :

ينشط هذا الدواء بواسطة حمائر الكبد ويتم التنشيط الأولي بدخول الهيدروكسيل على ذرات الكربون الأربعة الموجودة في حلقة ال oxazaphorine .

السمية toxicity : عند استخدامه كدواء وحيد فإن جرعته هي ١,٢ - ٢ مغ / ٢م بالوريد يومياً ولمدة ٤ - ٥ أيام ويمكن إعطاء جرعة واحدة كبسولة ٥ مغ / ٢م خلال ٢٤ ساعة .

إعطاء الدواء عن طريق الفم وبنفس الجرعة الوريدية ( ١,٢ مغ / ٢م لمدة ٤ - ٥ أيام) يمكن أن يؤدي إلى اعتلال دماغ والسبات القابل للتراجع لذلك يجب ألا يعطى عن طريق الفم .

- يمكن أن تحدث البيلة الدموية المجهرية عند ٥٠٪ من المرضى عند عدم إعطاء الميزنا Mcsna وهو دواء واقى لبطانة الجهاز البولي ولذلك هو دواء ضروري لكل مريض يعالج بالإفوسفاميد . عند إعطاء الإفوسفاميد بالشرب الوريدي المستمر فإن جرعة الميزنا تكون ١٠ - ٢٠٪ من جرعة الإفوسفاميد وهي جرعة يذوية ثم يعطى بعد ذلك لمدة ٢٤ ساعة .

وإذا أعطي الإفوسفاميد دفعة واحدة فإنه يتم اعطاء الميزنا كل ٤ - ٨ ساعات .

- الاختلاطات العصبية وهي خطيرة خاصة بإعطائه عن طريق الفم .

- الغثيان والإقياء .
- تثبيط نقي العظم .
- الإستطبابات : - أورام الخصية وخاصة في حال عدم الإستجابة للأدوية الأخرى VP16 و بليومايسين + السيسبلاتين ٢٣٪ يستجيبوا للإفوسفاميد لوحده . يمكن استخدامه مع الفنبلاسين Vinblastine والسيسبلاتين .
- اللمفوما .
- ساركوما النسيج الرخوة .
- يمكن أن يكون فعالاً في سرطان المبيض - أورام الرأس والعنق - سرطان الرئة .

#### ٧- الخردل الآزوتي nitrogen Mustard :

- وهو من الأدوية النشطة كيميائياً ويتم إزالته من الدم خلال دقيقة واحدة .
- السمية Toxicity : - الغثيان والإقياء ويحدثان عند جميع المرضى وبعد الحقن مباشرة ويستمران ( ٢- ٨ ساعات ) .
- التهاب الوريد الخثري thrombo phlebitis شائع الحدوث والحقن لمرة ثانية في نفس الوريد قد يكون مستحيلاً .
- تثبيط نقي العظم وعادة ما يكون شديداً ويمكن أن يكون تراكمياً .
- تساقط الشعر .
- يمكن أن يساعد على حدوث ابيضاض الدم أو اللمفوما ( كورم ثاني second malignancy ) .
- الإستطبابات :
- ١ - هودجكن وفق مشاركة دوائية MOPP أو ABVD + MOPP أما استخدامه في باقي الأورام غير شائعة .
- كان يستخدم حقناً في البريتوان والجنب ولكنه مؤلم جداً ويمكن أن يترافق بانسداد

الأمعاء مما يجعل استخدامه في الوقت الحالي نادراً .  
يمكن أن يطبق موضعياً في علاج الفطار الفطرائي Mycosis Fungoides ويمكن أن يطبق  
بأن يحل ١٠ مغ - ٤٠ - ٦٠ مل من الماء ويطبق موضعياً على كامل الجلد يومياً .

## مضادات الإستقلاب antimetabolites


وهي أدوية متشابهة بالبنية والخصائص الكيميائية مع المركبات الطبيعية اللازمة لتكوين البورين purine وبريميدين pyrimidine والحموض النووية .  
تثبط هذه الأدوية الخمائر التي تؤدي لتكوين البورين والبريميدين أو تمنع تشكيل جزيء الحمض النووي DNA معظم هذه الأدوية تدخل بالنقل الفعال لداخل الخلية وهناك تنقلب إلى مركبات سامة للخلية وتتنافس مع المركبات الخلوية على الارتباط بالخمائر Enzymes ويجب أن تتوفر هذه الأدوية بتركيز سامة للخلية خلال مرحلة تكوين الحمض النووي DNA لكي تؤدي مفعولها ولذلك فهي تعمل على الطور S من دورة حياة الخلية .

### ١ - الميثوتركسات Methotrexate :


يمكن إعطاؤه حقناً وردياً أو عن طريق الفم . ثبت عضلياً أو حقناً داخل السيساء وقبل الحقن يجب أن يخبر الطبيب الدم العام ووظائف الكلية ووظائف الكبد .  
الخصائص الدوائية والحيوية : إن التأثير السام للميثوتركسات يعتمد على عدة عوامل كيميائية حيوية منها نقل الدواء عبر الغشاء الخلوي - استقرار الرابطة التي تربط حميرة Hydro folate Reductase وخروج حميرة tetra hydrofolate من داخل الخلية .

إن أهم عنصرين لسمية الميثوتركسات على الخلية هما تركيز الدواء ومدة التعرض له ولوحظ أن هناك عتبة خاصة لتركيز الدواء خارج الخلية لكي يؤدي الدواء لتثبيط تركيب الـ DNA .


السمية Toxicity : - الآثار الجانبية الحادة : تثبيط نقي "خلم" - سعال - التهاب الفم وتصل ذروتها بعد ٤ - ٥ أيام من إعطاء الدواء جرعة واحدة bolus والشفاء عادة سريع .




**Methotrexate**




**Folic Acid**




**5-Fluorouracil**




**Uracil**




**Cytosine  
Arabinoside**




**5-Azacytidine**




**Cytidine**




**Deoxycytidine**




**6-Mercaptopurine**



**6-Thioguanine**



**Hypoxanthine**



**Guanine**

الشكل رقم ٧ يبين التركيب الكيميائي للأدوية المضادة للاستقلاب

إن إعطاء دواء Folinic acid ( leucovorin ) خلال ٤٠ ساعة من حقن الميثوتركسات يمكن أن يكون له تأثير وقائي أو منقذ عند الأشخاص الذين يتأخر لديهم طرح الدواء بسبب الفشل الكلوي .

- يمكن أن يحدث الفشل الكلوي بعد حقن جرعة عالية من الميثوتركسات بالرغم من الإماهة الجيدة وقلونة البول وقد يكون ذلك بسبب ترسب الميثوتركسات على الأنابيب الكلوية .

- تراجع وظائف الكبد يمكن أن يحدث بعد إعطاء الميثوتركسات بجرعات عالية ولكنها قابلة للتراجع وإعطاء الميثوتركسات بجرعات صغيرة ولفترة طويلة كما في الصدف يمكن أن يؤدي لحدوث تليف الكبد في ٣٠٪ من الحالات .

- يمكن أن تحدث ذات الرئة ( حرارة - سعال - زلة تنفسية - ارتفاع الحمضات ) .  
- حقن الميثوتركسات داخل السيساء يمكن أن يترافق بأعراض عصبية حادة ( اضطرابات في الحركة - التهاب تحت العنكبوت الكيميائي - اختلاجات والسبات وعند المشاركة مع الأشعة يمكن أن يحدث متلازمة ازالة النخاعين تحت الحادة Subacute demyelinating syndrom ويتظاهر بالاضطرابات القشرية وصعوبة التعلم .

التداخلات الدوائية : الميثوتركسات دواء قليل الارتباط بالألبومين ويمكن أن يزاح من قبل عدة أدوية مثل السلفاناميد - الساليسيلات - تتراسيكلين - الكورامفينيكول والفينوتوين ويمكن أن يتأخر الإفراز الأنبوبي في الكلية للميثوتركسات بواسطة الساليسيلات - البروبينيسيد ( probenecide ) ومضادات التهاب غير الستيروئيدية ( NSA ) مما يؤدي إلى تأخر إزالة الدواء من الجسم وبالتالي زيادة السمية كما يمكن أن يتداخل الميثوتركسات مع عدة أدوية مضادة للأورام مثل الفينكريستين و VP16 ( Etoposide ) حيث يمنع خروج الميثوتركسات من الخلية مما يؤدي لزيادة تركيزه داخل الخلية وزيادة تشكل polyglutamate .

دواء ال- Asparaginase يقلل من سمية الميثوتركسات بتثبيت تركيب البروتين والبولي

غلوتامين polyglutamate أما التداخل الدوائي الأكثر أهمية وخاصة في السنوات القليلة الماضية هو التداخل ما بين الميثوتركسات والفلورويوراسيل ( FU - 5 ) حيث لوحظ تأثير مقوي للفلورويوراسيل إذا أعطي الميثوتركسات قبله بـ ٢٤ ساعة تقريباً .  
الإستطبابات ، كدواء وحيد الميثوتركسات يعتبر شافي في السرطانة المشيمة Choriocarcinoma ويستخدم كجزء من المشاركة الدوائية لعلاج العديد من الحالات الخبيثة مثل ابيضاض الدم اللمفاوي الحاد - الغرن العظمي - اللمفوما لاهودجكن - سرطان الثدي - السرطانة الشائكة الخلايا للرأس والعنق .

- الحالات غير السرطانية : الصدف - التهاب المفاصل الرثوي Rheumatoid arthritis .  
بالرغم من كثرة التجارب السريرية حول فعالية إعطاء الميثوتركسات بجرعات عالية مع دواء الـ Leucovorin إلا أنه لم يظهر أي دليل على أنها مفضلة عن إعطاء الدواء بالجرعة النظامية فيما عدا علاج الغرن العظمي و ابيضاض الدم اللمفاوي الحاد .

#### ٢ - الفلورويوراسيل 5-Fluorouracil :

ويمكن إعطاؤه حقناً وردياً أو بالشریان الكبدي أو داخل اليرتوان ويتوفر أيضاً  
مراهم للتطبيق الموضعي .

قبل الحقن الوريدي يجب أن يجرى للمريض تعداد دم عام وتعديل الجرعة وفقاً  
لهذا التعداد أما التراجع في وظيفة الكلية أو الكبد فلا يحتاج لتعديل الجرعة .  
الخصائص الدوائية والكيمائية الحيوية ،

تم تصنيع الفلورويوراسيل في عام ١٩٥٧ بواسطة هيدليبرغ Heidelberg وقد  
إعتمد على ملاحظته بأن الخلايا الورمية تصنع الأساس uracil من أجل تركيب  
الحمض النووي DNA وبشكل أكبر مما تفعله الخلايا الطبيعية ومنذ اكتشافه بدأ  
استخدامه بشكل واسع في عدة أورام منها سرطان الثدي وسرطانات الجهاز الهضمي  
ولاتزال آلية عمله مجهولة حتى الآن .

يستقلب الدواء داخل الخلية ويتحول إلى فوسفات الفلورويوريدين Flouro



uridine mono phaspat ويتحول فيما بعد إلى فلورويوريدين ثلاثي الفوسفات Flouro uridine tri phosphate ومركب Flouro deox uridin mono phosphate وبالتالي تركيب الحمض النووي DNA ويبدو أن هذه هي الآلية الأساسية التي يعمل بها الدواء وحديثاً فإنه يمكن للفلورويوراسيل ثلاثي الفوسفات ( FUTP ) أن يتفاعل مع DNA ويؤدي إلى تحطيم أحد السلاسل ويمكن أن تكون هذه إحدى آليات عمل الدواء .

- التداخلات الدوائية :

إن ملاحظة أن تأثير الفلورويوراسيل الدوائي يزداد إذا أعطي معه دواء الـ leucovorin أدى إلى قيام عدة دراسات تقارن إعطاء الفلورويوراسيل لوحده وإعطائه مع leucovorin في معالجة سرطان الكولون المتقدم ولوحظ في معظم هذه الدراسات تحسن معدل الاستجابة بشكل واضح أو تحسن في معدل الحياة عند إعطاء الفلورويوراسيل مع اللوكوفورين leucovorin وهذه المشاركة لها فعالية في معالجة سرطان الثدي وسرطان المعدة وسرطان البنكرياس .

لوحظ أيضاً زيادة تأثير الفلورويوراسيل إذا أعطي مشاركة مع الانترفيرون ألفا وخاصة في سرطانات الجهاز الهضمي .

الالوبيورونيول Allopurinol ينقص من سمية الفلورويوراسيل على الأنسجة الطبيعية وذلك لأن الأول يشبط حميرة transferase orotic acid phosphoribosy L وهي حميرة أساسية لتفعيل الفلورويوراسيل وللأسف لم يستفاد سريرياً من هذا التداخل .

الثميدين Thymidine يزيد من سمية الفلورويوراسيل بزيادة نصف العمر .

السمية ، أهم الآثار الجانبية هي تأثيره على مخاطية جهاز الهضم ونقي العظم وهي تتغير بطريقة إعطاء الدواء فعند إعطاء الدواء بالشراب الوريدي يمكن أن يحدث التهاب الفم والإسهال وقد يكون الإسهال مهدداً للحياة عند إعطاء اللوكوفورين مع الفلورويوراسيل كما قد يكون انخفاض الكريات البيض هو أحد العوامل التي تحد من الجرعة الدوائية .

- تساقط الشعر - التهاب الجلد Dermatitis وفرط التصبغ - التهاب الملتحمة وانسداد القناة الدمعية .

- الآثار العصبية تتظاهر بـ Ataxia ويحدث عند ١٪ من المرضى .

- قد يترافق إعطاء الفلورويوراسيل باختلاطات قلبية وعائية منها احتشاء عضلة القلب - الصمة الرئوية pulmonary embolism .

الإستطباعات indication : يستخدم بشكل أساسي كعلاج ملطف للعديد من الأورام الصلبة مثل سرطان المستقيم والكولون وسرطان الثدي - سرطان المعدة وسرطان البنكرياس .

ويشكل مركب أساسي في المشاركة الحاوية على السيسبلائين في علاج أورام الرأس والعنق .

٣ - cytosinarabioside سيتوزين أرابينوزيد ( ara - c ) :

ويمكن إعطاؤه حقناً وردياً أو حقناً تحت الجلد وحقناً في السيساء ويحل بسموم ملحي ( 9% Na cl ) .

الخصائص الكيميائية الحيوية والدوائية :

يستقلب الدواء داخل الخلية إلى سيتوزين ثلاثي الفوسفات ( ara - ctp ) الذي يثبط تركيب حمض الـ DNA بتثبيطه خميرة الـ DNA Polymerase ويمنع اكتمال نمو السلاسل غير الناضجة وتأثيره الدوائي القاتل يصيب الخلايا ذات النشاط العالي في تركيب الحمض النووي DNA .

ونظراً لوجود تراكيز عالية من خميرة cytidine deaminase في غشائية المعدة والأمعاء والكبد فإن إعطاء هذا الدواء عن طريق الفم غير فعال .

بعد إعطاء الدواء وردياً فإن الدواء يتوزع في كل سوائل الجسم ويكون تركيزه في السائل الدماغي الشوكي ٥٠ ٪ تقريباً خلال ساعتين من حقن الدواء .

يستقلب الدواء في الكبد ويتم نزع الأمين منه ثم يختفي من البلازما بنصف عمر ٧ -

٢٠ دقيقة وذلك يجعل أفضل طريقة لإعطاءه هي الترييب الوريدي المستمر . إعطاء الدواء بجرعات عالية High dose يجعل تركيز الدواء في البلازما يصل لـ ١٠٠ ضعف من التركيز بعد إعطاء الدواء بالجرعة العادية ويجعل نصف العمر يصل لـ ٦ ساعات . يمكن إعطاء الدواء حقناً في السيساء وينطرح الدواء من السائل الدماغي الشوكي ببطء بسبب فقره بخميرة cytidine deaminase .

- الآثار الجانبية : تعتمد على جرعة الدواء وفترة التعرض للدواء وتشمل تثبيط نقي العظم - الغثيان - الإقياء - الإسهال - التهاب الفم وارتفاع حمائل الكبد .

إعطاء الدواء بجرعات عالية يترافق مع التهاب الملتحمة ( يمكن الوقاية بإعطاء قطرات ستروئيدية ) والرنح Ataxia بجرعات تراكمية عالية .

- الإستطبابات : ١ - أحداث الهجوع في ابيضاض الدم النقوي الحاد .

٢ - يستخدم بمشاركة دوائية لمعالجة اللمفوما و ابيضاض الدم اللمفاوي الحاد .

٣ - حديثاً يستخدم بجرعات منخفضة low dose في علاج متلازمة عسر التنسح النقوي .

٤ - مضادات استقلاب البورين ( ٦ - ميركاتوبورين و ٦ - ثيوغوانين ) وكلا الدوائين يعطيان عن طريق الفم لعلاج ابيضاض الدم اللمفاوي الحاد .

ويختلف الميركاتوبورين ( 6-MP ) والثيوغوانين ( 6-TG ) عن البورين الطبيعي بوجود مجموعة الثيول thiol في حلقة البورين وينقلب كلا المركبين بعد دخولها للخلية إلى الشكل الفعال بواسطة خميرة *hypo - xanthine - guanine phospho ribosy transferase* ( HGPRT ) .

التداخلات الدوائية : في حال استخدام الـ 6-MP مع الألوپورينول يمكن أن تزداد السمية بسبب تأخر انطراح الدواء لذلك فإن من المفضل انقاص الجرعة إلى ٧٥ ٪ خلال المشاركة أما في حال 6-TG فيمكن إعطاء الجرعة دون انقاص . إعطاء الميثوتركسات مع الميركاتوبورين 6-MP قد يؤخر من انطراح الدواء ولكن لا يؤثر

ذلك سريراً لذلك يمكن إعطاء الجرعة الدوائية دون أي تغيير .

السحبة : ١ - تثبيت نقي العظم .

٢ - التهاب الفم - إقياء - غثيان - اسهال - اليرقان .

الإستطبائيات : يستخدم الثيوغوانين مع الأدوية الأخرى في علاج ابيضاض الدم غير

اللمفاوي الحاد . بينما يستخدم MP في علاج ابيضاض الدم اللمفاوي وعلاج

الصيانة ) ..

## ثالثاً : الصادات المضادة للأورام

### Anti tumor antibiotics

إن الصادات المضادة للأورام هي مركبات طبيعية تنجم من استقلاب الكائنات الدقيقة . ثم بعد ذلك حدث محاولات عديدة لزيادة تأثير هذه المركبات وإقلال سميتها وذلك بالتعديل الكيميائي في تركيبها الجزيئي والتفاعل مع المورثات الخاصة بالعصيات المنتجة لها .

#### ١ - الأدرياميسين Adriamycin :

وهو من أحدث الصادات المضادة للأورام المستخدمة سريراً وله طيف واسع ولذلك فهو أشيع الأدوية المضادة للسرطان ويمكن عزله من الفطر المنتج للـ Daunorubicin . يمكن للأدرياميسين أن يخضع لثلاث تفاعلات كيميائية في الخلية السليمة والسرطانية تفاعلين مع السلسلة الناقلة للألكترونات للخلية cell's electorn . transprot chain

أما التفاعل الثالث فهو ارجاع الكاربونيل carbonyl reduction ويتم انتاج المستقلب الكحولي للأدرياميسين الذي يتمتع بتأثير قوي على الخلية السرطانية بالمقارنة مع الأدرياميسين كما أن هذا المستقلب يميل للبقاء داخل الخلية وبالتالي يؤدي لزيادة التأثير السام على الخلية .

بالنسبة للتفاعلين الآخرين فيبدأ بنقل الإلكترون وحيد الكونيون quinon وهو جزء من الأدرياميسين مما يؤدي إلى توليد جذر فعال حر Free Radical .

وعند وجود تركيز كافٍ من الأوكسجين فإن الأدرياميسين يزيد من امكانية التقاط الإلكترون من قبل جزيء الأوكسجين وبالتالي زيادة امكانية تشكل الجذور فائقة الأكسجة superoxide anion radicals التي يمكن أن تنقلب إلى بيروكسيد الهيدروجين Hydrogen peroxide وجذور الهيدوكسيل والتي يمكن أن تؤدي مباشرة الحمض النووي

DNA والحمض النووي RNA والبروتينات والدهون .

كما يمكن للأدرياميسين أن يسبب أذية للنواة والمركبات السيتوبلازمية والغشاء الخلوي ، إن الأدراماييسين هو أكثر الأدوية المضادة للإنقسام استخداماً في معالجة السرطان وذلك لأن له طيفاً واسعاً ويمكن أن نستعرض في الجدول التالي فعاليته المحدودة وخصائصه الدوائية .

- الوزن الجزيئي ٥٤٣,٥٤

- نصف العمر في المصل ١٦ - ٢٤ ساعة ( يتطاوّل بتراجع وظائف الكبد )

- تصفية الدواء ١٥ - ٣٠ لتر / ساعة / م

( ٤٠ - ٥٠ ٪ كبدية - ٥ - ١٠ ٪ كلوية ) .

استخدامه السريري ،

١ - بقصد الشفاء : - ابيضاض الدم اللمفاوي الحاد ALL

- ابيضاض الدم غير اللمفاوي الحاد Acute non lymphocytic leukemia

- لمفوما لا هودجكن ( كبيرة الخلايا ) ( Large cell ) N . H . L

- هودجكن Hedgkin's discasc

- سرطان الثدي ( معالجة متممة فقط )

- سرطان الرئة صغير الخلايا ( في المرحلة المحدودة ) Limited disease

- الغرن العظمي ( معالجة متممة فقط ) osteo sarcoma

- الغرن ( معالجة متممة فقط ) soft tissue sarcomas

- أورام الخلايا المولدة ( الخصية - مبيض ) Germ cell tumors

٢ - معالجة ملطفة :

. ابيضاض الدم اللمفاوي وغير اللمفاوي عند النكس

. ابيضاض الدم اللمفاوي المزمن CLL

. الورم النقوي المتعدد Multiple myeloma

- لمفوما لاهودجكن ( صغيرة الخلايا ) ( N . H . L ( small cell )
- الغرن في حالة وجود نقائل أو النكس recurrent or metastatic sarcoma
- ورم الوريقة المتوسطة الخبيث malignant mesothelioma
- الكارسينويد carcinoide
- سرطان المثانة - الثدي - الرأس والعنق - الكبد - الرئة - المبيض - البنكرياس -
- البروستات - المعدة - الدرق - الخصية في حالة النكس والرحم .
- الآثار الجانبية الحادة : - تثبيط نقي العظم .
- التهاب الأغشية المخاطية .
- التهاب الدم .
- تساقط الشعر Alopecia .
- الغثيان - الإقياء - القهيم anorexia .
- توهج الوجه Flashing - الحكة itching .
- الآثار الجانبية المزمنة :
- إعتلال عضلة قلبية احتقاني congestive cardio myopathy ( الجرعة التراكمية القصوى ٥٥٠ مغ / ٢م ) .
- اضطرابات وريدية vein streaking .
- بعض الآثار الخاصة : - عودة التهاب الجلد الشعاعي radiation - recall dermatitis .
- التمثوت النسيجي للجلد والنسيج تحت الجلد عند حقن الدواء خارج الوريد
- extravasation necrosis
- تخفيض الجرعة بمقدار ٥٠ - ٧٠ ٪ عندما يكون هناك اضطراب في وظيفة الكبد .
- الجرعة وطريقة إعطاء الدواء :
- يعطى الأدريناميسين حقناً بالوريد وبعده طرق schedules وأكثرها شيوعاً هي
- الحقن الوريدي كل ٣ - ٤ أسابيع ( بجرعة ٤٥ - ٩٠ مغ / ٢م في كل مرة ) ويمكن

إعطائه بجرعة يومية ولمدة ٢ - ٣ أيام ( بجرعة ٢٥ - ٤٠ مغ / ٢م في كل مرة ) أو يمكن إعطاؤه بجرعة اسبوعية ( ١٥ - ٣٠ مغ / ٢م في كل جرعة ) وأخيراً يمكن أن يعطى بتثريب وريدي مستمر ولمدة ٧٢ - ١٤٤ ساعة ( ٢٠ مغ / ٢م يومياً ) .

ويتم اختيار الطريقة وفقاً لعدة عوامل منها : رغبة المريض - استجابة الورم - وجود مرض مرافق وسمية الدواء . وهناك طريقتين لإعطاء الدواء تم استخدامها حديثاً وهما الحقن داخل المثانة intravesical والحقن داخل الشريان ، ففي حالة سرطان المثانة السطحي فإن حقن الأدريناميسين داخل المثانة أدى إلى استجابة تامة ولفترة زمنية طويلة عند إعطائه في النكس أو كمعالجة متممة والجرعة تتراوح ٥٠ - ٩٠ مغ / ٢م كل ٣ أسابيع لـ ٤ أو ٨ جرعات .

أما الآثار الجانبية في هذه الحالة فهي عسرة التبول - بيلة دموية - تشنج المثانة - التهاب المثانة ولكنه نادراً ما تؤدي هذه الآثار لإيقاف المعالجة .

إن ٥٠ ٪ من الدواء ومستقلبه الفعال يفرز في الصفراء bile و ٥ - ١٠ ٪ منه في البول ومعظم الدواء يفرز خلال الـ ٢٤ ساعة إلى ٤٨ ساعة بعد الحقن بشكل doxorubicin أو doxorubicinol ولذلك فإن الأشخاص المصابين بتراجع وظائف الكلية يمكن إعطاء الجرعة العلاجية كاملة وذلك لأن الدواء يمكن أن يزداد إفرازه في الصفراء وبالتالي منع تراكم الدواء بينما عند المرضى الذين يعانون من اضطراب وظائف الكبد فإن الجرعة يجب أن تخفض لمنع حدوث السمية الشديدة أو القاتلة وبالرغم من أن مقدار تخفيض الجرعة متنوع إلا أنه يمكن نعتمد الجدول التالي الذي يبين الجرعة حسب مقدار البليروبين في المصل وحماتر الكبد transaminase .


البليروبين في المصل مغ/دل	حماتر الكبد	الجرعة
أقل من ٢ مغ	أكثر من ٣-٢ x للقدار الطبيعي	٤٥ - ٥٠ مغ / ٢م
٢ - ٣ مغ	أي رقم	٣٠ - ٤٠ مغ / ٢م
أكثر من ٣ مغ	أي رقم	١٥ - ٢٠ مغ / ٢م



## ٢ - دونوريسين Daunorubicin :

وهو من مركبات الأنتراسيكلين المضادة للأورام تم إكتشافه قبل الأدرياميسين وأدخل التجارب السريرية في الستينات من هذا القرن ونلاحظ أن له تأثير سريري واضح في معالجة الإبيضاضات leukemias وأصبح المقياس الأساسي لتقييم الأنظمة العلاجية الجديدة للإبيضاض .

إن الخصائص الكيميائية الحيوية والدوائية لهذا الدواء متشابهة للأدرياميسين فيما عدا غياب مجموعة الهيدروكسيل يجعل الدواء أكثر انحلالاً من الأدرياميسين في



شكل رقم ٨ يبين تركيب دواء دونوريسين

الشحوم وبالتالي يكون دخوله إلى الخلية أسهل ، وفيما يلي نستعرض استطببات والخصائص الدوائية والسمية للدواء ؟

الوزن الجزيعي 527.6

- نصف العمر البلازمي plasma half - life ٢٠ ساعة ( يمكن أن يتناول بتراجع وظائف الكبد )

- تصفية كامل الجسم total body clearance ٣٤ - ٦٧ لتر / ساعة / م<sup>٢</sup>

( ٤٠ ٪ الكبدية ١٠ ٪ كلوي ) .

- الإستطببات :

١ - بقصد الشفاء : ابيضاض الدم اللمفاوي الحاد ALL

ابيضاض الدم غير اللمفاوي الحاد ANLL

٢ - معالجة ملطفة : - النكس في ابيضاض الدم اللمفاوي الحاد و ابيضاض الدم غير اللمفاوي الحاد .

- الإبيضاض الثانوي ( النقوي مثلاً ) الحاد .

السمية ، ١ - الآثار الجانبية : - تثبيط نقي العظم .

- التهاب الفم والأغشية المخاطية

- تساقط الشعر .

- غثيان - إقياء - قهيم .

- توهج الوجه - الحكة .

٢ - الآثار المزمنة : - اعتلال العضلة القلبية الإحتقاني .

- اضطرابات وريدية .

٣ - بعض الآثار المهمة : - عودة التهاب الجلد الشعاعي .

- تموت النسخ من حقن الدواء خارج الوريد .

- قد لا يكون هناك أي ضرورة لتخفيض الجرعة عند حدوث

تراجع في وظائف الكبد .

- الجرعة الدوائية وطرق إعطاء الدواء :

إن الجرعة وطريقة إعطاء الدواء مشابهة للأدرياميسين فيما عدا الإستثناءات

التالية : في ابيضاض الدم الحاد غير اللمفاوي فإن جرعة الدونورييسين هي ٦٠ مغ /


م ٢ يومياً ولمدة ٣ أيام وهي أعلى بـ ٥٠ ٪ من جرعة الأدرياميسين .

٣ - دأكتينومايسين Dactinomycin :

وهو أول صاد حيوي مضاد للأورام تم إكتشافه وهو دواء أصفر اللون يعمل

على تثبيط تركيب الحمض النووي DNA ويمكن أن يؤدي إلى إنتاج الجندور الحرة

الفعالة وسوف نستعرض فيما يلي صفاته الدوائية واستطباباته وآثاره الجانبية :



شكل رقم ٩ يبين تركيب دواء Dactinomycin

- الوزن الجزيئي ١٢٥٥,٥
- نصف العمر البلازمي ٣٦ - ٤٨ ساعة ( بتناول بتراجع وظائف الكبد )
- تصفية كامل الجسم غير معرفة والمعلومات المتوفرة تقترح أن ١٥ ٪ كبدية و ٢٠ - ٣٠ ٪ كلوية .
- استطباباته :
- ١ - بقصد الشفاء : - الأورام الصلبة عند الأطفال .

- ورم ويلمز wilm's tumor

- ايوينغ Ewing's sarcoma

- الغرن العظمي ( معالجة متممة ) osteo sarcoma

- الغرن العضلي المخطط الجنيني Embryonal Rhabdomyo sarcoma

- أورام الخلايا المولدة في الخصية والمبيض .

- أورام النسيج الرخوة ( معالجة متممة ) soft tissue sarcomas

٢ - معالجة ملطفة : - ايضاض الدم الناكس ( اللمفاوي الحاد )

- الغرن العظمي وأورام النسيج الرخوة الناكسة أو المنتشرة .

- غرن كابوزي kaposi's sarcoma

- سرطان المثانة - الشدي - المبيض المتقدمة - سرطان الخصية

الناكس .

- داء باجت العظمي paget's disease of bone

الآثار الجانبية :

١ - الحادة : - تثبيط شديد لنقي العظم .

- التهاب الفم والأغشية المخاطية .

- تساقط الشعر ( قد يشمل حتى الحواجب ) .

- غثيان - إقياء - قهيم .

- توهج الوجه - الحكة - الحماى الجلدية Erythema

٢ - المزمنة : - فقر الدم الانسمحي .

- اضطرابات وظيفية كبدية ؟

بعض الآثار الهامة : - عودة التهاب الجلد الشعاعي - التهاب الأمعاء .

- نموت النسيج عند حقن الدواء خارج الوريد .

- تخفيض الجرعة عند المشاركة مع المعالجة الشعاعية .


الجرعة الدوائية وطريقة إعطاء الدواء :

جرعة الدواء تتراوح ما بين ٠,٤ - ٠,٦ مغ / ٢م / يومياً ( ١٠ - ١٥ ميكرو  
غرام / كغ / يومياً ) ولمدة ٥ أيام حقناً وريدياً تكرر كل ٤ - ٦ أسابيع أو يعطى  
بجرعة ١,٢٥ - ٢ مغ / ٢م كل ٣ - ٤ أسابيع حقناً وريدياً يمكن إعطاء الدواء بالحقن  
بالشریان بعد عزل الطرف المصاب كما يمكن إعطائه بالثریب الوريدي المستمر

. continuous Infusion

#### ٤ - البليومايسين Bleomycin :

وهو من الصادات العديدة الببتيدات المضادة للأورام يشتق من بكتريا تدعى  
sterptomyces verticillus وهو عبارة من مجموعة من المركبات عددها عشرة مركبات  
وحدثاً تم تصنع مركب يدعى بليومايسين Bleomycin A<sub>3</sub> والذي يستخدم سريرياً



شكل رقم ١٠ يبين تركيب دواء Bleomycin A<sub>3</sub>

آلية عمله تشمل التأثير على تركيب الـ DNA كما يمكن أن يؤدي إلى آذية الميتوكوندريا mtochondria وفيما يلي نستعرض بعض الخصائص الدوائية واستطبابات اليليومايسين وآثاره الجانبية .

- الوزن الجزيئي ١٤١٤٠

- نصف العمر في البلازما ٢ - ٤ ساعات ( قد يتطاوّل بـزّاجع وظائف الكلى )

٣ ساعات بالحقن داخل الجنب و ٥ ساعات بالحقن داخل اليريتوان .

- تصفية الجسم : ٣ لتر / ساعة / ٢٠ ( ٥٠ - ٧٠ ٪ كلوية )

الإستطبابات :

١ - بقتند الشفاء : لمفوما لاهودجكن N . H . L

- دواء هودجكن .

- أورام الخلايا المولدة ( الخصية والمبيض )

٢ - معالجة منقطة : - حقن داخل الأجواف ( الجنب - الذامور - اليريتوان ) .

- لمفوما لاهودجكن ( صغيرة الخلايا )

- سرطان الخصية الناكس .

- الفطار الفطراني Mycosis Fungoides .

- السرطنة الشائكة الخلايا في ( الرأس والعنق - الجند - التضييب

- عنق الرحم ) .

الآثار الجانبية ،

١ - الحادة : - الصدمة التأقية .

- حمى - عرواءات - ألم عضلي MYALGIA

- التهاب الفم والأغشية المعاطية

- إحمّار الجلد وتقشره .

- غثيان - إقياء - قهم .

- انخفاض التوتر الشرياني .

- الشرى Urticaria توهج الوجه Flushing - حكة - التهاب الوريد

- ظاهرة رنيود Raynaud's phenomenon .

٢ - المزمنة : - تليف الرئة pulmonary Fibrosis .

- فرط تصبغ الجلد .

- فرط الإحساس في الجلد hyperesthesia .

بعض الملاحظات الهامة :

- المعالجة الشعاعية قد تفوي أذية الرئة الناجمة عن البليومايسين .

- تخفيض جرعة الدواء إلى ٥٠ - ٧٥ ٪ عند حدوث تراجع بوظائف الكلية ( تصفية

الكلى أقل من ٢٥ مل / دقيقة ) .

الجرعة الدوائية وطريقة إعطاء الدواء :

يعطى البليومايسين بشكل أساسي وريدياً وبجرعة تقاوح ما بين ١٠ - ١٥ وحدة /

٢م كل ٢ - ٣ أسبوع وقد يعطى أحياناً بالحقن تحت الجلد لتسهيل إعطاء النظام

العلاجي إلا أن ذلك نادراً ما يتم وحديثاً يمكن إعطاء البليومايسين حقناً بالجنب في


الإنصابات الورمية كما يمكن إعطاؤه حقناً في اليريقوان أو التامور .

٥ - ميتومايسين Mitomycin c :

يستخرج من العضوية الدقيقة streptomycetes caespitous تركيبه الكيميائي حري

على حلقة ال quinon التي يمكن أن تكل الجنور الحرة التي تعمل كمقنونات

alkylators للحمض النووي DNA



شكل رقم ١١ يبين تركيب دواء Mitomycin C

خصائص الميتومايسين النواتية :

- الوزن الجزيئي ٣٣٤

- نصف العمر في البلازما ١ - ٢ ساعة ( قد يتطاوّل بتّراجع وظائف الكبد ) .

- تصفية الجسم ٣٠ ليتر / ساعة ( ٩ - ٢٠ ٪ كلوية ) .

استطباباته :

١ - بقصد الشفاء : - سرطانة الشرج شائكة الخلايا ( مع المعالجة الشعاعية والفلورويوراسيل بالثريب الوريدي ) .

- الحقن داخل المثانة في الأورام السطحية .

٢ - معالجة ملطفة : - سرطان المري - بنكرياس - المعدة .

- سرطان الكولون الناكس .

- سرطان الثدي الناكس .

- الغرن العظمي وباقي الأغران الناكسة أو المنتشرة .

- ورم الوريقة المتوسطة الخبيث Malignant Mesothelioma

- سرطان المثانة - أورام الرأس والعنق - سرطان الرئة - الكبد -

سرطان عنق الرحم .

- الحقن داخل الأخراف الجنب - المثانة ( في حالة النقائل ) .

آثاره الجانبية :

١ - الحادة : - تثبيط نقي العظم ونقص الصفيحات الشديد thrombocytopenia .

- التهاب الفم والأغشية المعاطية .

- تشويش الحس parasthesia .

- غثيان وإقياء - قهم ( قد يكون لفترة طويلة ) .

- مموت الأنسجة من الحقن خارج الوريد .

- ألم في الوريد - الحكّة - التهاب الوريد .

- إحمرار الجلد أو تقرحه .



- تشنج القصبات عند إعطائه مع الـ vinca alkaloid .

٢ - المزملة : - فاقعة دموية انحلالية Micro angioathic hemolytic anemia .

- المتلازمة الانحلالية اليوريمائية Hemolytic - uremic syndrom .

- تليف رئة - نفث الدم - زلة تنفسية .

- تثبيط نقي عظم تراكمي .

- تصلب الوريد أو التهاب الوريد .

٣ - بعض المحاذير الهامة : - قد يؤدي إلى سمية على العضلة القلبية أويقوي تأثير الأديرياميسين السام على العضلة القلبية .

- قد يكون هناك عودة لإلتهاب الجلد الشعاعي .

- حدوث التمثول للنسيج تحت الجلد والجلد عند الحقن

خارج الوريد .


- انقاص الجرعة الدوائية بمقدرا ٢٥ إلى ٧٥ ٪ عندما

يكون هناك نقص كريات بيض أو صفيحات .

- الجرعة الدوائية : ويعطى الميتومايسين حقناً وريدياً بالأجواف أو حقناً بالشرمان والجرعة الإعتيادية هي ١٠ إلى ٢٠ مغ / ٢م كل ٤ - ٨ أسابيع في الحقن داخل الأجواف ، الجرعة الكلية هي ٢٠ مغ داخل المثانة أو داخل اليريتوان أما الحقن داخل الجنب فيسبب ألماً شديداً لذلك لايفضل إعطاؤه بهذه الطريقة .

٦ - بليكامايسين ( ميثرامايسين ) ( Mithramycin ) : Filcamycin

بالرغم من أن الميثرامايسين كان يستعمل في معالجة الحالات المتقدمة من سرطان الخصية والمثانة والبروستات حيث بينت الأبحاث الأولية أن معدل الإستجابة جيد إلا أن دوره في الوقت الحاضر محصور في علاج ارتفاع الكالسيوم الخبيث في المصل malignant hypercalcimia . البليكامايسين ينتمي إلى عائلة الكروموميسين chromomycin وآلية عمله هي تثبيط تكون الحمض النووي DNA وتثبيط تشكل البروتينات



شكل رقم ١٢ بين تركيب Mithramycin

الخصائص الدوائية : - الوزن الجزيئي ١٠٨٥,٢

- نصف العمر غير معروف ولكن قد يكون ١٢ - ٢٤ ساعة .

- تصفية الجسم غير معروف ولكن قد يكون ٥٠ ٪ كئوية .

الاستخدامات :

١ - بقصد الشفاء : لا يوجد .

٢ - معالجة ملطفة : - أورام الخلايا المولدة في الخصية والبيض .

- ارتفاع كلس المصل الخبيث .

- داء باجت العظمي .

الآثار الجانبية :

١ - الحادة : المتلازمة النزفية الحادة Acute hemorrhagic syndrome .

- نقص الصفائح الشديدة .
- تخثر داخل الأوعية المنتشر .
- نقص الكالسيوم .
- التهاب الفم .
- غثيان - إقياء - القهم anorexia .
- توهج الوجه .
- بيلة بروتينية ارتفع الكرياتينين .
- ارتفاع حمائر الكبد والليروين .
- الحمى - والإنتفاخ الجلدي .

٢ - المزمنة : - عودة ارتفاع الكالسيوم بعد انخفاضه في المصل .

- تموت الأنسجة المحيطة بالوريد والأنسجة تحت الجلد ، ويمكن تجنب ذلك بحقه ممدداً بـ ١٥٠ ، ٥٠٠ سم ٣ .

- لا يعطى الدواء عند وجود قصور في وظائف الكلية أو الكبد .


#### الجرعة الدوائية :

وهي تختلف باختلاف الإستطابات ففي حالة استخدام الدواء في معالجة سرطان الخصية ( وهذه المعالجة ألغيت باكتشاف السيبلاتين ) والجرعة من التجارب السابقة تراوح ما بين ٢٥ - ٣٠ ميكروغرام / كغ / يومياً لمدة ٨ - ١٠ أيام .

أما في حالة ارتفاع الكالسيوم في المصل أو في البول الناجمة عن الحالات الخبيثة فإن الجرعة هي ٢٥ ميكروغرام / كغ يومياً ولمدة ٢ - ٣ أيام ثم بعد ذلك يمكن إعطاء الدواء بنفس الجرعة وبمعدل كل يومين حتى نحصل على التأثير الخافض للكالسيوم المناسب ولكن إعطاء أكثر من ٢ - ٣ جرعات يجب أن يترافق بحذر شديد لتجنب الآثار السامة التبدلية للدواء .

#### ٧ - إيداربيسين Idarubicin :

إن التأثير المضاد للأورام الواضح للأدرياميسين والدونورييسين مع السمية منخفضة نسبياً بالمقارنة مع باقي الصادات ، شجع الباحثين على إيجاد عناصر دوائية مشابهة وكانت ثمرة الأبحاث هي إيجاد الدواء المشابه للدونورييسين يدعى إيداربيسين idarubicin حيث تم نزع مجموعة الميثوكسي من الحلقة D في الدونورييسين وبالتالي



شكل رقم ١٣ يبين تركيب دواء 4 - Demethoxydaunorubicin ( idarubicin )

أصبح الدواء الجديد قابل للإمتصاص عن طريق الفم وأقل سمية على العضلة القلبية . ويتمتع بنصف عمر أطول من الدواء الأساسي الذي اشتق منه . إن المستقلب الكلوي للإيداربيسين الذي يدعى idarubicinol وهو أكثر إستقطاباً وفعالية من الدواء الأصلي، ويمكن أن يتركز داخل الخلية وإن التغير الكيميائي في الإيداربيسين يجعل من لون الدواء أصفر بدلاً من اللون الأحمر المميز للدونورييسين واستقلاب الإيداربيسين يتم في الكبد .

### الخصائص الدوائية :

- الوزن الجزيئي ٤٩٧,٥ .
- نصف العمر في البلازما ١٠ - ٣٠ ساعة وبعد الحقن أو إعطائه عن طريق الفم (يتناول بتراجع وظائف الكبد) .
- تصفية كامل الجسم total body clearance ٣٠ - ٦٠ لتر / ساعة / ٢م ( ٥ ٪ كلوية)

### الاستطبابات

- ١ - بقصد أنه : - ابيضاض الدم غير اللمفاوي الحاد ANLL .
- ابيضاض الحاد اللمفاوي وغير اللمفاوي الناكس .
- ابيضاض الحاد الثانوي Acute secondary leukemia .
- سرطان الثدي ( غير معالج سابقاً بالأدرياميسين ) .
- باقي السرطانات لاتزال قيد التجربة .

### الآثار الجانبية :


- ١ - الحادة : - تهبط نقي العظم .
- التهاب الفم والأغشية المخاطية .
- تساقط الشعر Alopecia .
- غثيان - إقياء - قهم ( نقص شهية ) .
- توهج الوجه Flushing .
- ٢ - المزمنة : - إعتلال العضلة القلبية الاحتقاني ( بنسبة أقل من الأدرياميسين ) .
- تصلب الأوردة .
- ٣ - بعض المحاذير الهامة :
- عودة التهاب الجلد الشعاعي .
- تموت الأنسجة عند الحقن خارج الوريد .
- ليس هناك حاجة لتخفيض الجرعة عند حدوث اضطراب في وظائف الكبد .

### الجرعة الدوائية :

في الحقن الوريدي الجرعة لدوائية في الابيضاض غير اللمفاوي الحاد هي ٨ - ١٢ مغ / م<sup>٢</sup> / يومياً ولمدة ٣ أيام وتعطى بنفس الجرعة أما في حالة إعطائه عن طريق الفم فإن الجرعة هي ٥٠ - ٦٠ مغ / م<sup>٢</sup> كل ٢ - ٤ أسابيع وجرعة واحدة single dose .

### ٨ - ميتو كسانترون Mitoxantrone :

وهو دواء من مجموعة الانثراسينيدات antra cenedione ويعمل على الـ DNA إلا أن طبيعة التفاعل مابين الدواء و الـ DNA لاتزال مجهولة .



شكل رقم ١٤ يبين تركيب دواء Mitoxantrone

### الخصائص الدوائية :

- الوزن الجزيئي ٤٤٤

- نصف العمر في البلازما ٢٣ - ٥٧ ساعة ( تتناول بتراجع وظائف الكبد ) .

- تصفية كامل الجسم ١٣ - ٣٤ لتر / ساعة / م<sup>٢</sup> .

- الإستطابات :

١ - بقصد الشفاء : - ابيضاض الدم اللمفاوي الحاد

- ابيضاض الدم غير اللمفاوي الحاد .

- لمفوما لاهودجكن ( كبيرة الخلايا ) ( N . H . L ( larye cell )

٢ - معالجة ملطفة : - الابيضاضات الحادة الناكسة ( لمفاوية وغير لمفاوية )



- ابيضاض الدم اللمفاوي المزمن .

- الورم النقوي المتعدد Multiple Myeloma .
- لمفوما لاهودجكن N . H . L .
- الغرن العظمي وباقي أورام النسيج الرخوة عند النكس أو عند وجود نقائل .
- سرطان المثانة - الثدي أورام الرأس والعنق - الكبد - الرئة - سرطان المبيض
- في المراحل المتقدمة - سرطان البنكرياس .
- الآثار الجانبية ،
- ١ - الحادة : - تثبيط نقي العظم .
- التهاب الفم الأغشية المخاطية .
- تساقط الأشعار ( أقل من الأدريناميسين ) .
- غثيان - إقياء - القهم ( فقد الشهية ) .
- الحكة الوريدية Veinitching .
- ٢ - المزمنة : - اعتلال العضلة القلبية الإحتقاني .
- تلون أزرق للأوردة والصلبة والأظافر .
- ٣ - بعض المخاذير الهامة :
- عودة التهاب الجلد الشعاعي .
- تموت الأنسجة عند الحقن خارج الوريد .
- إقلال الجرعة بمقدار ٥٠ - ٧٥ ٪ عند اضطراب وظائف الكبد .
- الجرعة الدوائية ،
- ١٠ - ١٢ مغ كل ٣ - ٤ أسابيع وريدياً في حانة معالجة الأورام الصلبة والاييضاض
- وحديثاً جُرب إعطاء الدواء بثنريد وريدي مستمر لمدة ٢١ يوم وكانت الجرعة
- القصى المحتملة هي ١,١ مغ / ٢م يومياً وتكرر كل ٦ أسابيع .

# القلويدات

## Vinkalkaloid and Epipodophylotoxine

وهي عبارة عن أسس عضوية تشكل في النباتات ولها صفات دوائية وتشمل عدة أصناف دوائية مهمة ولها إستخدامات سريرية واسعة وسوف نستعرض أدوية هذه المجموعة .



شكل رقم ١٥ يبين تركيب دواء الفكريستين والفنبلاستين A ودواء الفنديزين B



## أولا Vinkaalkaloids :

### ١ - فنكريستين ( VCR ) Vincristine :

- الوزن الجزيئي ٩٢٣ .

- طريقة الإعطاء : ويعطى حقناً وريدياً ويجب أن تتأكد أن القنطرة الوريدية بالوريد قبل بدء الحقن لتجنب حقنه خارج الوريد وبالتالي حدوث التمثوت النسيجي وإذا حدث تسرب الدواء إلى خارج الوريد يجب إيقاف الحقن ثم نحاول سحب ما تبقى من الدواء بواسطة المحقنة ثم بعد ذلك تطبيق حرارة موضعية ويحقن ١٥٠ ملغ تحت الجلد وبشكل محيط. يمكن الحقن من دواء Hyaluronidase أما الحقن داخل السيساء فقد يكون مميتاً ولذلك تم إلغاء هذه الطريقة .

### آلية عمل الدواء :

إن آلية عمل الـ Vinkaalkaloids السامة للخلية هي تأثيرها على القنيات tubules وهي الواحدة الأساسية البروتينية للقنيات المجهرية Microtubules التي تتوافر بغزارة في الخلايا المصابة بالكشم الخلوي وتلعب دوراً هاماً في الحفاظ على شكل الخلية وفي الانقسام والنقل داخل الخلية وإن التعرض المستمر للدواء قد يؤدي لإختفاء هذه القنيات المجهرية .

### الخصائص الدوائية :

بعد إعطاء الدواء بجرعته العلاجية فإن ٤٨ ٪ من الدواء يرتبط بروتينات المصل كما يرتبط الدواء بشكل شديد مع عناصر الدم ( مثل الكريات الحمر والصفائح ) مما أدى إلى استخدام الصفائح المحملة بالفنكريستين VCR - Labeled platelets في معالجة اضطراب الصفائح مثل الفرفرية الأساسية بنقص الصفائح . يستقلب الفنكريستين بشكل أساسي في الكبد وي طرح في البراز ٧٠ ٪ وي طرح لقليل منه عن طريق البول ١٢ ٪ .

ويتركز الدواء بشكل سريع في الصفراء وهذا ما يدعو لإقلال جرعة الفنكرستين عند حدوث اضطراب الوظيفة الكبدية وخاصة الحالات الإنسدادية .

يستطيع الفنكرستين أيضاً دخول الجهاز العصبي المركزي بعد عبوره الحواجز الدماغية الدموية وتركيزه في السائل الدماغي الشوكي يصل إلى ١٠ نانو مول .  
قد يؤدي الـ Asparaginase إلى تعديل الخصائص الدوائية للفنكرستين بتخفيض التصفية الكبدية وقد يؤدي الفنكرستين إلى الإقلال من امتصاص الديجوكسين عن طريق الفم .  
- الإستطباهات indications :

١ - جزء من النظام العلاجي المستخدم لإحداث الهجوع في ابيضاض الدم اللمفاوي الحاد عند الأطفال والبالغين .

٢ - لمفوما لا هودجكن وداء هودجكن .

٣ - ورم ويلمز wilm's tumor .

٤ - ايونغ ewing's sarcoma .

٥ - ورم الأرومة العصبية Neuro blastoma .

٦ - الغرن العضلي المخطط Rhabdomyo sarcoma

٧ - الورم النقوي المتعدد .

٨ - سرطان الثدي وسرطان الرئة صغير الخلايا .

الجرعة الدوائية :

يعطى الفنكرستين بشكل روتيني بالحقن الوريدي بجرعة ٢ مغ / ٢م اسبوعياً للأطفال . أما الجرعة الأسبوعية للكبار فهي ١,٤ مغ / ٢م على أن لا تتجاوز ٢ مغ ، ويجب أن تعدل جرعة الدواء في حال حدوث الآثار الجانبية - خاصة اعتلال الأعصاب المحيطي ، ويوقف الدواء في حال حدوث أعراض عصبية شديدة مثل ضعف المقاومة العضلية - شلل الأعصاب القحفية حتى تتراجع هذه الأعراض ويجب أيضاً انقاص الجرعة عند حدوث اضطراب في وظائف الكبد وتخفض إلى ٥٠ ٪ عندما يكون البيلوروبين أكثر من ٣ مغ / مل ولا يوجد حاجة لانقاص الجرعة الدوائية في حال

إضطراب وظائف الكلية .

الآثار الجانبية :

١ - العصبية : السمية على الأعصاب المحيطة أكثرها شيوعاً وهي التي تحدد جرعة الدواء dosc - limiting وهي تحدث بشكل متكرر عند المرضى الذين تجاوزوا الـ ٤ سنوات وتعود لتراكم الجرعة وعادة ما تبدأ بتشوش حس متناظر ولكن يمكن أن يكون هناك ألماً عصبياً وإضطراب في الحركة وقد تغيب المنعكسات العميقة - هبوط قدم - هبوط المعصم الرنح وقد يحدث الشلل paralysis باستمرار حقن الدواء ويبدأ عادة اعتلال الأعصاب بعد إعطاء جرعة عند البالغين أكثر تحملاً لهذه الجرعة تراكمية تتراوح ما بين ١٥ - ٢٠ مغ والأطفال أكثر تحملاً لهذه الجرعة من البالغين ولوحظ أن مرض اللقموما يتعرضون لهذا الاختلاط أكثر من من غيرهم . إن الاختلاطات العصبية الأخرى مثل إضطراب الحس والحركة وشلل الأعصاب القحفية - الاختلاجات - تقيم الوعي - الأرق والهلوسة يمكن أن تحدث في بعض الحالات .

أما حقن الفنكرستين VCR داخل السحايا فإنه يؤدي لحدوث اعتلال أعصاب حركي حسي واعتلال دماغ Encephalopathy والموت . ويمكن أن تقلل من الآثار الجانبية العصبية للفنكرستين والتأثير المثبط لنقي العظم للفينبلاستين وذلك بإعطاء حمض الغلوتاميك Glutamic acid ولاتعرف آلية هذا الدواء في الإقلال من الآثار الجانبية .

٢ - الآثار الهضمية : إمساك - تشنجات بطنية - نقص وزن - غثيان - إقياء - تقرحات الفم - الإسهال - شلل الأمعاء - تموت الأمعاء أو الانتفاخ وقد يحدث القهم anorexia .

٣ - الآثار البولية : تعدد بيلات - عسرة بول - سلس بولي incontinence احتباس بول - ولذلك تستبعد الأدوية التي قد تسبب احتباس بولي عند كبار السن خلال الأيام القليلة الأولى بعد إعطاء الفنكرستين .

٤ - الآثار القلبية الوعائية : ارتفاع التوتر الشرياني وانخفاضه - وقد سجلت حالات من احتشاء العضلة القلبية الحاد .

- ٥ - الآثار الهرمونية : قد يؤدي لإفراز غير المناسب من الهرمون المضاد للإدرار .  
inappropriate anti diuretic hormone syndrom ( SIADHS )
- ٦ - الآثار الدموية : تبييط نقي العظم الشديد نادراً ما يحدث ولكن قد يحدث فقر دم - نقص صفيحات أو نقص الكريات البيض .
- ٧ - الآثار الجلدية : تساقط الأشعار - الطفح الجلدي Rashes في ٢٠ ٪ من المرضى  
الفنكرستين مخرش شديد للجلد لذلك يجب أن يؤخذ الحذر من تسرب الدواء خارج الوريد .
- ٨ - آثار أخرى : حمى دون أي سبب واضح قد تحدث بعد حقن الفنكرستين .
- ٩ - فنبلاستين Vinblastine :
- الوزن الجزيئي : ٩٠٩,١ دالتون .
- التركيب الكيميائي  $C_{46}H_{58}N_4O_9H_2SO_4$
- الاسم الكيميائي Vincalukoblastine sulfate
- طريقة الإعطاء ، يعطى الفنبلاستين حقناً وريدياً ودفعة واحدة ( Bolus ) ويمكن أن يحل بـ ١٠٠ مل ويعطى بشرب وريدي ولمدة ٣٠ دقيقة ويجب الانتباه عند الحقن الوريدي حتى تمنع الحقن خارج الوريد لأن الدواء مخرش شديد وقد يؤدي لتموت الأنسجة ، وعند حدوث ذلك يجب إيقاف الدواء فوراً ومحاولة رشف ماتبقى من الدواء بواسطة المحقنة ثم يحقن بشكل محيط لمكان الحقن ١٥٠ مغ من دواء hyalouronidase تحت الجلد لتقليل الألم ومنع حدوث الإلتهاب ويجب أيضاً إجراء فحص دم عام قبل إعطاء الدواء إذا كان هناك اضطراب بوظائف الكبد تعدل الجرعة وفقاً لذلك أما اضطراب وظائف الكلية فلا يحتاج لتعديل الجرعة ، والخصائص الدوائية تشابه تماماً خصائص الفنكرستين .
- الإستطبايات ،
- ١ - جزء اساسي في المشاركات الدوائية لمعالجة سرطان الخصية ( PVB ) بلوماسين + سيسبلاتين + فنبلاستين .

٢ - لمفوما لاهودجكن وداء هودجكن ( ABVD ) أدرياميسين + بليومايسين +  
 فنبلاستين و POCARBAZINE وهذه المشاركة اما تعطى لوحدها أو بالتناوب مع  
 (MOPP) الخردل الآزوتي Nitrogen Mustard + فنكرستين + بروكاربازين + ريدنيزون.  
 ٣ - سرطان الثدي إما كدواء وحيد أو جزء من مشاركة دوائية - سرطان المثانة -  
 سرطان الرئة - غرن كابوزي kaposi's sarcoma - الفطار الفطرائي Mycosis Fungoides  
 - السرطانة المشيمة chorio carcinoma المقاومة لباقي الأدوية .  
**الجرعة الدوائية :**

في حال إستخدام الدواء بمفرده وبجرعة اسبوعية فإن الجرعة نزاوح ما بين ١,٠ -  
 ٣,٠ مغ / كغ ويمكن البدء بجرعة اسبوعية ٢,٥ - ٣,٧ مغ / ٢م اسبوعياً للأطفال  
 والبالغين . عند إستخدام الدواء بمشاركة دوائية مثل ABVD فإن الجرعة هي ٦ مغ /  
 ٢م ويجب تخفيض الجرعة بمعدل ٥٠ ٪ إذا كان البليروين أكثر من ٣ ملغ .  
**الآثار الجانبية :**

١ - الآثار الدموية : تثبيط نقي العظم وخاصة نقص الكريات البيض ، أما فقر الدم  
 ونقص الصفيحات فهما غير شائعين .

٢ - الآثار الهضمية gastrointestinal التهاب الأغشية المخاطية والتهاب الفم وهي أكثر  
 حدوثاً بعد حقن الفنبلاستين مع الفنكرستين - غثيان - إقياء - قهيم - اسهال - التهاب  
 الأمعاء النزفي وأعراض هضمية أخرى ناجمة عن الآثار العصبية مثل الإمساك - شلل  
 الأمعاء Ileus آلام البطن وخاصة بعد الجرعات العالية وعند استخدامه بالمشاركة PVB  
 مع السيسبلائين والبليومايسين .

٣ - الآثار العصبية : تحدث الآثار العصبية بشكل أقل من حدوثها بعد حقن  
 الفنكرستين وعادة ماتحدث هنا عند استخدام الفنبلاستين لفترة طويلة جداً وهي نفس  
 الآثار التي تحدث باستخدام الفنكرستين .

٤ - الآثار القلبية الوعائية : - إرتفاع التوتر الشرياني أكثرها حدوثاً .

- احتشاء العضلة القلبية والحوادث الوعائية الدماغية ( CVA )

- ظاهرة رينود Rhaynoud's phenomenon وخاصة في المشاركة PVB ولقد وجد أن

استخدام الـ Nifidin من مجموعة calcium channel blocking يخفف الأعراض .

٥ - الآثار الرئوية : وذمة الرئة الحادة Acute pulmorary edema .

- تشنج القصبات الحاد Acute broncheospasm .

- الزلة التنفسية Dys pnea وخاصة عند استخدامه مع الميتومايسين Mitomycin .

٦ - الآثار الجلدية : - تساقط الشعر .

- التحسس للضياء photosensitivity .

٧ - الآثار الهرمونية : - متلازمة افراز الهرمون المضاد للإدرار غير المناسب ( SIAH ) .

٨ - الآثار الأخرى : - ألم في الأنسجة الحاوية على الورم .

ثالثاً - فنديزين ( VDS ) Vendesine :

الوزن الجزيئي ٨٥١,٩ دالتون .

التركيب الكيميائي :  $C_{49}H_{55}N_5O_8H_2SO_4$

طريقة إعطاء الدواء : يعطى الفنديزين VDS - عادة بالحقن الوريدي ودفعة واحدة ويمكن أن يعطى بالتثريب الوريدي المستمر ويمكن أن يحل بالمحلول السكري دكستروز ٥٪ أو بالمصل الفيزيولوجي ويكون الدواء ثابتاً في هذه الحالة لمدة ٢٤ ساعة على الأقل بدرجة حرارة الغرفة ٢٢ - ٢٥° درجة مئوية وكما في الدوائير "تساقين يجب الحذر من خروج الدواء خارج الوريد وتتخذ نفس الإجراءات المذكورة سابقاً في حال حدوث ذلك .

بمركبات الدوائية هي نفسها حرائك الفينكستين والفينلاستين .  
الإستطبابات ،

الدواء متوفر فقط للأبحاث في الوقت الحاضر ولوحظ أن معدل الإستجابة في سرطان الرئة غير صغير الخلايا non smoll cell lung cancer بالمشاركة ماين الميسبلاتين و VDS أو VDS والميتومايسين أعلى من المشاركات الأخرى ولوحظ تأثير فعال الدواء

في أبيضاض الدم اللمفاوي الحاد - أبيضاض الدم النقوي المزمن الميلايومت الخبيث -  
الأورام الصلبة عند الأطفال - سرطان الكلية - سرطان الثدي - سرطان المري وسرطان  
الكولون والمستقيم .

الجرعة :

عند إعطاء الدواء دفعة واحدة حقناً وريدياً الجرعة الدوائية ٣ - ٤ مغ / ٢م كل  
٧ - ١٤ يوم ، عند إعطائه بالشراب الوريدي المستمر أو المتقطع الجرعة ١ - ٢ مغ /  
٢م يومياً لمدة ١ - ٢ يوم تقريباً ١,٢ مغ / ٢م يومياً لمدة ٥ أيام كل ٣ - ٤ أسابيع .  
يجب إنقاص الجرعة عند الإضطراب الشديد في وظائف الكبد .

الآثار الجانبية :


- ١ - الدموية : نقص البيض أكثر شيوعاً - نقص الصفائح أقل شيوعاً .
- ٢ - العصبية : تشوش حس - وإعتلال الأعصاب الحسي Distal sensory neuropathy -  
الضعف العضلي وغياب المنعكسات العميقة - امساك - خزل الأمعاء ileus - الألم  
العضلي - احتباس البول - الدوار .
- ٣ - الأعراض الهضمية : إتهاب الفم والأغشية المخاطية - غثيان - إقياء - قهيم .
- ٤ - الجلدية : تساقط الشعر - طفح جلدي .
- ٥ - آثار أخرى : حمى - نعاس - إتهاب الوريد phlebitis .

## مجموعة الـ Epipodo phyllotoxin

١ - إيتوبوسيد ( vp16 ) Etoposide :

- الوزن الجزيئي ٥٨٨,٦

- الصيغة الكيميائية :  $C_{29}H_{32}O_{13}$



شكل رقم ١٦ يبين تركيب دواء ( VP - 16 )

### طريقة إعطاء الدواء :

عند الحقن الوريدي يجب أن يمدد الدواء حتى يصل التركيز ٠,٢ أو ٠,٤ مغ/مل بسروم سكري ٥٪ أو سروم فيزيولوجي ٠,٩ ٪ وهو المفضل ويجب أن يعطى بتريپ وريدي infusion على مدى ٣٠ - ٦٠ دقيقة لتجنب إنخفاض الضغط ويمكن إعطاء الدواء بتركيز على ٠,٦ مغ / مل ويعطى بمعدل ٢,٥ سم ٣ بالدقيقة ، يمكن أن يسبب الدواء تحريشاً شديداً عند حقنه خارج الوريد كما يمكن أن يسبب الطفح الجلدي عند ملامسة الدواء لذلك يستحسن إستخدام القفازات عند حل الدواء ويجب غسل المنطقة التي تعرضت للدواء مباشرة بالماء والصابون ويمكن إعطاء الدواء عن طريق الفم .



### آلية عمل الدواء :

وتعمل هذه المجموعة على منع إنقسام الخلية وتراكم الخلايا في المرحلة المتأخرة من طور التكاثر S أو طور الراحة G2 وبالرغم من أن الآلية الدقيقة لانتزاع غير واضحة إلا أن الأذية الخلوية قد تنجم عن تحطم وحيد أو مزدوج في روابط الـ DNA. الخصائص الدوائية :

عند البالغين وفي حال كون وظائف الكلية ووظائف الكبد طبيعية فإن تصريف الدواء من البلازما وهي عملية ثنائية الطور ونصف العمر النهائي يتراوح ما بين ٣ - ١١ ساعة . تصفية الدواء الكلوية لا تعتمد على الجرعة وهذه التصفية تتراوح ما بين ٧ إلى ٢٨ + ٩,٧ مل / دقيقة / م٢ .

يستقلب الدواء بانفتاح حلقة اللاكتون والمستقلبات الناجمة ليست لها فعالية قوية مضادة للسرطان .

- يرتبط الدواء بشدة ببروتينات الدم ( ٩٤ ٪ من الدواء يرتبط بالبروتينات ) .  
فيما يلاحظ أن الدواء الحر غير المرتبط بالبروتين يكون أعلى في مصل المرضى المصابين بالسرطان منه عند المتطوعين غير المصابين به .

- لا يخترق الدواء الحواجز الدماغية الوعائية بشكل فعال .  
الاستطبابات :

١ - سرطان الخصية وسرطان الرئة صغير الخلايا .

٢ - لمفوما لا هودجكن N. H. L.

٣ - الغرن عند الأطفال وغرن كاربوزي

٤ - Gestational trophoblastic tumor

٥ - له تأثير ضعيف في معالجة سرطان الثدي - الكلية - الميلايوم - سرطان المثانة - وسرطان عنق الرحم .

الجرعة الدوائية :


نادراً ما يستخدم الـ VP16 كدواء وحيد إلا في معالجة غرن كاربوزي حيث يعطى

- بجرعة ويديّة ١٥٠ مغ / ٢م / يومياً لمدة ٣ أيام كل ٤ أسابيع .
- بشكل عام الجرعة الوريدية هي ٥٠ - ١٥٠ مغ / ٢م / يومياً لمدة ٣ إلى ٥ أيام كل ٣ - ٤ أسابيع .
- يمكن إعطائه كل يومين بجرعة ١٠٠ - ١٢٥ مغ / ٢م / يومياً في الأيام ١ - ٣ - ٥ .
- الجرعة الاسبوعية تتراوح ما بين ٢٠٠ ، ٢٥٠ مغ / ٢م / اسبوعياً .
- في سرطان الرئة صغير الخلايا فإن الجرعة عن طريق الفم عند العلاج لفترة طويلة ( ٢١ يوم ) هي ٥٠ مغ / ٢م / يومياً .
- الآثار الجانبية :
- ١ - الدموية : تثبيط نقي العظم وهو متعلق بالجرعة الدوائية وانخفاض المحببات شائع Granulocytopenia ويحدث الشفاء التام عادة بعد ٢٠ يوم من إعطاء الجرعة .
  - السمية التراكمية على نقي العظم غير شائعة .
  - ٢ - المعوية : غثيان - إقياء - نقص الشهية والإسهال - عسرة البلع - التهاب الفم .
  - ٣ - التحسسية ( الأرجية ) : انخفاض توتر شرياني عابر بعد الحقن السريع ويزول بتوقف حقن الدواء وإعطاء السوائل الوريدية .
  - الأعراض المشابهة للصدمة التأقية : مثل العرواءات - الحرارة - تسرع القلب - تشنّج القصبات والزلة التنفسية يمكن أن تحدث ولكن بنسبة قليلة ٢ % .
  - ٤ - الجلدية : تساقط الشعر - ازدياد تصبغ الجلد وبشكل نادر عودة التهاب الجلد الشعاعي .
  - ٥ - آثار أخرى : الكبدية وتحدث بجرعات عالية أذية كبدية قابلة للتراجع .
  - إعتلال أعصاب محيطية وهو إختلاط ناد ويحدث عادة عند إستخدام الفينكريستين مع الـ VP16 .
  - القلبية : إحتشاء عضلة قلبية أو قصور قلب إحتفاني عند وجود آفة اكليدية سابقة .

## ٢ - تينبوسيد ( VM 26 ) : Teniposide

الوزن الجزيئي ٦٥٦,٧ دالتون .

التركيب الكيميائي  $C_{32}H_{32}O_{13}S$



الشكل رقم ١٧ يبين تركيب التينبوسيد ( VM26 ) Teniposide

### طريقة إعطاء الدواء :

يجب إعطاء الدواء بالترييب الوريدي فقط intravenous infusion بعد تمديدته بمحلول سكري ٥٪ أو سيروم ملحي ٠,٩٪. ويعطى لمدة ٤٥ دقيقة للإقلال من خطر حدوث هبوط التوتر الشرياني ، ويمكن إعطاء الدواء حقناً في المثانة في حال الأورام السطحية ويحل في هذه الحالة ٥٠ مغ من VM 26 بسيروم ملحي ٠,٩٪ كلور الصوديوم ويحقن خلال ساعة .

ويمكن أن يحدث التهاب المثانة الكيميائي عند ثلث المرضى .  
الإستطبابات :

- ١ - لمفوما وأورام الدماغ ( عند البالغين ) .
  - ٢ - ابيضاض الدم عند الأطفال بالمشاركة مع السيترين أرايبنوزيد وخاصة ابيضاض الدم اللمفاوي الحاد وعند حدوث النكس وعند كون الإنذار سيئ .
  - ٣ - يمكن حقنه داخل المثانة في حال أورام المثانة .
- الجرعة اللوائية :

الجرعة المثالية ونمط إعطاء الدواء لاتزال قيد الدراسة ولكن يعطى عادة بجرعة ١٥٠ - ٢٠٠ مغ / ٢م مرتين اسبوعياً لمدة أربعة أسابيع مشاركة مع باقي الأدوية في

معالجة أبيضاض الدم عند الأطفال .

في الأورام الصلبة يعطى بجرعة اسبوعية ٦٠ - ٩٠ مغ / م٢ أو يمكن إعطاء معالجة أكثر شدة وذلك بجرعة يومية ٦٠ مغ / م٢ لمدة ٥ أيام .  
الآثار الجانبية ،

١ - الدموية : تثبيط نقي العظم وخاصة نقص البيض Leukopenia يزداد معدل الحدوث عند وجود معالجة كيميائية سابقة أو شعاعية .

٢ - المعوية : غثيان - إقياء - اسهال - التهاب الفم .

٣ - آثار أخرى : إنخفاض توتر شرياني بعد الحقن السريع لذلك يعطى بتثريب وريدي على مدى ٣٠ - ٤٥ دقيقة - حمى - عرواءات - تشنج قصبات - الارتكاسات الشروية urtecaira والتوهج Flushing .

وهذه الآثار تتراجع لوحدها عند إيقاف الحقن ، ويمكن إعطاء الهيدروكورتيزون مع ال diphenhydramine .

- تساقط الشعر .

- ارتفاع حمائل الكبد وإعتلال الأعصاب المحيطية .

## مجموعة النتروسويوريا

### Nitrosourea

وهي أدوية قابلة للإ انحلال بالدهن ومشتقة من مركب ن - ميثيل - ن -  
نتروسويوريا N - methyl - N - nitrosourea ، وتستخدم سريرياً في علاج أورام الدماغ  
والجهاز الهضمي - اللمفوما - الميلانوم الخبيث وسرطان الرئة صغير الخلايا small cell  
lung cancer ولقد لوحظ أن هذه المجموعة تستطيع عبور الحواجز الدموية الدماغية  
(BB.B) وبتركيزها الدوائي الفعال . ولقد تم تصنيع العديد من المركبات المشتقة من  
MNu مثل ( CCNU ) - lomustine ( BCNU ) - Methyl - carmustine ( Semustine )  
( CCNU ) - ( PCNU ) وهناك صاد حيوي من مركبات MNu ولكن طبيعي يؤخذ من  
البكتريا streptomyces achromogenes يدعى دواء الستربتوزوتوسين streptozotocin وهو  
فعال تجاه الخلايا الإيضية ولكنه سام على الخلايا B في البنكرياس ولذلك فإن  
استخدامه الحالي هو في علاج بعض الأورام الخبيثة خلايا لجزر islet cell tumor مثل  
insulinoma والكارسينويد carcinoid .

آلية عملها :

إن تفكك الدواء الكيميائي وإنتاج مجموعة أو سلسلة من الأجزاء المقلونة  
alkylating أو carbomyolate الجزئيات الخلوية الكبيرة cellular macro molecules ويعتبر  
النشاط المقلون للنترو سويوريا هو الآلية الأساسية لتأثيرها المضاد للأورام .  
الآثار الجانبية :

بالنسبة لمجموعة الكلور إيثيل نيتروسويوريا فإنها تؤدي لحدوث تأثيرات معوية  
وإختلاطين يحدان من جرعة الدواء وهما تثبيط نقي العظم التراكمي وأذية الأنابيب  
الكلوية وتلاحظ في ميثيل نيتروسويوريا Methyl nitrosourea وستربتوزوتوسين  
streptozotocin ويمكن حدوث آثار مزمنة في الرئة والكلى عند الإستخدام الطويل

كما يمكن أن تحدث الإختلاطات العصبية عند إستخدامها بجرعات عالية .

١ - الآثار المعوية : غثيان - إقياء - وهما شائعين في جميع المركبات والستريتينوزوتوسين يترافق بالإقياءات أكثر من غيره .

٢ - الآثار الرئوية : وتحدث عند الإستخدام المديد وتظهر بسعال جاف - زلة تنفسية - عند أكثر من ٥٠ ٪ من المرضى المعالجين بجرعة أكبر من ١٥٠٠ مغ / م٢ من دواء BCNU وتكون صورة الصدر ضيعية .

### أدوية المجموعة :

١ - كارموستين ( BCNU ) Carmustine :

ويستخدم كدواء وحيد عند المرضى غير المعالجين سابقاً بجرعة ٢٠٠ مغ / م٢ ويعطى بترتيب وريدي Infusion لمدة ١ - ٢ ساعة والحقن السريع يمكن أن يترافق بحس حرق وأنم في مكان الحقن أو على طول الوريد وتكرر الجرعة كل ٦ أسابيع . ويمكن إستخدام محلول الدواء بتركيز ٠,٥ - ٣ مغ / مل مع ٣٠ ٪ كحول بشكل موضعي في لمفوما الخلايا T الجلدية .  
الإستطبائات :

١ - داء هودجكن - ولمفوما لاهودجكن - الورم النقوي المتعدد والميلانوم ( كمعالجة ملطفة ) .

٢ - إستطبائه الأساسي في معالجة أورام الدماغ البدئية لأنه قابل للإتحلال بالدمم ويعبر الحواجز الدماغية الوعائية .

٢ - Lomustine ( CCNU ) :

يعطى عن طريق الفم بجرعة ١٠٠ - ١٣٠ مغ / م٢ جرعة واحدة وتكرر كل ٦ أسابيع ويجب أن تخفض الجرعة عند إستخدامه مع أدوية أخرى مثبطة لنقي العظم . ويعطى الدواء على معدة فارغة ويجب تجنب الكحول في اليوم الذي أعطي فيه الدواء .  
الإستطبائات :

أورام الدماغ البدئية - سرطان الرئة صغير الخلايا - داء هودجكن - لمفوما لاهودجكن

- الورم النقوي المتعدد .

٣ - Semustine ( MeCCNU ) :

ويعطى عن طريق الفم ويفرز عن طريق الكلية ويصل لتراكيز كافية في السائل الدماغي الشوكي ويمكن أن يؤدي للقصور الكلوي للزمن عند إعطائه بجرعة تراكمية أكثر من ١٥٠ مغ / م<sup>٢</sup> ويتوافق إستخدامه بازدياد معدل الإصابة بابيضاض الدم الحاد.

٤ - Streptozotocin<sup>R</sup> ( Zamosar ) :

وهو مركب طبيعي من مركبات النتروسويوريا nitrosourea ويتتج بواسطة العضوية الدقيقة المسماة streptomyces achromogenes ويعطى بالثريب الوريدي ولمدة ١٥ - ٦٠ دقيقة وأكثر الآثار الجانبية شيوعاً هو الإقياء وأكثر مايجد من إستخدام الجرعة الدوائية السمية على الكلية .  
الإستطبابات :

أورام الجزر الخبيثة Malignant Islet cell tumor — الكارسينويد ويستخدام مشاركة مع SFU - أورام رأس البنكرياس .

## الانظيمات ومركبات أخرى

### Enzymes and Random synthetics

#### ١ - L - asparaginase : اسبراجيناز

وهي خميرة مصدرها بكتريا تدعى E coli L - asparaginase وإستخدامها السريري الوحيد هو إحداث الهجوع في إبيضاض الدم اللمفاوي الحاد ( A . L . L ) وكدواء وحيد يمكن أن يترافق بمعدل إستجابة تام ( CR ) يصل لـ ٥٠ - ٦٠ ٪ ولكن فترة الهجوع الحاصلة قصيرة وسطياً ١ - ٨ أشهر ولذلك فإنه يستخدم مشاركة مع باقي الأدوية وليس للدواء أي فعالية في الأورام الصلبة .  
آلية التأثير :

إن الخميرة تؤدي إلى تثبيط تركيب البروتينات وتثبط تركيب الحموض النووية DNA و RNA .  
طريقة إعطاء الدواء :

يمكن إعطائه بالتثريب الوريدي بعد حله بـ ٥ ٪ سكري .  
ويعطى لمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة ويعطى حقناً عضلياً بعد حل بـ ٢ مل .  
الجرعة الدوائية :

الجرعة الإعتيادية في ALL ٦٠٠٠ وحدة / ٢م كل يومين لمدة ٣ - ٤ اسابيع أو جرعة يومية ١٠٠٠ وحتى ٢٠,٠٠٠ وحدة / ٢م ولمدة ١٠ إلى ٢٠ يوم ويستخدم عادة مشاركة مع الأدوية الأخرى مثل الفنكرستين ( VCR ) والبريدنيزولون .  
الآثار الجانبية :

وتنجم عن الإرتكاسات التحسسية وهي عند البالغين أشد منها عند الأطفال .  
١ - الأعراض الناجمة عن فرط التحسس - الحمى - الشرى - الزلة التنفسية - هبوط التوتر الشرياني - الألم الشرسوفي - يلاحظ عند ٢٥ ٪ من الحالات ويمكن أن تحدث الصدمة التأقية في ١٠ ٪ من الحالات وهي أشيع في الحقن الوريدي وعند إعطاء



المعالجة المتقطعة ( كل أسبوع ) أكثر من المعالجة المستمرة يومياً أو كل يومين .  
- تعب عام ألم عضلي - القهم - غثيان - إقياء ويمكن أن ترتفع حمائر الكبد .  
- يمكن أن يرتفع سكر الدم . ويختفي بعد إيقاف الدواء .  
- إنخفاض الأميلاز المترافق مع أعراض التهاب البنكرياس ( السمية على البنكرياس  
مرتبطة بالجرعة ) وإيقاف الدواء يمكن أن يؤدي لتراجع الأعراض .  
- يمكن أن يؤدي لإنخفاض الفيبرينوجين وعوامل التخثر ( الثالث والتاسع والحادي  
عشر ) .

- الحوادث التخثرية والنزفية أكثر شيوعاً في الجهاز العصبي المركزي ( الإحتشاء  
القشري ) Cortical Infraction والنزف داخل الدماغ intracerebral hemorrhage ،  
والأعراض قد تكون صداع - تراجع في الملكات العقلية - غثيان - إقياء - اختلاجات  
والإنذار عادة جيد .

يمكن أن يؤدي للهلوسة وسلوك غير طبيعي وتراجع الأعراض بإيقاف الدواء .

## ٢ - داكاربازين ( DTIC ) :

آلية عمل الدواء :

يعطى الدواء تأثيره المضاد للأورام من خلال تأثيره المقلون وإستقلابه في الكبد  
يؤدي إلى إنتاج مركب methyl diazonium وهذا المركب يثبط تركيب DNA .  
طريقة إعطاء الدواء :

عند إعطائه بالحقن الوريدي وبسرعة يؤدي إلى ألم على طول الوريد ولذلك  
يفضل تمديده بـ ١٠٠ - ٢٠٠ مل من السروم السكري أو الملحي ويعطى بترتيب  
وريدي لمدة ١٥ - ٣٠ دقيقة .

الجرعة الدوائية :

يُعطى بعدة طرق أكثرها شيوعاً هي ٢٥٠ مغ / ٢م يومياً ولمدة ٥ - ٦ أيام أو  
٨٥٠ مغ / ٢م بيوم واحد ويمكن تكرار العلاج كل ٢١ يوم .

الإستطبابات : الميلانوم - أورام النسيج الرخوة Soft tissue sarcomas - داء هودجكن -

- الأورام البطنية العصبية المفرزة للهرمونات ( APUDOMA ) .
- بالنسبة للميلاتوم الخبيث يعتبر ( DTIC ) أكثر الأدوية فعالية ويستخدم كدواء وحيد في علاجه أما في باقي الامراض فيستخدم بمشاركة دوائية .
- الآثار الجانبية ،
- تثبيط نقي العظم وخاصة الكريات البيض والصفائح .
- الغثيان ويكون شديداً في اليوم الأول ويمكن تخفيضه بإعطاء جرعة منخفضة في اليوم الأول ثم تزداد تدريجياً .
- التعب العام والألم العضلي بعد أسبوع من العلاج ويتراجع لوحده ودون علاج .
- يمكن أن يقوي من سمية الأدريناميسين على العضلة القلبية .

### ٣ - هيكساميثيل ميلامين ( H . MM ) Hexame thymelanine :

- على الرغم من فعالية الدواء القليلة في معالجة سرطان الثدي وسرطان باطن الرحم - اللفموا - سرطان المثانة المسبب بالبلهارسيا وسرطانات الرأس والعنق إلا أن أهميته السريرية تنبع من تأثيره على السرطانة الغدية للمبيض وسرطان القصبات .
- آلية التأثير :

آلية التأثير لاتزال غير معروفة ولكن يعتقد بأن الدواء يثبط تكون الـ DNA و الـ

RNA .

#### الخصائص الدوائية :

- يعطى الدواء عن طريق الفم ويمتص من الجهاز الهضمي بسرعة ويتم استقلاب الدواء في الكبد .
- نصف العمر في البلازما ٢,٩ - ١٠,٢ ساعة ويبلغ تركيز الدواء في السائل الدماغي الشوكي ٦ ٪ من تركيزه في البلازما .
- طريقة إعطاء الدواء ،

يُعطى الدواء عن طريق الفم وبجرعات يومية تؤخذ بعد الطعام ويمكن إعطاء الريدوكسين PYRIDOXINE مع الدواء للإقلال من سمية الدواء على الأعصاب المحيطة

ولكن لم تثبت هذه الطريقة أي فعالية .  
الجرعة الدوائية :

أكثر الأنظمة العلاجية تعطي H . MM بجرعة ٤ - ١٢ مغ / ٢م وتكرر كل ٢٨  
إلى ٤٢ يوم .  
الآثار الجانبية :

- تثبيط نقي العظم ( متوسط ) .
- غثيان - إقياء - اسهال - قهيم - تشنجات بطنية .
- الغثيان يبدأ عادة بعد عدة أيام من بدء العلاج .
- إعتلال إعصاب محيطية ( تشوش حسي - ضعف عضلي ) .
- رنح - رجفان tremors وزيادة المنعكسات .
- أعراض عصبية أخرى مثل الهلوسة - الإختلاجات الإكتساب وتراجع بإيقاف الدواء.

#### ٤ - هيدروكسي يوريا ( H . U ) Hydroxy urea :

ويستخدم بشكل واسع في علاج ابيضاض الدم النقوي المزمن وفي الحالات  
الدموية الأخرى مثل : إحمراز الدم Polycy Themia Vera .  
- القفرية الأساسية - الإبيضاض الحاد ويسبب الدواء نقص عابر وسريع في الكريات  
البيضاء والصفائح الدموية .

في الهجمة الحادة Blastic crises من ابيضاض الدم النقوي المزمن يعتبر الهيدروكسي  
يوريا الدواء الأساسي الذي يُبدأ به خلال فترة وضع الخطة العلاجية المناسبة .  
- أظهر الدواء فعالية في علاج سرطان الكلية - الميلانوم - سرطان المبيض - سرطانات  
الرأس والعنق - سرطان البروستات حيث يشارك مع باقي الأدوية أو مع المعالجة  
الشعاعية .

طريقة إعطاء الدواء ،

يعطى عن طريق الفم وبعدها جرعات يومية أو بجرعة يومية وحيدة وفي حال عدم

مقدرة المريض على البلع يمكن أن يحل محتوى الكبسولة مع الماء أو يؤخذ مع الطعام .  
الجرعة :

الجرعة الإعتيادية اليومية ٢٠ - ٥٠ مغ / كغ حتى ينخفض تعداد الكريات لـ أقل من ٥٠,٠٠٠ في الليتر ثم بعد ذلك تعدل الجرعة أو توقف المعالجة بشكل مؤقت وعند معظم المرضى يمكن السيطرة على الأعراض بجرعة يومية ١ - ٣ غ والنسبة لباقي الأمراض الدموية فإن الجرعة هي نفسها .

- في الأورام الصلبة : يُعطى الدواء بجرعة ٢٠ - ٣٠ مغ / كغ يومياً أو ٨٠ مغ / كغ كل ٣ أيام وتوقف المعالجة إذا هبطت الكريات البيض أقل من ٢٥٠٠ / مم<sup>٣</sup> أو الصفائح لأقل من ١٠٠,٠٠٠ مم<sup>٣</sup> .

الآثار الجانبية ،

- تثبيط نقي العظم وخاصة إنخفاض البيض وتبدأ بعد ١٠ أيام .

- الغثيان - الإسهال - إمساك - التهاب الفم .

٥ - الميتوتان ( <sup>R</sup>lysodren Mitotane ) :

الإستخدام السريري الوحيد لهذا الدواء هو معالجة سرطان قشر الكظر في حالة النكس أو عدم إمكانية الإستئصال أو في حال وجود نقائل كما جرب إستخدام الدواء في المعالجة المتتمة .

طريقة إعطاء الدواء ،

يعطى الدواء عن طريق الفم ولما كان الدواء يتركز في الشحوم فإنه يجب أن يعطى مع وجبات فقيرة بالدهن ويجب أن يعطى مع الدواء الستيرويدات لتعويض انخفاض الـ glyccorticoids الناجم عن الدواء ( مثل كورتيزون امسيتات cortisonacetate ٢٥ مغ صباحاً و ١٢,٥ مغ مساءً ) ويجب الإستمرار بهذه المعالجة التعويضية للستيرويدات لمدة شهر على الأقل بعد إيقاف الدواء وتستمر هذه المعالجة إذا كان هناك قصور بوظائف قشر الكظر .

## الجرعة ،

الجرعة البدئية الإعتيادية هي من ٢ - ٦ غ / يومياً تعطى على ثلاث أو أربع جرعات وتُزاد هذه الجرعة تدريجياً حتى تصل لـ ٩ - ١٠ غ يومياً حتى حدوث السمية أو حتى وصول تركيز الدواء من المصل لـ ١٠ ميكروغرام / مل وقد سجلت جرعات قصوى هي ١٨ - ١٩ غ يومياً وتستمر المعالجة عادة لفترات طويلة من الزمن ولكن إذا لم نحصل على إستجابة خلال ٣ أشهر فإن ذلك يعني فشل المعالجة .

## الآثار الجانبية ،

نقص شهية - غثيان - إقياءات - إسهال - وتحدث عند معظم المرضى عندما تكون الجرعة اليومية ٨ - ١٠ غ .

- الآثار العصبية : الإكتئاب الشديد - النعاس - الدوار - الرنح Ataxia اضطرابات في الرؤية - طفح جلدي تحسسي - بعض الآثار النادرة ( التهاب المثانة نزفي - بيلة بروتينية - بيلة دموية - إرتفاع توتر شرياني - ألم عضلي - هبوط الكريات البيض - إرتفاع حمائر الكبد والحمى ) .

## ٦- بروكاربازين ( Natulan<sup>R</sup> ) procarbazine :

بالرغم من فعالية الدواء في معالجة إحممرار الدم polycythemia vera - الميالوم medulloblastoma - سرطان القصبات والورم النقوي المتعدد إلا أن أكثر الإستخدامات السريرية هي في المشاركات الدوائية لمعالجة داء هودجكن ولفوما لا هودجكن .

## آلية التأثير :

إن استقلاب الدواء في الكبد يؤدي إلى إنتاج جذور حرة نشطة مثل هيدروكسيد الهيدروجين Hydrogen peroxide والפורم الدهيد Formaldehyde والهيدروكسيل التي تقلون الحمض النووي DNA والدواء يعمل على المرحلة S من دورة الحياة .  
طريقة الإعطاء ،

الدواء سريع الامتصاص من الجهاز الهضمي لذلك يعطى عن طريق الفم بثلاث جرعات يومية ويجب ألا يستخدم مع دواء الإيثانول Ethanol أو الإيفيدرين ephedrine .

- مضاد الهستامين ومضادات الإكتئاب ثلاثية الحلقات tricyclic anti depressant وعدم استخدامه مع بعض الأطعمة الغنية بالتيرامين tyramine ( مثل الجبنه والموز ) ويجب الابتعاد عن إعطاء المنومات القوية مثل الباربيتورات ( barbiturate ) لأن للبروكاربازين تأثير منوم متوسط .  
الجرعة :

الجرعة الاعتيادية ٥٠ - ٢٠٠ مغ / ٢م يومياً لمدة ١٠ - ٢٠ يوم وتخفيض الجرعة عند تراجع وظائف الكبد والكلية .  
الآثار الجانبية :

تتبط نقي العظم الذي قد يبدأ متأخراً ( بعد ٤ أسابيع ) ويحتاج لفترة طويلة للشفاء ( ٦ أسابيع ) .

- التأثيرات الهضمية : غثيان - قهيم - الإسهال - ويمكن الإقلال منها بالبداية بجرعة منخفضة ثم زيادتها تدريجياً .

- الآثار التحسسية : الطفح الجلدي - الارتشاحات الرئوية - والحمى ويمكن الإقلال منها بإستخدام الستيروئيدات القشرية corticosteroides .

- التأثيرات العصبية : إكتئاب - الأرق - العصبية - الهلوسة - الرنج - التشوش الحسي - الاختلاجات .

- غياب الحيوانات المنوية والطمث يمكن أن يحدث بالجرعات العالية وقد لاتراجع حتى بتوقيف الدواء .

- للدواء تأثير مسرطن .

#### ٧ - السيسبلاتين <sup>R</sup> ( Cisplatin ( Platinol

- الاسم الكيميائي ( cis - diammine dichlorolpatinum II ( CDDP . وله طيف واسع في معالجة الأورام ولكن دوره في معالجة سرطان الخصية لايزال هو الأهم حتى وقتنا هذا ففي حال وجود نقائل من سرطان الخصية فإن معدل الإستجابة التام للأنظمة الحاوية على السيسبلاتين يصل حتى ٨٠ ٪ وقد تم شفاء ٧٠ ٪ من الحالات وكذلك كل

الحالات المبكرة من سرطان الخصية وذلك بإعطاء الأنظمة الحاوية على السيسبلاتين كعلاج متممة .

ويعتبر السيسبلاتين من أكثر الأدوية فعالية في معالجة سرطان الرئة صغير الخلايا ( S . C . L . C ) وفي معالجة الغرن العظمي المتقدم osteosarcoma وقد تم إستخدامه حديثاً في المعالجة المتممة لهذا المرض ولكن تأثيره أقل على باقي أورام النسيج الرخوة ويستخدم السيسبلاتين أيضاً في معالجة سرطان المثانة - البروستات - سرطان عنق الرحم - باطن الرحم وسرطان المبيض .

وكما يستخدم في معالجة سرطان الرأس والعنق وسرطان المري وأورام thymos التيموس والميلانوم الخبيث وله فعالية أيضاً في سرطان الثدي وورم الأرومات العصبية Neuroblastoma .

#### الخصائص الدوائية :

تصفية الدواء من البلازما تتم بسرعة خلال الساعتين الأولتين من الحقن ولكن بعد ذلك تتباطأ عملية التصفية وذلك لإرتباط الدواء ببروتينات البلازما والكريات الحمر ويتناول زمن التصفية بشكل كبير في حال تراجع وظائف الكلية أو الحبن .  
يخترق الدواء بشكل ضعيف الحواجز الدماغية الوعائية ولكنه يدخل السائل الدماغى الشوكي بعد الحقن الوريدي بتركيز قليلة . يفرز الدواء بشكل رئيسي في البول .

#### طريقة إعطاء الدواء :

يعطى الدواء عادة بالتريب الوريدي intravenous infusion كما يمكن إعطاؤه بالحقن داخل اليريتوان ولكن لاتزال قيد التجربة . في البداية كان الدواء يعطى حقناً وريدياً ودفعه واحدة ولكن السمية الكلوية ألغت هذه الطريقة ويجب إماهة المريض بإعطاء السيروم الملحي ولعدة ساعات قبل إعطاء الدواء الذي يمدد أيضاً بالسيروم الفيزيولوجي ( ٩ ٪ كلور الصوديوم ) بتركيز دوائي ٠,١ إلى ١ مغ / مل كما يعطى المانيتول ٢٥ - ٥٠ مغ أو الفيوروسيميد Furosemide ١٠ - ٤٠ مغ عند بدء إعطاء

الدواء وأخيراً فإن الدواء يعطى بترتيب وريدي خلال ١ - ٢٤ ساعة للإقلال من الإقياء والسمية الكلوية.

الجرعة الدوائية :

ويعطى بجرعات متنوعة ولكن بشكل عام يعطى بجرعة ٤٠ - ١٢٠ مغ / ٢م بجرعة واحدة أو بـ ٥ - ٣٣ مغ / ٢م يومياً ولمدة ٣ - ٥ أيام ويكرر بفواصل زمنية تتراوح من ١ - ٤ أسابيع حسب تحمل المريض .

الآثار الجانبية :

- السمية الكلوية ولكن يمكن تجنبها بالإمالة الجيدة .

- الآثار الهضمية : غثيان - إقياء خلال الـ ٢٤ ساعة ويجب أن تعطى مضادات

الإقياء بشكل وقائي ويستمر لمدة اسبوع بعد إعطاء الدواء .

- تثبيط نقي العظم .

- الآثار التحسسية مثل ظاهرة فرط التحسس ( شرى - طفح جلدي - الصدمة

التأقية ) . ويمكن السيطرة على الأعراض بإعطاء مضادات الهيستامين والستيروئيدات القشرية وأحياناً الأدرينالين .

الآثار تحت الحادة :

- يعتبر السيسبلائين ساماً على الأنانيب الكلوية وخاصة القطعة S القرية وتزداد هذه السمية عند إستخدام الأمينو غليكوزيد ولذلك تستخدم بحذر عند الاشخاص المعالجين سابقاً بالسيسبلائين .

- إنخفاض المغنيزيوم يحدث في ٦٠ ٪ من الحالات وذلك لزيادة المغنيزيوم في البول ولكن غير شائع حدوث الأعراض مثل الإضطرابات العضلية العصبية .

وإن إعطاء المغنيزيوم وقائياً لا يمنع زيادة طرح المغنيزيوم من الكلية ولكن إذا حدث هبوط الكالسيوم في المصل فيجب تعويض المغنيزيوم قبل إعاضة الكالسيوم .

- يسبب الدواء عقم مؤقت عند معظم المرضى وخاصة عند المعالجين بسبب سرطان الخصية فيلاحظ غياب الحيوانات المنوية بعد الجرعة الثانية ولكن يمكن أن يعود التعداد



للطبيعي عند ٤٠ ٪ من المرضى بعد ١,٥ - ٢ سنة .

الآثار المؤرمة : - السمية العصبية والتي تتظاهر باعتلال الأعصاب المحيطية .

- السمية على العصب السمعي ( اضطرابات دهليزية - الصمم ) .

- ظاهرة رينود الوعائية - الحوادث الدماغية الوعائية ( C.V.A ) .

- إمكانية حدوث سرطان آخر أو ابيضاض دم .

٨ - كاربوبلاتين Carboplatin :

تم تصنيع الدواء عام ١٩٨٠ من قبل العالمين كلير و روزينبرغ clear and

rosenberg وهو أول مشابهاة السيسبلاتين وله نفس الفعالية .

طريقة إعطاء الدواء :

ويعطى بثرير وريدي خلال ١٥ دقيقة أو أكثر وليس هناك حاجة للإمهاء قبل

حقن الدواء أو إعطاء المسدرات ويمكن إعطائه حقناً باليريتوان ولكنها لاتزال قيد

التجربة .

الجرعة الدوائية :

يعطى كدواء وحيد بجرعة دوائية ٤٠٠ - ٥٠٠ مغ / م<sup>٢</sup> في اليوم الأول كل ٢٨<sup>١</sup>

يوم في الحالة العامة الحسنة والصورة الدموية الجيدة بجرعة ٢٤٠ - ٣٢٠ مغ / م<sup>٢</sup>

عندما يكون هناك إنخفاض في التعداد الدموي ( الكريات أكثر من ٢٠٠٠ / م<sup>٣</sup>

والصفائح أكثر من ١٠٠,٠٠ / م<sup>٣</sup> ) .

الآثار الجانبية :

- تثبيط نقي العظم .

- السمية على الكلية غير شائعة .

- الإقياء يلاحظ عند ٥٠ ٪ من المرضى عادة خلال الـ ٦ ساعات الأولى

ويتراجع بعد ١٢ ساعة .

- السمية على الأعصاب المحيطة والسمية على العصب السمعي .

- تساقط الأشعار والطفح الجلدي .

## الادوية الهرمونية في معالجة السرطان

### Hormonal agents for the treatment of cancer

المعالجة الهرمونية للسرطان جزء مهم وفعال لعلاج كثير من السرطانات الحساسة للهرمونات مثل سرطان الثدي - سرطان باطن الرحم والبروستات التي يمكن علاجها بشكل فعال بالتدخلات الهرمونية ( الضمهي والخصي الجراحي surgical ablative - المركبات الشبيهة بالهرمونات - مضادات الهرمونات ) .

في الأمراض اللمفاوية الخبيثة ( لمفوما - هودجكن - ابيضاض الدم - الورم النقوي) فإن إستخدام الستيرويدات القشرية جزء من المعالجة وهناك بعض الحالات التي يمكن إستخدام المعالجة الهرمونية فيها مثل سرطان المبيض - الكلية - الميالوم . وأخيراً يمكن إستخدام بعض الهرمونات في المعالجة الداعمة Supportive Care مثل الستيرويدات كمضادات إقياء والأندروجين كعوامل مساعدة على البناء anabolic والبروجيسترون كفاتح للشهية ودواء يساعد على البناء .

#### ١ - الستيرويدات القشرية :

وتعدل من تركيب الـ DNA - الإنقسام الخلوي ونمو الخلية وتميزها differentiation وتتوسط في استقلاب الخلية السليمة والسرطانية . أبحاث عديدة بينت قدرة الستيرويدات القشرية على قتل الخلية الخبيثة في اللمفوما وذلك بتنظيم دورة حياة الخلية بإدخال الخلية بطور الراحة  $G_0$  و  $G_1$  أما الآلية الدقيقة لإتحلال الخلية فلا تزال غير معروفة .

ولكن بعض الدراسات الحديثة بينت قدرة الديكساميثازون على التثبيط النوعي لإنتاج الإنترلوكين 2 interleukin والغاما إنترفرون interferon -  $\gamma$  . كما بينت الدراسات على قدرة الديكساميثازون على إنتاج عوامل النمو - يتا transforming growth factor -  $\beta$  . في سرطان الثدي الذي تكون فيه المستقبلات الاستروجينية إيجابية

وهذه العوامل مثبطات قوية لنمو الخلايا السرطانية لسرطان الثدي سواءً كانت إيجابية أو سلبية المستقبلات .

بعض أنواع الستيروئيدات القشرية المستخدمة سريريًا ،

١ - كورتيزون أسيتات - cortison acetate .

الجرعة ٢٥ - ٣٠٠ ملغ يومياً حسب المرض والاستطباب .

٢ - هيدرو كورتيزون - Hydrocortisone .

الجرعة ٢٠ - ٢٤٠ ملغ / يومياً حسب المرض والاستطباب .

٣ - بريدنيزولون - prednisolone .

الجرعة من ٥ - ١٠٠ ملغ / يومياً حسب المرض والاستطباب .

٤ - بريدنيزون - prednisone .

الجرعة من ٥ - ١٠٠ ملغ / يومياً .

٥- ميثيل بريدنيزولون methyl prednisolone .

الجرعة ٤ وحتى ٢٠٠ ملغ يومياً حسب المرض والاستطباب .

٦ - ديكساميثازون - dexamethason .

الإستطبابات :

تعتبر جزء من علاج عدة أمراض خبيثة مثل :

- ابيضاض الدم اللمفاوي الحاد ALL .

- ابيضاض الدم اللمفاوي المزمن C.L.L .

- الورم النقوي المتعدد Multiple Myeloma

- داء هودجكن ولفوما لاهودجكن .

بالإضافة لذلك تلعب الستيروئيدات القشرية دوراً في الإقلال من تفاعلات

الأضداد في فقر الدم الانحلالي وانخفاض الصفيحات المناعي .Immunothrombocytopena

وعند إستخدامها في هذه الحالة تعطى لفترة طويلة وجرعة قليلة من ١٠ — ٢٠ ملغ / يومياً .

في داء هودجكن ولفوما لاهودجكن تعتبر جزءاً من النظام العلاجي وتُعطى بجرعة ٦٠ - ١٠٠ ملغ / يومياً ولمدة ٧ سبعة أيام إلى ١٤ يوماً .

- يمكن إستخدامها كمضادات إقياء خاصة الديكساميثازون و بجرعة ١٠ ملغ .  
- يمكن أن تستخدم في تحسين الأعراض مثل الإقلال من وذمة الدماغ وفي حال القصور التنفسي وفي إرتفاع كالسيوم المصل وفي تخفيف الألم الناجم عن النقائل العظمية .

## ٢ - الإستروجينات Estrogens :

لقد أثبتت عدة دراسات على قدرة الإستروجين لتنبية إنتاج عوامل نمو هرمونية في خلايا سرطان الثدي حيث يرتبط الإستروجين بمستقبلات خاصة في الخلية وينبه إنتاج أنزيمات مثل DNA polymerase — ثيمدين كيناز thymidin kinase — ويوريدين كيناز uridine kinase وأنزيمات أخرى .

كما لوحظ منذ سنوات طويلة أن سرطان البروستات يتأثر بالإندروجين لذلك يتراجع الورم باستئصال الخصيتين أو بإعطاء الإستروجين بجرعاته الدوائية ومنذ ذلك الوقت عرف أن تثبيط إنتاج الإندروجين هي المعالجة الأساسية لسرطان البروستات المنتشر .

وخلال السنوات القليلة الماضية تم تكثيف الجهود العلمية لزيادة المعرفة حول السيطرة على سرطان البروستات بالمعالجة الهرمونية ولوحظ أن ٩٠ - ٩٥ ٪ من الإندروجين عند الرجل يفرز من الخصية gonadal testosterone . وينظم إفرازه بواسطة النخامة بالهرمون الملوتن ( L . H ) Luteinizing Hormone و خلال العقد الماضي تم إكتشاف هرمون يفرز من تحت المهاد HYPOTHALAMUS يدعى الهرمون الحاث لإفراز القند Gonadotropine Hormone Relzing H . ( G . N . R . H ) وتبين أنه المسؤول المباشر عن تركيب وإفراز : القند Gonadotropine من النخامة و LH والهرمون الحاث للحريب Follicular - Stimulating Hormone FSH . وفيما بعد تبين أن عدة مركبات

مشابهة للـ GnRH يمكن أن تثبط إفراز H . L و FSH وبالتالي التستسترون أمادور  
الكظر والهرمونات المفزة منه في نحو سرطان البروستات لايزال قيد الدراسة .  
المرحبات الإستروجينية المستخدمة سريرياً ،

١ - دي إيثيل ستليستمول ( DES ) Diethyl stilbesterol .

- في سرطان الثدي ٥ ملغ ثلاث مرات يومياً أو أكثر .

- في سرطان البروستات ١ - ٣ مغ يومياً .

٢ - إستراديول Estradiol

- سرطان الثدي ١ مغ ثلاث مرات يومياً .

- سرطان البروستات ١٥ ، ٠ - ٢ مغ يومياً .

٣ - conjugated estrogen

- سرطان الثدي ١٠ مغ ثلاث مرات يومياً

- سرطان البروستات ١،٢٥ - ٢،٥ مغ يومياً .

٤ - الإستروجين Esterified Estrogen

- سرطان الثدي ١٠ مغ ثلاث مرات يومياً .

- سرطان البروستات ١،٢٥ - ٢،٥ مغ يومياً .

٥ - كلوروتياسنزين chlorotiasensine

- سرطان البروستات ١٢ حتى ٢٥ مغ يومياً .

لقد تبين أن للإستروجين مجرعاته العلاجية تأثير فعال في علاج سرطان الثدي  
المتنشر Metastatic Breast Cancer وسرطان البروستات . بالنسبة لسرطان الثدي فإن  
معدل الإستجابة للمعالجة الهرمونية متعلق بالمظاهر الحيوية للورم والمريضة فقد أثبتت  
الدراسات على تأثير المستقبلات الإستروجينية في الخلية الورمية على الإستجابة إذ  
 لوحظ أن ٥٠ ٪ من حالات المستقبلات الإستروجينية الإيجابية و ٣٠ ٪ من الحالات  
بعد سن اليأس غير معروفة المستقبلات تستجيب للمعالجة الهرمونية والإستجابة الكبيرة

تلاحظ في حال إصابة النسيج الرحمي ( ندي - عقليفاوية - جلد ) أكثر من الإصابات الحشوية فيما عدا النقائل الرئوية والانبصبات الجنبي فإنهما يستجيبان للمعالجة كما في حالة النسيج الرحمي .

إن إستخدام الإستروجين محدود عادة في المريضات بعد سن اليأس وأكثر الأنواع إستخداماً هو DES وتبدأ الجرعة من ٥ - ١٠ مغ يومياً وتزداد تدريجياً للحد الأقصى المحتمل من قبل المريضة ( ١٥ - ٢٥ مغ يومياً ) .  
- أكثر أنواع الإستروجين إستخداماً في سرطان البروستات هو DES ولقد لوحظ أن الجرعة ١ مغ و ٥ مغ يومياً متساوية في التأثير ولكن إمكانية حدوث الاختلاطات القلبية الوعائية تكون أقل في الجرعة المنخفضة .

أكثر اختلاطات المعالجة هي الشدي - الصفات الأتوية الأخرى مثل نعومة الصوت - توزع الدهون والأشعار في الجسم وأخيراً الإضطرابات القلبية الوعائية .  
- الآثار الجانبية للإستروجين عند إعطائه بالجرعة العلاجية نقص شهية - غثيان وإقياء تضخم ومضض في الثدي - احتباس سوائل - صداع وفرط تصبغ الحلمة وثنيات الجلد.

#### ٣ - البروجيستيرون Progestines :

ولها تأثير على تكاثر وتمايز الخلية وآلية تأثيرها تشمل التأثير غير المباشر على ماتحت المهاد - النخامة pituitary - hypothalamus حيث تثبط الهرمون المحرر للغند . G . N . R . H

ولقد لوحظ أن هناك مستقبلات خلوية خاصة بالبروجيستيرون وبينت الدراسات قدرة البروجيستيرون على تثبيط نمو الخلية الورمية في سرطان الثدي إذا كانت مستقبلات الإستروجين والبروجيستيرون إيجابية وعدم تأثيره في حال كون هذه المستقبلات سلبية .

المركبات المستخدمة سريريا ،

١ - ميدروكسي بروجيسترون Medroxy progesterone acetate

الجرعة بسرطان الثدي  $\leq 400$  مغ / اسبوعياً .

سرطان البروستات  $\leq 400$  مغ / اسبوعياً .

سرطان باطن الرحم  $\leq 1$  غ اسبوعياً .

٢ - هيدروكسي بروجيسترون Hydroxy progesterone

سرطان الثدي  $\leq 400$  مغ / اسبوعياً .

سرطان البروستات  $\leq 400$  مغ / اسبوعياً .

سرطان باطن الرحم  $\leq 1$  غ / اسبوعياً .

٣ - ميجيسترون Megestrol acetate ( Megace<sup>R</sup> )

الجرعة : سرطان الثدي  $\leq 160$  مغ يومياً .

- سرطان البروستات  $\leq 320$  ملغ / يومياً .

- سرطان باطن الرحم  $\leq 320$  مغ / يومياً .

وتبين أن للبروجيستيرون تأثير على سرطان المبيض كما تبين أن هناك مستقبلات للبروجيستيرون والإستروجين في خلايا سرطان المبيض وقد إستخدمت جرعات عالية من البروجيستيرون 400 - 800 مغ Megestrol مفردة أو بالمشاركة مع دواء كيميائي مضاد للسرطان .

في الماضي كان البروجيستيرون يستخدم في معالجة سرطان الكلية حيث وجد أن معدل الإستجابة يصل حتى ١٦٪ ولكن التقارير الحديثة لاتشير لهذه الإستجابة .

إلغاء الإفراز جراحياً Surgical ablative therapy :

الضهي والخصي castration - استئصال النخامة hypophysectomy واستئصال

الكظر adrenalectomy . هي الوسائل الجراحية لتعديل الحالة الهرمونية - استئصال

الخصية عند الإصابة بسرطان الثدي عند الرجال وسرطان البروستات واستئصال

المبيضين عند المصابات بسرطان الثدي هي أكثر الوسائل إستخداماً وشيوعاً وفعالية أما استئصال النخامة والكظر فهما وسيلتان تتميزان بالصعوبة والتعقيد على الرغم من نتائجها وتأثيرها في سرطان الثدي ولكن لوجود دواء الأمينو غلوتثاميد aminogluthemide الذي يؤدي لنفس نتائج استئصال الكظر ووجود الأدوية الهرمونية الأخرى جعل من هاتين الوسيلتين أقل إستخداماً .

وعند النساء في سن النشاط التناسلي وفي حال اصابتهن بسرطان الثدي المتقدم فإن إستئصال المبيضين ( ضهي جراحي ) يعتبر خطوة أساسية في العلاج ومعدل الإستجابة يعتمد على حالة المستقبلات الهرمونية وفي حال عدم معرفة المستقبلات معدل الإستجابة ٣٠٪ وعند كون المستقبلات إيجابية ٥٠٪ والأكثر أهمية أن إستئصال المبيضين يمكن أن يكون معالجة هرمونية فعالة عند حدوث النكس في سن النشاط التناسلي .

- إستئصال المبيض كعلاج متممة Adjuvant تم دراسته قبل توفر المعلومات عن المستقبلات الهرمونية بعض الدراسات أشارت إلى أنه يؤدي إلى زيادة معدل الحياة والإقلال من معدل النكس الموضعي ولكن في هذه الحالة لا يمكن أن نراقب الإستجابة للمعالجة الهرمونية ولذلك لم يعد هذا الإجراء مستطباً حالياً أما بالنسبة للرجال فإن إستئصال الخصيتين هي الخطوة الأساسية في المعالجة الهرمونية .

#### مضادات الإستروجين anti Estrogens :

وهي أدوية تثبط فعل الإستروجين بمنع إرتباط الإستراديول مع المستقبلات الإستروجينية وكذلك تزيد من ارتباط الهرمونات الجنسية مع البروتينات في المصل مما يؤدي لإقلال من مستوى الإستراديول الحر في الدم .  
المركبات المتوفرة للإستخدام السريري :

#### ١ - تاموكسيفين Tamoxifen :

وباكشافه أصبح من الممكن المعالجة بأعراض جانبية قليلة وخاصة في الورم ذو



المستقبلات الإيجابية ويعتبر حالياً الدواء الهرموني الأول والعلاج المثالي للمريضات في سن اليأس والجرعة الإعتيادية هي ١٠ مغ مرتين يومياً والجرعات العالية تزيد من السمية دون أي زيادة في الفعالية . في حال كون المستقبلات الإستروجينية إيجابية ER+ فإن الورم يستجيب للمعالجة الهرمونية بمعدل ٣٥ - ٧٠٪ ( حسب موقع الورم ) أما في حال كون المستقبلات سلبية ER- فإن الإستجابة لا تتجاوز ال ٥٪ على الرغم من أن الإستجابة للتاموكسيفين لوحظت في ١٥٪ من الحالات سلبية المستقبلات ER- هذا بالنسبة للمريضات في سن اليأس أما دور التاموكسيفين في سن النشاط التناسلي فلم يزل قيد الدراسة ولكن يبدو أن معدل الإستجابة يشابه معدل الإستجابة لاستئصال المبيضين ولكن إستخدام التاموكسيفين يأتي في الدرجة الثانية بعد الضهبي الجراحي أما إستخدام التاموكسيفين كمعالجة متممة Adjuvant . فإنه أدى إلى زيادة معدل الحياة وإقلال معدل النكس عند المريضات بعد سن اليأس إذا كانت المستقبلات إيجابية ER+ وبينت الدراسات أيضاً على إقلال التاموكسيفين لمعدل النكس عند المريضات بعد سن اليأس وعند كون العقد سلبية وخاصة إذا كانت المستقبلات إيجابية لكن لم يلاحظ أي ازدياد في معدل الحياة . إستخدام التاموكسيفين كمعالجة متممة عند مريضات سن اليأس في حال كون المستقبلات سلبية وعند المريضات في سن النشاط التناسلي لا يزال قيد الدراسة .

٢ - مثبطات الأروماتيز **Aromatase inhibitors** : أمينو غلوتيثيميد Amimoglitte ( A . G ) themide ويثبط إنقلاب الكوليسترول إلى جاما ٥ - برغنيولون pregnelone - 5 - ٥ بالتثبيط التنافسي مع سيتوكروم ب - ٤٥٠ cytochrom p - 450 . وهذا يثبط تشكل الأندروجين وبالتالي ( A G ) يثبط إنتاج الأندروجين والألدسترون من الكظر وكذلك يثبط عملية الـ Aromatization التي يتم فيها تحول الأندروجين إلى الإستروجين.

الآثار الجانبية للدواء هي : الغثيان - الإقياء - التعاس - الرنح - الطفح الجلدي - نقص

الصفائح ونقص نشاط الكظر .

أما الدواء المسمى ٤ - هيدروكسي أندروستيستيرون ( 40 HA ) 4 - hydroxy stenedione فإنه دواء فعال وآثاره الجانبية قليلة ولا يحتاج لإعطاء الستيرويدات القشرية ( معالجة تعويضية ) كما في ( A . G ) ولذلك قد يكون له دوراً مهماً في سرطان الثدي فهو يثبط تحول الأندروستيستيرون androstenedione للأنسروجين .

الأمينوغلوثيريمييد A . G دواء يُعطي مفعولاً مشابهاً لاستئصال الكظر لذلك فهو يستخدم في معالجة سرطان الثدي المنتشر وسرطان البروستات أما الـ ( 4.0HA ) فيستخدم في علاج سرطان الثدي . بالنسبة لجرعة الـ A . G فهي ٢٥٠ مغ ٤ مرات يومياً ونظراً لآثاره الجانبية فإنه يستخدم كخط ثالث بعد استخدام التاموكسيفين والبروجيستيرون ويحتاج استخدامه لتعويض الستيرويدات بإعطاء الهيدروكورتيزون ٤٠ - ١٠٠ مغ يومياً أو مايعادلها .

### ٣ - الأندروجين Androgens :

الآلية التي يتم فيها تثبيط الخلية الورمية لسرطان الثدي بجرعات عالية من الأندروجين لاتزال مجهولة بالرغم من أن المعلومات المخبرية والسريية تشير إلى تثبيط إنتاج الحاثات من النخامة وبالتالي الإقلال من الإستروجين ولقد لوحظ أن الأندروجين يرتبط بالمستقبلات الإستروجينية للخلية إذا كان تركيزها أكثر بـ ١٠٠٠ مرة من تركيز الإستروجين وفي هذه الحالة يمكن أن تؤدي لتكاثر خلية سرطان الثدي .

المركبات المستخدمة سريرياً ،

١ - التستستيرون testosterone

الجرعة ٥٠ - ١٠٠ مغ حقناً عضلياً ثلاث مرات اسبوعياً .

٢ - ميثيل تستستيرون methyl testosterone

الجرعة ٢٠٠ مغ يومياً .

٣ - فلو كسي ميستيرون Fluxy mesterone<sup>R</sup> ( Halotestine<sup>R</sup> )

الجرعة ١٠ مغ ثلاث مرات يومياً .

٤ - تيستولاكتون testolactone ( teslac<sup>R</sup> )

الجرعة ٢٥٠ مغ ٤ مرات يومياً .

أما الآثار الجانبية لهذه المركبات فهي الشعرانية - الصوت الخشن وضخامة البظر ولذلك فهي غير مفضلة .

**مضادات الأندروجين Anti androgens :**

ويستخدم في معالجة سرطان البروستات المنتشر وتقسم إلى مضادات سترودية steroidale ومضادات غير سترودية nonsteroidal . ومن المضادات غير الستيرويدية المتوفرة للإستخدام السريري هي :

- فلوتاميد Flutamide

ويعطى بجرعة ٢٥٠ مغ ثلاث مرات يومياً .

ومن آثاره الجانبية : الإسهال - التشنجات البطنية وحس انزعاج يوصف من قبل المريض بالآلام الغازية ( gas pains ) .

**المركبات الشبيهة بالهرمون المحرر للهرمون الملوتن LHRH analogus :**

وتؤدي لتثبيط إفراز التستسترون غير قابل للتراجع إذا إستخدمت لفترات طويلة (عدة أشهر ) ولذلك فإن العلاج يُعطى بشكل دائم .

المركبات المتوفرة للإستخدام السريري :

١ - ليبروليد Leuprolide ( leupron<sup>R</sup> )

الجرعة اليومية ١ ملغ حقناً تحت الجلد .

الجرعة الشهرية ٧,٥ ملغ حقناً تحت الجلد .

ويستخدم في علاج سرطان البروستات ويلغي استئصال الخصيتين أكثر الأعراض الجانبية التوهج الحار والعنانة .

وهناك عدة مركبات أخرى مثل Buserelin و Norelgin .

### المشاركة الهرونية لسرطان البروستات :

إن مشاركة ما بين استئصال الخصية والمركبات الشبيهة بالـ ( LH . R . H ) تعتبر أفضل من كلا الوسيلتين بمفردها ومن الأدوية التي يمكن أن تؤدي لتثبيط القند gonadul والكظفر هو الكيتوكونازول ketoconazol . وهو دواء مضاد للفطور أساساً ولكن عند استخدامه بجرعات عالية يؤدي لتثبيط إفراز الهرمونات الحادة للقند من النخامة والكظفر وجرعته هي ٤٠٠ مغ ثلاث مرات يومياً ونتائجه تكون أفضل عندما يكون المريض غير معالج سابقاً هرمونياً أكثر الآثار الجانبية شيوعاً غثيان وإقياء وارتفاع حمائر الكبد ويفضل ان يُعطى مع الدواء الهيدروكورتيزون بمعدل ٤٠ - ١٠٠ مغ يومياً .

## الانظمة العلاجية في المشاركة الكيميائية Combination chemotherapy progeams

أولاً - سرطان الثدي breast cancer :

١ - النظام العلاجي AC :

- A - الأدرياميسين Adriamycin ٤٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً في اليوم الأول .
- C - سيكلوفوسفاميد Cyclophosphamide ٢٠٠ مغ / ٢م عن طريق الفم في اليوم ٣ و ٦ يكرر كل ٢١ يوم .

٢ - النظام العلاجي CAF :

- C - سيكلوفوسفاميد Cyclophosphamide ٥٠٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً في اليوم الأول .
  - A - أدرياميسين Adriamycin ٥٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً في اليوم الأول .
  - F - فلورويوراسيل 5-Fluorouracil ٥٠٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً في اليوم الأول .
- ملاحظة : يختلف هذا النظام العلاجي عن النظام FAC في أن الفلورويوراسيل يعطى في النظام الأخير في اليوم الأول والثامن ويكرر هذا العلاج كل ٢١ يوم .

٣ - المشاركة الدوائية المتممة CMF adjuvent :

- ١ - تحت سن الـ ٦٠ سنة .
- C - سيكلوفوسفاميد Cyclophosphamide ١٠٠ مغ / ٢م عن طريق الفم في اليوم الأول وحتى الرابع عشر .
- M - ميثوتركسات Methotrexate ٤٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً في اليوم الأول والثامن .
- F - فلورويوراسيل 5 Fu ٦٠٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً في اليوم الأول والثامن .
- ب - فوق سن الـ ٦٠ سنة :
- C - سيكلوفوسفاميد ١٠٠ مغ / ٢م عن طريق الفم من اليوم الأول وحتى الرابع عشر .

- M - ميثوتركسات ٣٠ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم الأول والثامن .
- F - فلورويوراسيل ٤٠٠ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم الأول والثامن .
- يكبر كل ٢٨ يوماً .

#### ٤ - CMFP :

نفس النظام CMF ولكن يضاف :

- P - الريدنزون Prednisone ٤٠ مغ / ٢م يومياً من اليوم الأول وحتى الرابع عشر ،
- يكبر كل ٢٨ يوماً .

#### ٥ - النظام العلاجي CMFVP :

- C - سيكلوفوسفاميد Cyclophosphamide ٤٠٠ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم الأول .
- M - ميثوتركسات Methotrexate ٣٠ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم الأول والثامن .
- F - فلورويوراسيل Fluorouracil 5 - ٤٠٠ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم الأول والثامن .

- V - فنكريستين Vincristine ١ مغ حقناً وردياً في اليوم الأول والثامن .

- p - برينزون ٢٠ ملغ عن طريق الفم ٤ مرات يومياً من اليوم الأول وحتى السابع ،
- يكبر كل ٢٨ يوماً .

#### ٦ - النظام العلاجي CMF :

- C - سيكلوفوسفاميد Cyclophosphamide ٤٠٠ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم الأول .
- M - ميثوتركسات Methotrexate ٣٠ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم الأول والثامن .
- F - فلورويوراسيل 5-Fu ٤٠٠ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم الأول والثامن ، يكرر كل ٢٨ يوماً .

#### ٧ - نظام كوبر cooper Regimen :

- فلورويوراسيل 5-Fu ١٢ مغ / كغ وردي كل أسبوع لمدة ٨ أسابيع ثم كل أسبوعين لمدة سبعة أشهر .

- ميثوتركسات Methotrexate ٠,٧ مغ / كغ أسبوعياً حقناً وردياً لمدة ٨ أسابيع ثم كل أسبوعين لمدة شهر .

- فنكريستين Vincristine ٠,٣٥ مغ / كغ أسبوعياً حقناً وردياً لمدة ٥ أسابيع ثم مرة كل شهر .

- سيكلوفوسفاميد Cyclophosphamide ٢مغ / كغ يومياً عن طريق الفم لمدة ٩ أشهر .  
- بريدنيزون Prednisone ٧٥ / مغ / كغ يومياً عن طريق الفم  $\times$  ١٠ أيام ثم ٠,٥ الجرعة السابقة يومياً  $\times$  ١٠ أيام ثم ٠,٥ الكمية يومياً  $\times$  ١٠ أيام ثم ٥ مع يومياً  $\times$  ٢٠ يوماً ثم يوقف .

#### ٨ - النظام العلاجي FAC :

F - فلورويوراسيل 5Fu ٥٠٠ مغ / م٢ حقناً وردياً في اليوم الأول والثامن .  
A - أدرياميسين Adriamycin ٥٠ مغ / م٢ حقناً وردياً في اليوم الأول وتعطى بترتيب وردي مستمر لمدة ٤٨ - ٩٦ ساعة .  
C - سيكلوفوسفاميد Cyclophosphamide ٥٠٠ مغ / م٢ حقناً وردياً في اليوم الأول يكرر كل ٢١ يوماً .

#### ٩ - VTAH :

- فنبلاستين Vinblastine ٤,٥ مغ / م٢ حقناً وردياً في اليوم الأول .  
- أدرياميسين Adriamycin ٤٥ مغ / م٢ حقناً وردياً في اليوم الأول .  
- ثيوتيبا thiotepa ١٢ مغ / م٢ حقناً وردياً في اليوم الأول .  
- فلوكسي ميسترون FlouxyMesterone ٣٠ مغ عن طريق الفم يومياً .  
يكرر كل ٢١ يوماً .

#### ١٠ - فنبلاستين + ميتومايسين Vinblastine + Mitomycin :

أول شوطين First tow cycles :

- ميتومايسين Mitomycin ١٠ مغ / م٢ حقناً وردياً في اليوم الأول والثامن

والعشرون .

- فنبلاستين Vinblastine ٥ مغ / ٢م حقناً وريدياً في الأيام ١ - ١٤ - ٢٨ - ٤٢ .  
الأسواط الأخرى التالية :

- ميتومايسين ١٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً في اليوم الأول .  
- فنبلاستين ٥ مغ / ٢م حقناً وريدياً في اليوم ١ و ٢١ .  
تكرر كل ٦ - ٨ أسابيع .

ثانياً - سرطان المستقيم والكولون Colorectal Cancer :

١ - معالجة متممة Adjuvant therapy :

الفلورويوراسيل + ليفاميزول 5 - Fu + Levamizole .

- فلورويوراسيل 5 - Fu ٤٥٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً يومياً لمدة خمسة أيام ثم ٤٥٠ مغ / ٢م أسبوعياً لمدة ٤٨ أسبوع .

- ليفاميزول Levamizole ٥٠ مغ كل ٨ ساعات لمدة ٣ أيام يكرر كل ١٤ يوماً .

ب - معالجة السرطان المتقدم للبعد Metastatic Disease :

١- فلورويوراسيل + ليوكوفورين 5 - Fu + Leucovorin

جرعة عالية High Dose

- 5 - Fu ( فلورويوراسيل ) ٦٠٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً كل أسبوع لمدة ٦ أسابيع ثم راحة أسبوعين تكرر كل ٨ أسابيع .

نوكونفورين ٥٠٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً أسبوعياً لمدة ٦ أسابيع ثم راحة أسبوعين .

٢- فلورويوراسيل + لوكونفورين

جرعة منخفضة low dose

- فلورويوراسيل 5 - Fu ٣٧٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً يومياً لمدة ٥ أيام .

ليوكوفورين Leucovorin ٢٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً لمدة ٥ أيام .

تكرر بعد ٤ أسابيع ثم بعد ٨ أسابيع ثم بعد ذلك كل ٥ أسابيع .



### ٣ - النظام العلاجي MOF - strep

- S emustine (Methyl CCNU) ٣٠ مغ / ٢م عن طريق الفم من اليوم الأول حتى الخامس كل ١٠ أسابيع .

- فنكرستين Vincristine ١ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم الأول ويكرر كل ٥ أسابيع .

- فلورويوراسيل S-Fu ٣٠٠ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم الأول وحتى الخامس ويكرر كل ٥ أسابيع .

- سترتوزوتوسين sterptozotocin ٥٠٠ مغ / ٢م في الأول ثم كل أسبوع .  
يكرر كل ١٠ أسابيع .

### ثالثاً - سرطان المعدة Gastric Cancer :

#### ١ - النظام العلاجي EAP :

E - إيتوبوسيد Etoposide ١٢٠ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم ٤ - ٥ - ٦ .

A - أدرياميسين Adriamycin ٢٠ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم ١ - ٧ .

p - سيسبلاتين Cisplatin ٤٠ مغ / ٢م في الأيام ٢ و ٨ .

يكرر كل ٣ - ٤ أسبوع .

#### ٢ - النظام العلاجي EFP :

E - إيتوبوسيد Etoposide ٨٠ مغ / ٢م حقناً وردياً في الأيام ١ - ٣ - ٥ .

F - فلورويوراسيل S-Fu ٩٠٠ مغ / ٢م يومياً من اليوم ١ وحتى ٥ بترييب وردي

مستمر continous infusion .

P - سيسبلاتين Cisplatin ٢٠ مغ / ٢م من اليوم الأول وحتى الخامس

يكرر كل ٢٨ يوماً .

#### ٣ - النظام العلاجي FAM :

F - فلورويوراسيل S-Fu ٦٠٠ مغ / ٢م حقناً وردياً في الأيام ١ - ٨ - ٢٩ - ٣٦ .

M - ميتومايسين Mitomycin c ١٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً في اليوم الأول .

A - أدرياميسين ٣٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً في الأيام ١ - ٢٩ .

يكبر كل ٥٦ يوماً .

: FAME - ٤

F - فلورويوراسيل 5-Fu ٣٥٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً في الأيام ١ حتى ٥ ومن اليوم

٣٦ - ٤٠ .

A - أدرياميسين Adriamycin ٤٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً في اليوم ١ - ٣٦ .

Mc - Semustine (Methylccnu) ١٥٠ مغ / ٢م عن طريق الفم في اليوم الأول .

يكبر كل ١٠ أسابيع .

رابعاً - سرطان البنكرياس Pancreatic Cancer :

: SMF - ١

S - Streptozotocin ١ مغ / ٢م حقناً وريدياً في الأيام ١ - ٨ - ٣٥ - ٤٢ .

M - ميتومايسين Mitomycin ١٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً في اليوم الأول .

F - فلورويوراسيل 5-Fu ٦٠٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً في الأيام ١ - ٨ - ٢٩ - ٤٢ .

تكرر كل ٦٣ يوماً .

خامساً - سرطان عنق الرحم Cervical Cancer :

: BIP النظام العلاجي

B - بيلومايسين Bleomycin ٣٠ وحدة بثرير وريدي مستمر لمدة ٢٤ ساعة في اليوم

( ١ ) .

I - ايفوسفاميد ifosfamide ٥ غ / ٢م بثرير وريدي مستمر لمدة ٢٤ ساعة في اليوم

( ٢ ) .

P - سيسبلاتين Cisplatin ٥٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً في اليوم ( ٢ ) .

مع الميزنا Mesna ٨ غ / ٢م .

تكرر كل ٢١ يوماً .

سادساً - السرطانة المشيمية والحمل العنقودي **Gestational trophoblastic Disease** :

١ - النظام العلاجي DMC :

D - داكيتنومايسين Dactinomycin ٠,٣٧ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم الأول وحتى الخامس .

M - ميثوتركسات Methotrexate ١١ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم الأول وحتى الخامس .

C - سيكلوفوسفاميد Cyclophosphamide ١١٠ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم الأول وحتى اليوم الخامس .  
يككرر كل ٢١ يوماً .

D - داكيتنومايسين Dactinomycin ١٠ - ٢٠ ميكرو غرام / كغ حقناً وردياً  $\times ٥$  أيام .

M - ميثوتركسات Methotrexate ١٥ مغ حقناً عضلياً  $\times ٥$  أيام .

C - كلور أمبيو سيل Chlorambucil ١٠ مغ عن طريق الفم يومياً  $\times ٥$  أيام .

٢ - CHAMOCA :

- هيدروكسي يوريا Hydroxyurea ٥٠٠ مغ كل ست ساعات عن طريق الفم في اليوم الأول .

- داكيتنومايسين Dactinomycin ٠,٢ مغ حقناً وردياً بعد ساعة من الجرعة الثالثة من هيدروكسي يوريا في اليوم الأول ويكرر في اليوم ٢ - ٣ - ٤ - ٥ .

- فكريستين Vincristin ١ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم ( ٢ ) .

- فولينيك اسيد Folinic acid ١٤ مغ حقناً عضلياً يوماً ٣ - ٥ و ٤ مرات في اليوم الرابع .

- ميثوتركسات Methotrexate ١٠٠ مغ / ٢م حقناً وردياً دفعة واحدة ثم ٢٠٠ مغ

/ م ٢ خلال ١٢ ساعة في اليوم التالي .

- سيكلوفوسفاميد Cyclophosphamide ٥٠٠ مغ / م ٢ حقناً وريدياً في اليوم ( ٨ ) .

- أدرياميسين Adriamycin ٣٠ مغ / م ٢ حقناً وريدياً في اليوم ( ٨ ) .

يكرر بعد ١٠ أيام من توقف المعالجة .

### ٣ - النظام MAC III :

- داكينومايسين Dactinomycin ١٢ ميكروغرام / م ٢ / يومياً حقناً وريدياً لمدة ٥ أيام .

- سيكلوفوسفاميد Cyclophosphamide ٣ مغ / كغ / يومياً حقناً وريدياً لمدة ٥ أيام .

- ميثوتركسات Mtx. ١ مغ / كغ / يومياً حقناً عضلياً كل يومين لأربع جرعات

(اللو كوفورين يعطى عشر جرعة Mtx. بعد ٢٤ ساعة منها) .

يكرر كل ٢١ يوماً .

### ٤ - VBC :

V - فنبلاستين Vinblastine ٩ مغ / م ٢ حقناً وريدياً في اليوم الخامس .

B - بليومايسين Bleomycin ٢٠ وحدة / م ٢ في الأيام ١ - ٨ - ١٥ .

C - سيسبلاتين Cisplatin ٢٠ مغ / م ٢ من اليوم ( ١ ) وحتى اليوم الخامس ( ٥ ) .

يكرر كل ٢١ يوماً .

سابعاً - سرطان المبيض Ovarian Cancer :

### ١ - النظام العلاجي CHAP :

- سيكلوفوسفاميد ١٥٠ مغ / م ٢ عن طريق الفم في اليوم ٢ و ٨ .

- هيكساميثيل ميلانين Hexamethyl Melanine ١٥٠ مغ / م ٢ عن طريق الفم في اليوم

( ٢ ) و ( ٨ ) .

- أدرياميسين Adriamycin ٢٥ مغ / م ٢ حقناً وريدياً في اليوم ( ١ ) .

- سيسبلاتين Cisplatin ٥٠ مغ / م ٢ حقناً وريدياً في اليوم ( ١ ) .

يكرر كل ٢٨ ساعة .

#### ٢ - CHAP :

- سيكلوفوسفاميد ١٥٠ مغ / م٢ عن طريق الفم في اليوم ٢ و ٨ .
  - هيكسا ميثيل ميلاتين ١٥٠ مغ / م٢ عن طريق الفم في اليوم ٢ و ٨ .
  - أدرياميسين Adriamycin ٣٠ مغ / م٢ حقناً وردياً في اليوم ( ١ ) .
  - سيسبلاتين Cisplatin ٥٠ مغ / م٢ حقناً وردياً في اليوم ( ١ ) .
- يكرر كل ٢٨ يوماً .

#### ٣ - النظام العلاجي CP :

- C - سيكلوفوسفاميد ١٠٠٠ مغ / م٢ حقناً وردياً في اليوم الأول .
  - P - سيسبلاتين Cisplatin ٥٠ مغ / م٢ حقناً وردياً في اليوم الأول .
- يكرر كل ٢١ يوماً .

#### ٤ - CAF- Hexa :

- هيكسا ميثيل ميلاتين Hexamethyl Melanine ٥٠ مغ / م٢ عن طريق الفم يومياً × ١٤ يوماً .
  - سيكلوفوسفاميد Cyclophosphamide ١٥٠ مغ / م٢ عن طريق الفم يومياً × ١٤ يوماً .
  - ميثوتركسات Methotrexate ٤٠ مغ / م٢ حقناً وردياً في اليوم الأول الثامن .
  - فلورويوراسيل ( 5 - Fu ) ٦٠٠ مغ / م٢ حقناً وردياً في اليوم ١ و ٨ .
- يكرر كل ٢٨ يوماً .

#### ٥ - PAC-I :

- P - سيسبلاتين Cisplatin ٥٠ مغ / م٢ حقناً وردياً في اليوم ( ١ ) .
- A - أدرياميسين Adriamycin ٥٠ مغ / م٢ حقناً وردياً في اليوم ( ١ ) .
- C - سيكلوفوسفاميد Cyclophosphamide ٥ - ٧ مغ / كغ يومياً × ٥ أيام كل ٤

أسابيع .

يكبر كل ٤ أسابيع ولمدة سنتين وحسب تحمل المريض .

ثامناً - سرطان الخصية Testicular Carcinoma :

١ - النظام العلاجي BEP :

B - بليومايسين Bleomycin ٣٠ وحدة حقناً وردياً في اليوم ٢ - ٩ - ١٦ .

E : - ايتوبوسيد ( VP16 ) Etoposide ١٠٠ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم الأول وحتى الخامس .

P - سيسبلاتين Cisplatin ٢٠ مغ / ٢م يومياً وردياً في اليوم الأول وحتى الخامس .  
يكبر كل ٢١ يوماً .

٢ - النظام PVB :

P - سيسبلاتين ٢٠ مغ / ٢م يومياً حقناً وردياً من اليوم الأول وحتى الخامس .  
V - فنبلاستين Vinblastine ٠,١٥ مغ / كغ حقناً وردياً في اليوم الأول والثاني يكبر كل ٣ أسابيع .

B - بليومايسين ٣٠ وحدة حقناً وردياً في اليوم ٢ - ٩ - ١٦ .  
يكبر كل ٢١ يوماً .

٣ - المعالجة المضاعفة triple therapy :

- الشوط الأول

- ميثوتركسات Methotrexate ٥ مغ عن طريق الفم يومياً لمدة ١٦ - ٢٥ يوماً .
- كلورامبوسيل Chlorambucil ١٠ مغ عن طريق الفم لمدة ١٦ - ٢٥ يوماً .
- داكينومايسين Dactinomycin ٠,٥ مغ حقناً وردياً في الأيام ٣ حتى ٧ - ١٢ - حتى ١٧ - ٢١ حتى ٢٥ ثم راحة لمدة أسبوعين .
- ميثوتركسات ٥ مغ عن طريق الفم يومياً ٧ x أيام .
- كلورامبوسيل ١٠ مغ عن طريق الفم يومياً لمدة ١٦ - ٢٥ يوماً .

- داكينومايسين ٠,٥ مغ حقناً وردياً من اليوم ٣ وحتى ٧ .  
يكبر كل ٢١ يوماً .

#### ٤ - النظام العلاجي VAB-6 :

- فنبلستين Vinblastine ٤ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم الأول .  
- داكينومايسين Dactinomycin ١ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم الأول .  
- بليومايسين Bleomycin ٣٠ وحدة حقناً وردياً دفعة واحدة ثم ٢٠ وحدة / ٢م  
يوميّاً من اليوم الأول حتى الثالث بترتيب وردي مستمر .  
- سيسبلاتين Cisplatin ١٢٠ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم الرابع .  
- سيكلوفوسفاميد Cyclophosphamide ٦٠٠ مغ / ٢م حقناً وردياً في الأول .  
يكبر كل ٢١ يوماً .

#### ٥ - نظام VIP :

٧ - فنبلستين Vinblastine ٠,١١ مغ / كغ في اليوم (١) و (٢) .  
I - ايفوسفاميد Ifolsfamidc ١,٢ غرام / ٢م يوميّاً من اليوم الأول حتى الخامس .  
P - سيسبلاتين Cisplatin ٢٠ مغ / ٢م يوميّاً لمدة ٥ أيام .  
يكبر كل ٢١ يوماً .

ملاحظة : " يمكن الإستعاضة عن الفنبلاستين بـ VP16 ( ايتوبوسيد ) بجرعة ٧٥  
مغ/٢م يوميّاً لمدة ٥ أيام " .

تاسعاً - سرطان المثانة :

#### ١ - النظام العلاجي CISCA :

- CIS - سيسبلاتين Cisplatin ١٠٠ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم (٢) .  
C - سيكلوفوسفاميد Cyclophosphamide ٦٥٠ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم الأول .  
A - أدريامايسين Adriamycin ٥٠ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم (١) .  
يكبر كل ٢١ - ٢٨ يوماً .

## ٢ - النظام العلاجي MVAC :

M - ميثوتركسات Methotrexate ٣٠ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم ( ١ ) و ( ١٥ )  
و ( ٢٢ ) .

V - فنبلاستين Vinblastine ٣ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم ( ٢ ) و ( ١٥ )  
و ( ٢٢ ) .

A - أدرياميسين Adriacycin ٣٠ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم ( ٢ ) .

C - سيسبلاتين Cisplatin ٧٠ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم ( ٢ ) .  
يكبر كل ٢٨ يوماً .

## عاشراً - سرطان الرأس والعنق Head and Neck Cancer :

### ١ - النظام العلاجي CF :

C - سيسبلاتين Cisplatin ١٠٠ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم الأول .

F - فلورويوراسيل 5 - Fu ١٠٠٠ مغ / ٢م يومياً من اليوم الأول حتى الخامس  
بشريب وردي مستمر .

يكبر كل ٢١ - ٢٨ يوماً .

### ٢ - النظام العلاجي PFL :

P - سيسبلاتين Cisplatin ١٠٠ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم الأول .

F - فلورويوراسيل 5 - Fu ٨٠٠ مغ / ٢م يومياً من اليوم ١ وحتى ٥ بشريب وردي  
مستمر .

L - لوكوفورين ١٠٠ مغ / ٢م / يومياً عن طريق الفم كل ٤ ساعات من اليوم ١  
وحتى ٥ .

يكبر كل ٢١ يوماً .



إحدى عشر - سرطان الرئة ( صغير الخلايا ) : Smal cell Lung Cancer :

١ - النظام العلاجي ACE :

A - أدرياميسين Adriamycin ٤٥ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم الأول .  
C - سيكلوفوسفاميد Cyclophosphamide ١٠٠٠ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم الأول .

E - اتوبوسيد Etoposide ( VP16 ) ٥٠ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم الأول .  
يكبر كل ٢١ - ٢٨ يوماً .

٢ - CAV :

C - سيكلوفوسفاميد Cyclophosphamide ١٠٠٠ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم الأول .

A - أدرياميسين Adriamycin ٥٠ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم الأول .  
V - فنكرستين Vincristine ١,٤ مغ / ٢م ( جرعة قصوى ٢ مغ ) حقناً وردياً .  
يكبر كل ٢١ يوماً .

٣ - النظام CEV :

C - سيكلوفوسفاميد ١٠٠٠ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم الأول .  
E - اتوبوسيد Etoposide ٥٠ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم ( ١ ) ثم ١٠٠ مغ / ٢م عن طريق الفم من اليوم ٢ حتى اليوم ٥ .  
V - فنكرستين Vincristine ١,٤ مغ / ٢م ( جرعة قصوى ٢ مغ ) حقناً وردياً في اليوم الأول .  
يكبر كل ٢١ يوماً .

٤ - النظام العلاجي PACE :

P - سيسبلاتين Cisplatin ٢٠ مغ / ٢م يومياً وردياً من اليوم الأول حتى الخامس .  
A - أدرياميسين Adriamycin ٤٥ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم الأول .

C - سيكلوفوسفاميد ١٠٠٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً في اليوم الأول .

E - ايتوبوسيد Etoposide ٥٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً في اليوم الأول .

● - VP16 / DDP :

- سيسبلاتين Cisplatin ٢٥ مغ / ٢م وريدياً من اليوم الأول وحتى الثالث .

- ايتوبوسيد ( VP16 ) Etoposide ١٠٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً من اليوم الأول وحتى

الثالث .

يكبر كل ٢١ يوماً .

الثا عشر - سرطان الرئة غير صغير الخلايا Non - Small cell Lung Cancer :

١ - النظام العلاجي CAMP :

C - سيكلوفوسفاميد Cyclophosphamide ٣٠٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً في اليوم الأول

والثامن .

A - أدرياميسين Adriamycin ٢٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً في اليوم الأول والثامن .

M - ميثوتركسات Methotrexate ١٥ مغ / ٢م حقناً وريدياً في اليوم الأول والثامن .

P - بروكاربازين Procarbazine ١٠٠ مغ / ٢م عن طريق الفم من اليوم ١ وحتى ١٠

يكبر كل ٢١ يوماً .

٢ - CAP :

C - سيكلوفوسفاميد ٤٠٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً في اليوم الثاني .

A - أدرياميسين Adriamycin ٤٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً في اليوم الأول .

P - سيسبلاتين Cisplatin ٦٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً في اليوم الأول .

يكبر كل ٢٨ يوماً .

٣ - أدرياميسين مع سيسبلاتين :

- أدرياميسين Adriamycin ٦٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً .

- سيسبلاتين Cisplatin ٦٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً .

يكبر كل ٢١ يوماً .

٤ - MACC :

- M - ميثوتركسات ٣٠ - ٤٠ مغ / م٢ حقناً وردياً في اليوم الأول .
  - A - أدرياميسين ٣٠ - ٤٠ مغ / م٢ حقناً وردياً في اليوم الأول .
  - C - سيكلوفوسفاميد ٤٠٠ مغ / م٢ حقناً وردياً في اليوم الأول .
  - C - لوموستين Lomustine ( CCNU ) ٣٠ مغ / م٢ عن طريق الفم في اليوم الأول .
- يكبر كل ٢١ يوماً .

٥ - فنبلستين + سيسبلاتين Vinblastine + Cisplatin :

- فنبلستين Vinblastine ٠,٢ مغ / كغ حقناً وردياً .
  - سيسبلاتين Cisplatin ١٢٠ مغ / م٢ حقناً وردياً .
- ٦ - فنديسين + سيسبلاتين :
- فنديستين Vindesine ٣ مغ / م٢ حقناً وردياً بالأسبوع × ٧ أسابيع ثم كل أسبوعين بعد ذلك .

- سيسبلاتين Cisplatin ١٢٠ مغ / م٢ حقناً وردياً في اليوم ( ١ ) و ( ٢٩ ) ثم كل ٦ أسابيع بعد ذلك .

٧ - النظام العلاجي MVP :

- M - ميتومايسين Mitomycin ٨ مغ / م٢ حقناً وردياً في اليوم ١ - ٢٩ - ٧٢ فقط .
- V - فنبلستين Vinblastin ٤,٥ مغ / م٢ حقناً وردياً في اليوم ١٥ - ٢٢ - ٢٩ ثم كل أسبوعين .
- C - سيسبلاتين Cisplatin ١٢٠ مغ / م٢ حقناً وردياً في اليوم ١ - ٢٩ ثم كل ٦ أسابيع .

### ثلاثة عشر - الميلانوم Melanoma :

#### ١ - النظام العلاجي VBD :

- V - فنبلاستين Vinblastine ٦ مغ / ٢م حقناً وريدياً في اليوم ( ١ ) و ( ٢ ) .  
B - بليومايسين Bleomycin ١٥ وحدة / ٢م حقناً وريدياً في اليوم ( ١ ) حتى ( ٥ )  
بتشريب وريدي مستمر .

D - سيسبلاطين ( DDP ) ٥٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً في اليوم الخامس .

#### ٢ - VDP :

- V - فنبلاستين Vinblastine ٥ مغ / ٢م حقناً وريدياً في اليوم الأول والثاني .  
D - داكاربازين Dacarbazine ( DTIC ) ١٥٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً من اليوم الأول حتى الخامس .

P - سيسبلاطين Cisplatin ٧٥ مغ / ٢م حقناً وريدياً في اليوم الخامس .  
يكبر كل ٢١ - ٢٨ يوماً .

### أربعة عشر - الغرن Sarcomas :

#### ١ - النظام العلاجي AD :

P - عند كون الصورة الدموية ضيعة .

- A - أدريامايسين Adriamycin ٦٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً في اليوم الأول .  
D - داكاربازين Dacarbazine ( DTIC ) ٢٥٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً من اليوم الأول حتى الخامس .

ب - عند كون الصورة الدموية ناقصة :

- A - أدريامايسين ٤٥ مغ / ٢م حقناً وريدياً في اليوم الأول .  
D - داكاربازين ( dtic ) ٢٠٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً من اليوم الأول حتى الخامس .  
يكبر كل ٢١ يوماً .

## ٢ - CY - VA - DIC :

أ - الصورة الدموية طبيعية :

- سيكلوفوسفاميد Cyclophosphamide ٥٠٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً في اليوم الأول .
  - فنكريستين Vincristine ١,٥ مغ / ٢م حقناً وريدياً في اليوم الأول والخامس .
  - أدريامايسين Adriamycin ٥٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً في اليوم الأول فقط .
  - داكارتازين Dtic ٢٥٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً من اليوم الأول حتى الخامس .
- ب - الصورة الدموية ناقصة :

- سيكلوفوسفاميد ٤٠٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً في اليوم الأول .
- فنكريستين ١ مغ / ٢م حقناً وريدياً من اليوم الأول والخامس .
- أدريامايسين ٤٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً في اليوم الأول فقط .
- داكارتازين ٢٠٠ مغ / ٢م من اليوم الأول حتى الخامس .

## ٣ - الجرعة العالية من الميثوتركسات H . DMTX :

- ميثوتركسات MTX ٨ - ١٢ غ / ٢م حقناً وريدياً .
- لوكوفورين Leucovorin ١٥ - ٢٥ مغ حقناً وريدياً أو عن طريق الفم كل ٦ ساعات لعشرة جرعات على الأقل تبدأ بعد ٢٤ ساعة من حقن الميثوتركسات .
- يكرر كل ٢ - ٤ أسابيع بالتناوب مع باقي الأنظمة العلاجية .

## ٤ - النظام VAC :

- ٧ - فنكريستين Vincristine ٢ مغ / ٢م حقناً وريدياً كل أسبوع × ١٢ أسبوع ( الجرعة القصوى ٢ مغ كل مرة ) .
- A - اكينومييسين Actinomycin - D ٠,٠٧٥ مغ / كغ / يومياً لمدة ٥ أيام ( الجرعة القصوى اليومية ٠,٥ مغ ) كل ٣ أشهر × ٥ أشواط .
- C - سيكلوفوسفاميد Cyclophosphamide ١٠ مغ / كغ / يومياً لمدة ٧ أيام إما وريدياً أو عن طريق الفم يكرر كل ٦ أسابيع .

## ٥ - VAC النظامي :

٧ - فنكريستين Vincristine ٢ مغ / ٢م أسبوعياً  $\times$  ١٢ أسبوع ( الجرعة القصوى ٢مغ ) .

A - أكتينومايسين Actinomycin - D ٠,٠٧٥ مغ / كغ من اليوم الأول حتى الخامس يكرر كل ٣ أشهر  $\times$  ٥ أشواط ( الجرعة القصوى اليومية ٠,٥ مغ ) .

C - سيكلوفوسفاميد ٢,٥ مغ / كغ يومياً عن طريق الفم  $\times$  ٢ سنة .

## ٦ - النظام العلاجي MAID :

M - ميزنا Mesna ٢٥٠٠ مغ / ٢م حقناً وردياً من اليوم ١ وحتى ٤ بشريب وردي مستمر .

A - أدريامايسين Adriamycin ٢٠ مغ / ٢م حقناً وردياً من اليوم ١ وحتى ٣ .

I - افوسفاميد Ifosfamide ٢٥٠٠ مغ / ٢م حقناً وردياً من اليوم ١ حتى ٣ .

D - داكاربازين DTIC ٣٠٠ مغ / ٢م حقناً وردياً من اليوم ١ وحتى ٣ .  
يكرر كل ٢١ يوماً .

## خامس عشر - الغرغرين العظمي Osteo Sarcoma :

### ١ - النظام العلاجي T10 :

أ - قبل العمل الجراحي :

ميثوتركسات MTx ٨ - ١٢ مغ / ٢م حقناً وردياً كل أسبوع  $\times$  ٤ أسابيع .

ب - بعد العمل الجراحي ( BCD ) :

B - بليومايسين Bleomycin ١٥ وحدة / ٢م يومياً  $\times$  يومين .

C - سيكلوفوسفاميد Cyclophosphamide ٦٠٠ مغ / ٢م يومياً  $\times$  يومين .

D - داكينومايسين Dactinomycin ٦٠٠ ميكرو غرام / ٢م حقناً وردياً يومياً  $\times$  يومين .

ثم - ميثوتركسات Mtx ٨ - ١٢ مغ / ٢م وريدي كل أسبوع في الأسبوع الثاني - ٩  
- ١٠ - ١٤ - ١٥ .

- أدرياميسين Adriamycin ٣٠ مغ / ٢م يومياً  $\times$  ٢ في الأسبوع ١١ .  
ج - الصيانة Maintenance :

استجابة درجة I و II .

أدرياميسين Adriamycin ٣٠ مغ / ٢ حقناً وريدياً كل ٣ أسابيع  $\times$  ٢ شوط .  
سيسبلائين Cisplatin ١٢٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً كل ٣ أسابيع  $\times$  ٢ شوط .  
ثم BCD كما في الأعلى في الأسبوع السادس .

ويكرر هذا لثلاث أشواط ( كعدد كلي )  
إستجابة درجة III و IV ( ثالثة ورابعة )

BCD / كما في الأعلى

- ميثوتركسات كما في السابق في الأسبوع الثالث والرابع - الأسبوع ٨ و ٩ .  
- أدرياميسين ٣٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً يومياً  $\times$  ٢ يوم في الأسبوع الخامس .

السادس عشر الأيضاض Leukemia :

أ - أبيضاض الدم اللمفاوي الحاد ( أطفال ) ( ALL ) :

- إحداث الهجوع / induction :

١ - VP :

V - فنكريستين Vincristine ١,٥ مغ / ٢م حقناً وريدياً كل أسبوع  $\times$  ٤ - ٦ أسابيع .

P - بيريدنيزون Prednisone ٤٠ مغ / ٢ عن طريق الفم يومياً  $\times$  ٤ - ٦ أسابيع .

٢ - أو VP + Daunorubicin :

VP كالسابق .

Daunorubicin ٢٥ مغ / ٢م حقناً وريدياً أسبوعياً  $\times$  ٤ - ٦ أسابيع .

- العلاج العصبي المركزي :

الوقائي Prophylaxis ويبدأ بعد أسبوع من حدوث الهجوم ويشمل :

١ - ميثوتركسات Mtx ١٢ مغ / ٢م حقناً داخل السيلساء مرتين أسبوعياً  $\times$  ٥ مرات.

٢ - تشعيع القحف Cranial Irradiation

١٨ غري ( ٢ غري  $\times$  ٥ مرات أسبوعياً ) .

- الصيانة Maintenance therapy :

- ميثوتركسات Methotrexate ٢٠ مغ / ٢م حقناً وردياً أسبوعياً .

- ميركابتوبورين Mercaptopurine ٦ - ٥٠ مغ / ٢م عن طريق الفم يومياً .

ب - أبيضاض الدم اللمفاوي الحاد عند البالغين ( adult ) ALL

١ - النظام L10 :

- بريدنيزون prednison ٦٠ مغ / ٢م عن طريق الفم يومياً  $\times$  ٣٥ يوم ثم يسحب .

- فنكريستين Vincristine ١,٥ - ٢ مغ / ٢م حقن وردي في الأيام ١ - ٧ - ١٤ -

٢١ - ٢٨ .

- سيكلوفوسفاميد cyclophosphamide ٦٠٠ مغ / ٢م - ١٠٠٠ مغ / ٢م حقناً وردياً

في اليوم ١ ( اختياري ) .

- أدرياميسين Adriamycin ٢٠ مغ / ٢م حقناً وردياً في الأيام ١٥ - ١٦ - ١٧ .

- ميثوتركسات Mtx ٦ مغ / ٢م حقناً وردياً في الأيام ٣ - ٤ - ٩ - ١٠ - ٣٤ .

٣٥ .

- سيكلوفوسفاميد ٦٠٠ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم ٣٥ .

- أدرياميسين Adriamycin ٣٠ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم ٣٥ .

إحداث الهجوم induction :

- دونورييسين Daunorubicin ٥٠ مغ / ٢م حقناً وردياً من اليوم ١ وحتى ٣ .

- فنكريستين Vincristine ٢ مغ / ٢م حقناً وردياً في الأيام ١ - ٨ - ١٥ - ٢٢ .



- بردنيزون Prednisone ٦٠ مغ / ٢م يومياً عن طريق الفم من اليوم ١ حتى ٢٨ .
- ل - اسبراجيناز L-Asparaginase ٦٠٠٠ وحدة / ٢م حقناً عضلياً في الأيام ١٧ وحتى ٢٨ .

التكثيف consolidation :

العلاج A ( الشوط ١ و ٣ و ٥ و ٧ )

- دونورييسين Dounorubicin ٥٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً في اليوم ١ و ٢ .
- فنكرستين VCR ٢ مغ / ٢م حقناً وريدياً في الأيام ١ و ٨ .
- بردنيزون Prednisone ٦٠ مغ / ٢م يومياً عن طريق الفم من اليوم ١ وحتى ١٤ .
- ل - اسبراجيناز L-Asparaginase ١٢,٠٠٠ وحدة / ٢م حقناً عضلياً في الأيام ٢ - ٤ - ٧ - ٩ - ١١ - ١٤ .

العلاج B ( الاشواط ٢ و ٤ و ٦ و ٨ ) :

- تنيوسيد Teniposide ١٦٠ مغ / ٢م وريدي أيام ١ - ٤ - ٨ و ١١ .
- سيتوزين اراينوزيد cytosin arabinoside ٣٠٠ مغ / ٢م وريدي أيام ١ - ٤ - ٨ و ١١ .

العلاج C ( الشوط التاسع ) :

- ميثوتركسات Mtx ٦٩٠ مغ / ٢م بترتيب وريدي مستمر خلال ٤٢ ساعة .
- لوكوفورين Leucovorin ١٥ مغ / ٢م كل ٦ ساعات  $\times$  ١٢ جرعة تبدأ بعد ٤٢ ساعة .

ج - الأبيضاض النقوي الحاد ( AML ) :

١ - النظام CD :

- C - سيتاراين ١٠٠ مغ / ٢م بترتيب وريدي مستمر خلال ٢٤ ساعة  $\times$  ٧ أيام .
- D - دانورييسين ٤٥ مغ / ٢م في الأيام ١ و ٢ و ٣ .
- يكبر حتى حدوث الهجوع .

## ٢ - النظام CT :

C - سيتاراين Cytarabine ١٠٠ مغ / ٢م بشريب وريدي مستمر خلال ٢٤ ساعة x ٨ إلى ٣٢ يوماً .

T - ٦ - ثيو كوانين 6-thioguanine ٢,٥ مغ/٢م يومياً عن طريق الفم x ٨ إلى ٣٢ يوماً .  
يعطى الثيو كوانين صباحاً وبعد ٨ - ١٠ ساعات يعطى السيتارين مساءً .

## ٣ - النظام DAT :

أحداث الهجوع :

- دانوريسين Daunorubicin ٦٠ مغ / ٢م وريدي في اليوم ٥ - ٦ و ٧ .  
- سيتاراين ( arac ) ١٠٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً في ٣٠ دقيقة مرتين يومياً x ٧ أيام .  
- ٦ - ثيو كوانين 6-thioguanine ١٠٠ مغ / ٢م عن طريق الفم كل ١٢ ساعة x ٧ أيام .

التكثيف consolidation :

شوطين من السيتارين ( arac ) مع ثيو كوانين كل ١٣ ساعة x ٥ أيام بعد ذلك يعطى Daunorubicin جرعة واحدة .  
الأنشواط فقط بفاصل ٢١ يوماً .

معالجة الجهاز العصبي :

- تشيع القحف الوقائي ٢٤٠٠ راد ( ٢٠٠ راد x ٥ مرات أسبوعياً ) .  
- سيتاراين ( arac ) ١٠٠ مغ / ٢م حقناً داخل المساء خمس جرعات .

الصيانة Maintenance :

يعطى شهرياً السيتارين + ثيو كوانين لمدة ٥ أيام أو يعطى الـ Daunorubicin جرعة واحدة شهرياً .

## ٤ - DCT :

- دانوريسين Daunorubicine ٦٠ مغ / ٢م وريدي من اليوم الأول وحتى الثالث .

- سيتاراين cytarabine ٢٠٠ مغ / ٢م يومياً من اليوم الأول وحتى الخامس بتثريب وريدي مستمر .

- ثيوكوانين thioguanine 6 - ١٠٠ مغ / ٢م عن طريق الفم كل ١٢ ساعة من اليوم الأول حتى الخامس .

#### ٥ - TRAMACOL :

- ثيوغوانين thioguanine 6 - ١٠٠ مغ / ٢م يومياً عن طريق الفم x ٣ أيام .

- دونورييسين Daunorubicin ٤٠ مغ / ٢م وريدي في اليوم الأول .

- سيتاراين cytarabine ١٠٠ مغ / ٢م وريدي في الأيام ١ - ٢ و ٣ .

- ميثوتركسات Methotrxate ٧,٥ مغ / ٢م وريدي في اليوم الأول حتى ٣ .

- بريدنيزون Prednisone ٢٠٠ مغ / ٢م عن طريق الفم من اليوم الأول وحتى الخامس .

- سيكلوفوسفاميد cyclophosphamide ١٠٠ مغ / ٢م يومياً عن طريق الوريد من اليوم ١ وحتى ٣ .

- فنكرستين VCR ( oncovin ) ٢ مغ / ٢م في اليوم الأول .

- ل - اسبراجيناز L - asparaginase ٨٠٠ وحدة / ٢م يومياً في الأيام ١ وحتى ٢٨ (اختياري) .

#### ٦ - TRAP :

- ثيوغوانين thioguanine 6 - ١٠٠ مغ / ٢م يومياً عن طريق الفم من اليوم ١ وحتى ٥ .

- دونورييسين Dounorubciin ٤٠ مغ / ٢م يومياً حقناً وريدياً في اليوم الأول .

- سيتاراين cytarabine ١٠٠ مغ / ٢م يومياً وريدي من اليوم ١ حتى ٥ .

- بريدنيزون prednisone ٣٠ مغ / ٢م يومياً عن طريق الفم من اليوم ١ وحتى ٥ .

مسابع عشر - اللمفوما Lymphoma :

أ - داء هودجكن Hodgkin's disease ،

١ - النظام العلاجي ABVD :

A - أدرياميسين Adriamycin ٢٥ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم ١ و ١٤ .

B - بليومايسين Bleomycin ١٠ وحدة / ٢م حقناً وردياً في اليوم ١ و ١٤ .

V - فنبلاستين Vinblastine ٦ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم ١ و ١٤ .

D - داكاربازين Dtic ١٥٠ مغ / ٢م حقناً وردياً من اليوم ١ وحتى ٥ .

يكرر كل ٢٨ يوماً .

ملاحظة : تم تغيير جرعة Dtic إلى ٣٥٠ مغ / ٢م وردي في اليوم ١ و ١٤ .

٢ - B - CAVE :

B - بليومايسين Bleomycin ٥ وحدات / ٢م وردي في الأيام ١ و ٨ و ٣٥ .

C - لوموستين ( CCNU ) Lomustine ١٠٠ مغ / ٢م عن طريق الفم في اليوم الأول .

A - أدرياميسين Adriamycin ٦٠ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم ١ .

V - فنبلاستين Vinblastine ٥ مغ / ٢م وردي في اليوم الأول .

يكرر كل ٢٨ يوماً .

٣ - BVCPP :

B - BCNU ١٠٠ مغ / ٢م وردي في اليوم الأول .

V - فنبلاستين Vinblastine ٥ مغ / ٢م وردي في اليوم الأول .

C - سيكلوفوسفاميد Cyclophosphamide ٦٠٠ مغ / ٢م وردي في اليوم الأول .

P - بروكاربازين Procarbazine ١٠٠ مغ / ٢م عن طريق الفم الأيام ٢ وحتى ١٠ .

( ٥٠ مغ / ٢م في اليوم الأول ) .

P - پردنيزون Prednisone ٦٠ مغ / ٢م عن طريق الفم من اليوم ١ وحتى ١٠ .

يكرر كل ٢٨ يوماً .

#### ٤ - MOPP :

M - الخردل الآزوتي Nitrogen Mustard ٦ مغ / ٢م حقناً وريدياً في اليوم الأول والثامن .

O - فنكريستين Vincristine ١,٤ مغ / ٢م حقناً وريدياً في اليوم الأول والثامن .

P - بروكاربازين Procarbazine ١٠٠ مغ / ٢ يومياً عن طريق الفم من اليوم الأول حتى الرابع عشر .

يستخدم الأخير في الشوط الأول والرابع فقط .

( النظام العلاجي MOPP - C يستبدل الخردل الآزوتي بالسيكلوفوسفاميد ٦٥٠مغ/٢م في اليوم الأول والثامن ) .

#### ٥ - النظام MOPP / ABV :

MOPP - كما في السابق .

مع A - أدرياميسين Adriamycin ٣٥ مغ / ٢م حقن وريدي في اليوم الثامن .

B - بليومايسين Blomycin ١٠ وحدة / ٢م حقناً وريدياً تسبق بـ ١٠٠ مغ من الهيدروكورتيزون .

V - فنبلاستين Vinblastine ٦ مغ / ٢م وريدي في اليوم الثامن .

يكبر كل ٢٨ يوم .

#### ٦ - النظام MVPP :

M - الخردل الآزوتي Nitrogen Mustard ٦ مغ / ٢م حقناً وريدياً في اليوم الأول والثامن .

V - فنكريستين Vincristine ١,٤ مغ / ٢م حقناً وريدياً في اليوم الأول والثامن .

P - بروكاربازين Procarbazine ١٠٠ مغ / ٢ يومياً عن طريق الفم من اليوم الأول وحتى ١٤ .

P - پردنيزون Prednisone ٤٠ مغ / ٢م عن طريق الفم من اليوم ١ وحتى ١٤ .

يكبر كل ٢٨ يوم .

: MVVPP - ٧

M - الخردل الآزوتي ٦ مغ / ٢٠ وردي يوم (١) و (٨) .

V - فنكرستين ١,٤ مغ / ٢م وردي يوم ١ و ٨ و ١٥ .

V - فنبلاستين ٦ مغ / ٢م وردي في الأيام ٢٢ - ٢٩ و ٣٦

P - بروكاربارزين ١٠٠ مغ / ٢م عن طريق الفم من اليوم ٢٢ وحتى ٤٣ .

P - برينيزون ٤٠ مغ / ٢م عن طريق الفم من اليوم ١ وحتى ٢١ ثم يسحب تدريجياً ويحذف من الشوط الثاني والرابع .

يكبر كل ٥٦ يوماً .

ب - لاهودجكن لفوما Non Hodgkin's Lymphoma :

١ - النظام العلاجي BACOP :

B - بليومايسين Bleomycin ٥ وحدات / ٢م حقناً وردياً في اليوم ١٥ و ٢٢ .

A - أدريامايسين Adriamycin ٢٥ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم ١ و ٨ .

C - سيكلوفوسفاميد Cyclophosphamide ٦٥٠ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم ١ و ٨ .

O - فنكرستين Vincristine ١,٤ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم ١ و ٨ .

p - برينيزون Prednisone ٦٠ مغ / ٢م عن طريق الفم في الأيام ١٥ وحتى ٢٨ .

يكبر كل ٢٨ يوماً .

: CHOP - ٢

C - سيكلوفوسفاميد Cyclophosphamide ٧٥٠ مغ / ٢م وردي في اليوم الأول .

H - أدريامايسين Adriamycin ٥٠ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم الأول .

O - فنكرستين Vincristine ١,٤ مغ / ٢م ( جرعة قصوى ٢ مع ) حقناً وردياً .

P - برينيزون Prednisone ١٠٠ مغ / ٢م عن طريق الفم من اليوم الأول حتى

الخامس .

يكبر كل ٢١ يوماً .

### ٣ - CHOP - BLEO :

- C - سيكلوفوسفاميد ٧٥٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً في اليوم الأول .
- H - أدرياميسين Adriamycin ٥٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً في اليوم الأول .
- O - فنكرستين Vincristine ٢ مغ / ٢م وريدي في اليوم الأول والخامس .
- P - بريدنيزون Prednisone ١٠٠ مغ / ٢م عن طريق الفم في اليوم الأول وحتى الخامس .

blo - بليوماسين Blomycin ١٥ وحدة وريدي من اليوم الأول حتى الخامس .  
يكبر كل ٢١ يوماً .

### ٤ - C - MOPP :

- نفس الـ MOPP ولكن يستبدل الخردل الأزوتي بسيكلوفوسفاميد بجرعة ٦٥٠ مغ / ٢م وريدي في اليوم الأول والثامن .
- يكبر كل ٢٨ يوماً .

### ٥ - COD - BLAM IV :

- سيكلوفوسفاميد cyclophosphamide ٣٥٠ مغ / ٢م حقن وريدي ( تزداد ٥٠ مغ كل شوط ) .
- أدرياميسين Adriamycin ٣٥ مغ / ٢م حقناً وريدياً ( تزداد ٥ مغ كل شوط ) .
- فنكرستين Vincristine ١ مغ / ٢م ( جرعة قصوى ٢ مغ ) بشرب وريدي مستمر لمدة ٢٤ ساعة × يومين .
- بليوماسين Blomycin ٤ وحدات / ٢م حقناً وريدياً دفعة واحدة في اليوم الأول ثم ٤ وحدات / ٢م بشرب وريدي لمدة ٢٤ ساعة × ٥ أيام .
- ديكسميثازون Dexamethasone ١٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً يومياً × ٥ أيام .
- بروكاربازين Procarbazine ١٠٠ مغ / ٢م عن طريق الفم يومياً × ٥ أيام .
- يكبر كل ٢١ يوماً × ٤ جرعات .

في الجرعة الخامسة

- أدرياميسين Adriamycin ٩٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً في اليوم الأول .
- سيكلوفوسفاميد cyclophosphamide ١٥٠٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً في اليوم الأول .
- فنكريستين Vincristine ١ مغ / ٢م وريدي في اليوم الأول .
- ديكساميثازون Dexamethasone ١٠ مغ / ٢م يومياً عن طريق الفم x ٥ أيام
- ومن الجرعة ٧ حتى ١٣ ( MACE ) :
- ميثوتركسات Mix ١٢٠ مغ / ٢ حقناً وريدياً في اليوم الأول يُعطى بعدها
- . Leucovorin

- سيتارابين arar - c ٢٥٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً في اليوم الأول .
- اللوكوفورين ٢٥ ملغ / ٢م كل ست ساعات لأربع جرعات تبدأ بعد ٢٤ ساعة من إعطاء الميثوتركسات .
- إيتوبوسيد ( VP ١٦ ) Etoposide ١٠٠ مغ / ٢م وريدي في اليوم الأول .

٦ - COMLA :

- C - سيكلوفوسفاميد cyclophosphamide ١٥٠٠ مغ / ٢م حقناً وريدياً في اليوم الأول.

- V - فنكريستين Vincristine ١,٤ مغ / ٢م في الأيام ١ - ٨ - ١٥ .
- M - ميثوتركسات Methotrexate ١٢٠ مغ / ٢م وريدي في الأيام ٢٢ - ٢٩ - ٤٣ - ٥٠ - ٥٧ - ٦٤ - ٧١ .

- L - لوكوفورين Leucovorin ٢٥ مغ / ٢م عن طريق الفم كل ست ساعات x ٤ جرعات تبدأ بعد ٢٤ ساعة من إعطاء الميثوتركسات .

- A - سيتارابين ara - c ٣٠٠ مغ / ٢م وريدي في الأيام ٢٢ - ٢٩ - ٣٦ - ٤٣ - ٥٠ - ٥٧ - ٦٤ و ٧١ .

يكبر كل ٨٥ يوماً .



**٧ - COP :**

- C - سيكلوفوسفاميد Cyclophosphamide ٨٠٠ مغ / ٢م حقناً وردياً في اليوم الأول.  
O - فنكريستين Vincristine ٢ مغ / ٢م وردي في اليوم الأول .  
P - پردينزون Prednisone ٦٠ مغ / ٢م يومياً عن طريق الفم من اليوم حتى ٥  
تسحب خلال ٣ أيام .  
يكبر كل ١٤ يوماً .

**٨ - COPP :**

- C - سيكلوفوسفاميد Cyclophosphamide ٦٠٠ مغ / ٢م وردي في اليوم ١ و ٨ .  
O - فنكريستين Vincristine ١,٤ مغ / ٢م وردي في اليوم ١ و ٨ .  
P - بروكاربازين Procarbazine ١٠٠ مغ / ٢م عن طريق الفم من اليوم الأول حتى  
العاشر .  
P - پردينزون Prednisone ٤٠ مغ / ٢م عن طريق الفم الأول حتى الرابع عشر .  
يكبر كل ٢٨ يوماً .

**٩ - CVP :**

- C - سيكلوفوسفاميد Cyclophosphamide ٤٠٠ مغ / ٢م عن طريق الفم من اليوم  
الأول حتى الخامس .  
V - فنكريستين Vincristine ١,٤ مغ / ٢م وردي في اليوم الأول .  
P - پردينزون Prednisone ١٠٠ مغ / ٢م عن طريق الفم من اليوم الأول حتى  
الخامس .  
يكبر كل ٢١ يوماً .

**١٠ - HOP :**

- H - أدريامايسين Adriamycin ٨٠ مغ / ٢م وردي في اليوم الأول .  
O - فنكريستين VCR ١,٤ مغ / ٢م وردي في اليوم الأول .

P - بردينزون Prednisone ١٠٠ مغ / ٢م عن طريق الفم من اليوم الأول حتى الخامس.

يكبر كل ٢١ يوماً .

: IMVP - 16 - ١١

I - فوسفاميد Ifosfamide ١٠٠٠ مغ / ٢م بثريب وريدي مستمر لمدة ٢٤ ساعة من اليوم وحتى الخامس .

ميزنا Mcsna ٨٠٠ مغ / ٢م وريدي دفعة واحدة قبل بدء الإفوسفاميد ثم ٤ مغ / ٢م بثريب وريدي مستمر لمدة ٢٤ ساعة مرافق للإفوسفاميد ثم ٢,٤ مغ / ٢م بثريب وريدي مستمر لمدة ١٢ ساعة بعد إنتهاء الدواء .

M - ميثوتركسات Mtx ٣٠ مغ / ٢م وريدي في اليوم ٣ و ١٠ .

VP16 إيتوبوسيد ١٠٠ مغ / ٢م وريدي من اليوم الأول حتى الثالث .  
يكبر كل ٢١ يوم إلى ٢٨ يوماً .

: m - BACOD - ١٢

ميثوتركسات Mtx : ٢٠٠ مغ / ٢م وريدي في الأيام ٨ و ١٥ .

لوكوفورين Leucovorin ١٠ مغ / ٢م عن طريق الفم كل ست ساعات ٨ x  
جرعات تبدأ بعد ٢٤ ساعة من إعطاء الميثوتركسات في كل مرة .

B - بليومايسين Bleomycin ٤ وحدات / ٢م وريدي في اليوم الأول .

A - أدريامايسين Adriamycin ٤٥ مغ / ٢م وريدي في اليوم الأول .

C - سيكلوفوسفاميد Cyclophosphamide ٦٠٠ مغ / ٢م في اليوم الأول .

O - فنكرستين Oncovin ١ مغ / ٢م وريدي في اليوم الأول .

D - ديكساميثازون Dexamethasone ٦ مغ / ٢م من اليوم ١ حتى ٥ .  
يكبر كل ٢١ يوماً .

### ١٣ - M - BACOD :

نفس النظام السابق m - BACOD ولكن جرعة الميثوتركسات هي ٣٠٠ مغ / ٢م في اليوم ٨ و ١٥ .  
يكبر كل ٢١ يوماً .

### ١٤ - MACOB - B :

M - ميثوتركسات Mtx ٤٠٠ مغ / ٢م في الأسبوع ٢ - ٦ و ١٠ .  
لوكونفورين Leucovorin ١٥ مغ / ٢م عن طريق الفم كل ست ساعات x ٦ جرعات ( تبدأ بعد ٢٤ ساعة من إعطاء Mtx ) .  
A - أدرياميسين Adriamycin ٥٠ مغ / ٢م وريدي في الأسابيع ١ - ٣ - ٥ - ٧ - ٩ و ١١ .  
C - سيكلوفوسفاميد Cyclophosphamide ٣٥٠ مغ / ٢م وريدي في الأسابيع ١ - ٣ - ٥ - ٧ - ٩ و ١١ .  
O - فنكرستين Oncovin ١,٤ مغ / ٢م في الأسابيع ٢ - ٤ - ٦ - ٨ - ١٠ و ١٢ .  
B - بليومايسين Bleomycin ١٠ وحدات / ٢م وريدي في الأسابيع ٤ - ٨ و ١٢ .  
P - پردنيزون Prednisone ٧٥ مغ / ٢م عن طريق الفم يومياً لمدة ١٥ يوماً .  
Ketoconazol ٢٠٠ مغ عن طريق الفم يومياً خلال فترة المعالجة .

### ١٥ - النظام PROMACE :

- إيتوبوسيد Etoposide ١٢٠ مغ / ٢م وريدي في اليوم ١ و ٨ .  
- سيكلوفوسفاميد Cyclophosphamide ٦٥٠ مغ / ٢م وريدي في اليوم ١ و ٨ .  
- أدرياميسين Adriamycin ٢٥ مغ / ٢م وريدي في اليوم ١ و ٨ .  
- ميثوتركسات Methotrexate ١,٥ غ / ٢م وريدي في اليوم ١٤ .  
- لوكونفورين Leucovorin ٥٠ مغ / ٢م كل ست ساعات x ٥ جرعات تبدأ بعد ٢٤ ساعة من إعطاء الميثوتركسات .

- بردينزون Prednisone ٦٠ مغ / ٢م عن طريق الفم من اليوم ١ حتى ١٤ .  
يكرر كل ٢٨ يوماً .

#### ١٦ - ProMACE - CYTABOM :

- سيكلوفوسفاميد ٦٠٥ مغ / ٢م دفش وريدي يوم ١ .
- أدرياميسين ADR ٢٥ مغ / ٢م دفش وريدي في اليوم ١ .
- إيتوبوسيد VP16 ١٢٠ مغ / ٢م بتريب وريدي لمدة ٦٠ دقيقة يوم ١ .
- بردينزون Prednisone ٦٠ مغ / ٢م عن طريق الفم من اليوم ١ حتى ١٤ .
- سيتاراين ara - c ٣٠٠ مغ ٢م حقن وريدي يوم ٨ .
- بليومايسين ٥ وحدات / ٢م وريدي يوم ٨ .
- فنكرستين ١,٤ مغ / ٢م ( جرعة قصوى ٢ مع ) دفش يوم ٨ .
- ميثوتركسات Mix ١٢٠مغ / ٢م وريدي يوم ٨ .
- لوكوفورين ٢٥ مغ / ٢م عن طريق الفم كل ٦ ساعات  $\times$  ٦ جرعات بعد ٢٤ ساعة من إعطاء Mix . يكرر كل ٢١ يوماً ويعطى على الأقل ٦ جرعات ويعطى جرعتان إضافيتان بعد الهجوع التام .

#### ثامن عشر - الورم النقوي المتعدد Multiple Myeloma :

##### ١ - النظام العلاجي BCAP :

- B BCNU ( كارموستين ) ٥٠ مغ / ٢م وريدي يوم ١ .
- C سيكلوفوسفاميد ٢٠٠ مغ / ٢م وريدي يوم ١ .
- A أدرياميسين Adriamycin ٢٠ مغ / ٢م وريدي يوم ٢ .
- P بردينزون Prednisone ٦٠ مغ / ٢م من اليوم ١ حتى ٥ .  
يكرر كل ٢٨ يوماً .

##### ٢ - الجرعة العالية من الديكساميثازون High Dose of Dexamethasone :

- ديكساميثازون Dexamethasone ٤٠ مغ عن طريق الفم أيام ١ حتى ٤ و ٩ حتى

١٢ و ١٧ حتى ٢٠ .

يكبر كل ٢٨ يوماً .

٣ - سيكلوفوسفاميد مع البريدنيزون Cyclophosphamide + Prednison :  
- سيكلوفوسفاميد ١٥٠ - ٢٢٥ مغ / ٢٠ ( جرعة قصوى ٥٠٠ مغ ) وريدي أو  
عن طريق الفم أسبوعياً .  
- بردينزون ١٠٠ مغ عن طريق الفم كل يومين .

٤ - النظام العلاجي M-2 :

- فنكريستين Vincristine ٠,٣ مغ / كغ وريدي في اليوم الأول .

- كارموستين ( BCNU ) Carmustine ٥٠ مغ / ٢٠ أو ٠,٥ مغ / كغ وريدي في اليوم  
الأول .

- سيكلوفوسفاميد Cyclophosphamide ١٠ مغ / ٢٠ وريدي في اليوم الأول .

- ميلفالان Melphalan ٠,٢٥ مغ / كغ × ٤ أيام أو ٠,١ مغ / كغ لمدة ٧ - ١٠  
أيام .

- بريدنيزون Prednison ١٠ مغ / كغ يومياً فمويًا × ٧ أيام ثم يسحب تدريجياً .  
يكبر كل ٥٣ يوماً .

٥ - الميلفالان مع البردينزون Melphalan + Prednison :

- الميلفالان Melphalan ٠,١٥ مغ / كغ عن طريق الفم × ٧ أيام .

- بريدنيزون Prednison ٢٠ مغ ٣ مرات يومياً لمدة ٧ أيام .

يكبر كل ٦ ست أسابيع .

٦ - النظام العلاجي VAD :

٧ - فنكريستين Vincristine ٠,٤ مغ بشريب وريدي مستمر في الأيام ١ وحتى ٤ .

٨ - أدرياميسين Adriamycin ٩ مغ / ٢٠ بشريب وريدي مستمر في الأيام ١  
وحتى ٤ .

D - ديكساميثازون Dexamethason ٤٠ مغ عن طريق الفم في الأيام ١ وحتى ٤ - ٩  
وحتى ١٢ و ١٧ حتى ٢٠ .

يكرر كل ٢٨ يوماً .

: VBAP - ٧

V - فنكرستين VCR ١ مغ / ٢م ( جرعة قصوى ١,٥ مع ) حقناً وردياً في اليوم  
الأول .

B - كارموستين BCNU ٣٠ مغ / ٢م بشرب وردي خلال ١ ساعة في اليوم الأول.

A - أدرياميسين Adriamycin ٣٠ مغ / ٢م وردي في اليوم الأول .

P - بردينزون Prednisone ٦٠ مغ / ٢م عن طريق الفم من اليوم الأول حتى ٤ .

: VCAP - ٨

V - فنكرستين VCR ١ مغ / ٢م ( جرعة قصوى ١,٥ مع ) يوم ١ وردي .

C - سيكلوفوسفاميد ١٢٥ مغ / ٢م عن طريق الفم يوم ١ وحتى ٤ .

A - أدرياميسين ٣٠ مغ / ٢م وردي يوم ١ .

P - بردينزون ٦٠ مغ / ٢م عن طريق الفم من اليوم ١ وحتى ٤ .

: VCMP - ٩

V - فنكرستين ١ مغ / ٢م ( جرعة قصوى ١,٥ مع ) يوم ١ .

C - سيكلوفوسفاميد ١٢٥ مغ / ٢م عن طريق الفم من اليوم ١ وحتى ٤ .

M - ميلفالان ٦ مغ / ٢م عن طريق الفم من اليوم ١ وحتى ٤ .

P - بردينزون ٦٠ مغ / ٢م عن طريق الفم من اليوم ١ وحتى ٤ .

يمكن أن يعطى بالتناوب مع VCAP كل ٣ اسابيع ولمدة ٦ - ١٢ شهر .

# **المعالجة الحديثة لبعض أنواع الأورام**

## المعالجة الكيميائية للميلانوم Chemotherapy of Melanoma

- المعالجة الكيميائية بدواء وحيد Single agent Chemotherapy :

أكثر الأدوية فعالية إذ إستخدم بمفرده هو الداكارازين ( Dtic ) وDacarbazine والذي يترافق بمعدل إستجابة كلي ٢٠٪ ولكن الإستجابة التامة أو الهجوع التام complete Remission غير شائع والفترة الوسطية للإستجابة تصل حتى السنة والعقد للمفاوية تحت الجلد والنقائل الرئوية هي الأكثر إستجابة بينما يعتبر الـ Dtic غير فعالاً في معالجة النقائل الدماغية كما لوحظ أن التأثير العلاجي للـ Dtic لا يعتمد على الجرعة وطريقة إعطاء الدواء المتنوعة بشكل واسع فمثلاً يمكن أن يعطى الدواء من ٢ - ٤,٥ مغ / كغ يومياً لمدة عشرة أيام أو بجرعة ٢٧٠ مغ / ٢م يومياً لمدة ٥ أيام أو ٨٥٠ مغ حتى ١٠٠٠ مغ / ٢م بجرعة واحدة ويكرر العلاج شهرياً أما السمية الدموية فهي متوسطة الآثار المعوية تتناسب مع شدة النظام العلاجي فتكون شديدة عند إعطاء الجرعة العالية دفعة واحدة ولذلك فإنه يفضل إعطاء الدواء بجرعات مقسمة على ثلاث إلى خمس أيام . يمكن أن يسبب الدواء إضطراباً في وظائف الكبد مخبرياً ولكن نادراً ما يحدث الفشل الكبدي الذي يعتبر اختلاطاً مميتاً ولحسن الحظ أنه نادر الحدوث .

مركبات النيتروسويوريا ( chloroZotocin 2 methyl CCNU - CCNU - BCNU ) تعتبر فعالة عند إستخدامها كدواء وحيد في معالجة الميلانوم وبمعدل إستجابة يتراوح ما بين ٩ و ١٨٪ ولكونها مركبات تنحل بشكل جيد في المواد الدسمة فإنها يمكن أن تكون الأمل في معالجة النقائل الدماغية Brain Metastases ولكن بالجرعات الإعتيادية لم تكن هذه الأدوية بمستوى الآمال التي عقدت عليها وكما هو الحال في DTIC فإن العقد للمفاوية تحت الجلد والنقائل الرئوية هي الأكثر إستجابة للمعالجة والفترة الوسطية لإستمرار الإستجابة هي ٢ - ١٦ شهر وبالمقارنة مع الـ



DTIC فإن السمية على نقي العظم تكون أشد وقد تدوم طويلاً والسمية على الأمعاء متوسطة الشدة وإعطاء هذه المركبات عن طريق الفم يعتبر الميزة الحسنة الأساسية لها وذلك للسهولة في إعطاء الدواء .

من المركبات الأخرى الفعالة إذا إستخدمت كدواء وحيد هو الفنديزين vindesine وهو دواء نصف تركيبي مشتق من الفنبلاستين vinblastine ويتوافق بمعدل إستجابة يصل حتى ١٤٪ وتأثيره المضاد للأورام يعتمد على غط إعطاء الدواء schedule بإعطاء الدواء بشكل متقطع وبجرعة وريدية كبيرة bolus يتوافق بمعدل إستجابة يصل حتى ١٧٪ بينما لم يلاحظ بشكل أي إستجابة عند إعطائه بتثريب وريدي مستمر continuous infusion أما الجرعة فهي تتراوح ما بين ٦٠ و ١٢٠ مغ / م٢ .

- السيسبلاين cisplatin من الأدوية الفعالة وله معدل إستجابة ١٥٪ وبالرغم من ملاحظة بضع حالات من الإستجابة التامة إلا أن الفترة الوسطية لإستمرار هذه الإستجابة لاتتجاوز الـ ٣ أشهر ولقد تبين أن السيسبلاين دواء غريب للأمال عند إستخدامه بالجرعات الإعتيادية .

- دواء التاكسول Taxol المشتق من شجر الصنوبر الغربي western yew أدى إلى معدل الإستجابة ١٥٪ عند إعطائه بجرعة ٢٥٠ مغ / م٢ بتثريب وريدي مستمر لمدة ٢٤ ساعة وأكثر الآثار الجانبية هي إنخفاض المعتدلات وإعتلال الأعصاب المحيطية .

ويمكن إستخدام الانترفيرون ( ألفا - بيتا وغاما ) كعلاج وحيد هي عبارة عن بروتينات سكرية تنتج بواسطة أنواع مختلفة من الخلايا كإستجابة لمبهات مختلفة وأكثرها إستخداماً ودراسة هو الانترفيرون الفا a - interferon حيث يعطى حقناً عضلياً وبجرعة يومية أو أسبوعية تقدر بـ ١٠<sup>٦</sup> إلى ١٠<sup>٧</sup> وحدة ولوحظ أن معدل الإستجابة ١٣,٣٪ و ٥,١٪ من المرض حدث لديهم الهجوع التام ولفترة طويلة ولقد لوحظ تراجع الورم بمختلف الطرق العلاجية والجرعات مما يصعب تحديد الطريقة المفضلة

ولذلك فإن الحل العملي المناسب هو إعطاء ٣ إلى ٢٠ × ١٠<sup>٦</sup> وحدة (تزداد بالتدريج) ثلاث مرات أسبوعياً حتى تراجع الورم وباختصار هناك عدة مركبات لهاتأثير على معالجة الميلانوم المنتشر إذا إستخدمت كدواء وحيد .

#### - المعالجة الكيميائية المتكاملة Adjuvant chemotherapy :

إن التصنيف المجهرى للورم البدني بواسطة تحديد عمق الآفة في طبقات الجلد المختلفة وتأثير ذلك مع الإصابة العقدية على الإنذار أدى إلى تحديد الحالات المعرضة للنكس بعد الجراحة High Risk : وهي المرحلة الأولى ( المرض الموضعي ) والتي تشمل CLARK'S III أو أكثر والآفة بسماكة ١,٥ مم أو أكثر المرحلة الثانية ( المرض الناحي) وكذلك المرحلة الثالثة ( المنتشر ) وكذلك المرضى اللذين تعرضوا للعمل الجراحي دون وجود أي دليل على المرض بعد العمل الجراحي ممكن أن يعالجو معالجة متممة وعلى الرغم أن نتائج الدراسات المختلفة لم تبشر بأي أمل إلا أن هناك اهتمام بالمعالجة المناعية كمعالجة متممة وباختصار يمكن القول أنه ليس هناك تأثير واضح للمعالجة المتممة للميلانوم .

#### : المشاركة الدوائية Combination Chemotherapy :

إن الـ DTIC يجزعه الإعتيادية أكثر الأدوية فعالية عند إستخدامه كدواء وحيد في معالجة الميلانوم وهذا يجعلنا نتساءل هل المشاركة التي تحوي على هذا الدواء أكثر فعالية من الدواء بمفرده ؟

ويمكن القول من خلال الدراسات العديدة أن المشاركة بدوائين لم تكن أكثر فعالية كما أن إضافة دواء ثالث لم تؤدي إلى تقوية التأثير إضافة لزيادة السمية الدوائية ولكن بمراقبة المشاركات المختلفة نلاحظ أن إستخدام أربعة أدوية هي DDP + DTIC + BCNU والتاموكسيفين ترافقت بمعدل إستجابة ٥٢٪ ولكن لوحظ أن هناك معدل عالي للإصابة بالصدمات الوعائية ٣٠٪ مما أدى إلى حذف التاموكسيفين من النظام العلاجي فتراجع معدل الإستجابة عند باقي المرضى ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن

التاموكسيفين قد يقوي تأثير بعض الأدوية فمثلاً يمكن أن يزداد التأثير المضاد للأورام للسيسبلائين بواسطة مضادات الكالسيوم Calcium antagonist ويبدو أن للتاموكسيفين صفات مضادة للكالسيوم . السيسبلائين كدواء وحيد لم يكن فعالاً في معالجة الميلانوم فهل يكون فعالاً في المشاركة الأخرى غير المشاركة بأربعة أدوية المذكورة سابقاً ؟ .

إن المشاركة الثلاثية فيما بين السيسبلائين - البليومايسين - ولوموستين CCNU توافقت بمعدل إستجابة يصل حتى ٤٨٪ ولكن دون حدوث الهجوع التام كما لوحظ أن السمية كانت عالية وباخلاصة يمكن أن نقول أنه على الرغم من أن المشاركة ما بين DTIC و BCNU والسيسبلائين والتاموكسيفين ) تحتاج للدراسة إلا أن معدل الإستجابة وفترة استمرار هذه الإستجابة تجعل من هذه المشاركة الخط الأول للمعالجة ويمكن اعتبار المشاركة ما بين الـ Vinka askaloid - اكينومايسين - دوالبروكاربازين هي الخط الثاني .

إن التأثير المثبط للمناعة immunos uppressive effect للأدوية المضادة للسرطان دفع بالباحثين لإشراك بعض المنبهات المناعية غير النوعية non specific immuno stimulators مثل لقاح الـ BCG مع هذه الأدوية وذلك للتغلب على هذا التأثير المثبط للمناعة وبالتالي تقوية التأثير العلاجي للأدوية الكيميائية ولقد جرت عدة تجارب سريرية لبيان تأثير هذه المشاركة كإعطاء الـ DTIC مع الـ BCG التي توافقت مع معدل إستجابة أعلى من إعطاء الـ DTIC لوحده ويمكن أيضاً مشاركة الانترالوكين - ٢ مع الـ DTIC وباقي الأدوية .

## المعالجة الكيميائية لأورام الدماغ البدئية

### Chemotherapy of Primary Brain Tumors

بدأ استخدام المعالجة الكيميائية في الأورام البدئية للدماغ منذ حوالي ٤٠ سنة ولكن النتائج كانت مخيبة للآمال إلا في بعض الحالات القليلة كما أن المعالجة الكيميائية لأورام الجهاز العصبي المركزي تمتلك صعوبات خاصة بها وهناك أربع عوامل تجعل من هذه المعالجة غير مفيدة وهي :

- ١ - إمكانية الوفاة العالية المرافقة لحجم صغير نسبياً للورم
- ٢ - إمكانية حدوث الوذمة الدماغية الشديدة .
- ٣ - وجود عدد قليل من الخلايا التي تنكاثر Low Growth Fraction حتى في أكثر الأورام خبيثاً .
- ٤ - وجود الحواجز الوعائية الدماغية Blood Brain Barrier B . B . B التي تمنع من دخول الكثير من الأدوية الكيميائية للدماغ .

#### المعالجة الكيميائية للأورام الدبقية عالية الخبث High Grade Astrocytomas :

إن المعالجة الكيميائية لأورام الدماغ اكتسبت أهمية من حيث الدراسات الدائمة حول تأثيرها وخاصة بالنسبة للأورام عالية الخبث High Grade وحتى هذا الوقت فإن أكثر من ١٠٠ دواء تم استخدامه في علاج هذه الأورام وكل هذه الأدوية استعملت في مجموعات صغيرة أو في تجارب فردية وبالرغم من تحقيق بعض النجاحات إلا أنه لم يثبت أي دواء فعالية واضحة في التجارب السريرية ولكن لوحظ أن النتروسويوريا nitrosourea - السيسبلائين - البروكاربازين procarbazine هي أكثر الأدوية الفعالة في معالجة الأورام الناكسة .

أما من ناحية تأثير المعالجة الكيميائية المتممة فقد جرت عدة دراسات تقارن ما بين إعطاء المعالجة الكيميائية بعد حدوث النكس وبين إعطائها كمعالجة متممة وقد بينت

هذه الدراسات على أن المعالجة بعد حدوث النكس يمكن أن تكون مفيدة كإعطاء المعالجة المتممة ومن هذه الدراسات نذكر دراسة أجريت على ٢٢٢ مريض ولاحظت أن إعطاء الـ BCNU يمكن أن تؤدي إلى زيادة طفيفة في معدل الحياة ( ٤٪ من المرضى عاشوا لـ ١٨ شهر بعد الجراحة والمعالجة الشعاعية مقابل ١٩٪ من المرضى الذين عولجوا بالجراحة والأشعة والـ BCNU ولكن هذه الزيادة لم تكن كافية من الناحية الإحصائية وفي دراسة أخرى لوحظ أن الـ BCNU يزيد من معدل الحياة وبشكل كافٍ من الناحية الإحصائية كما وجد أن البروكاربازين ودواء STREPTOZOTCIN لهما نفس فعالية الـ BCNU. لكن هما آثار جانبية أكثر .

وفي عام ١٩٨٩ تم في دراسة سريرية المقارنة ما بين استخدام المشاركة ما بين BCNU والبروكاربازين والمشاركة ما بين BCNU + هيدروكسي يوريا + بروكاربازين و VM26 ولم يلاحظ أي فرق إحصائياً ما بين المجموعتين أي أن هذه المشاركات لم تكن أكثر فعالية من استخدام الـ BCNU بمفرده ونظراً للتأثير غير المرضية للمعالجة الكيميائية فقد جرت عدة محاولات لتحسين هذه النتائج والتغلب على المصاعب مثل الحواجز الدماغية الوعائية كحقن الدواء داخل الشريان أو داخل الورم ولكنها كلها لاتزال قيد الدراسة وتترافق باختلاطات شديدة ولكن يمكن للمعالجة الكيميائية بمجموعات عالية مع إجراء زرع نقي عظم أن تكون الأمل إلا أن الدراسات القليلة التي استخدمت الـ BCNU والـ VP16 أظهرت أن السمية كانت عالية وأن النتائج لم تكن مرضية من حيث التأثير على معدل الحياة .

#### الأورام النجمية قليلة الخبيث Low Grade Asto cytoma :

إن إنذار الأورام الدبقية قليلة الخبيث أفضل بكثير من عالية الخبيث ومتوسط الحياة لأورام الدرجة الأولى gArd I حوالي ٥ سنوات ولا يوجد أي شك على أن العلاج الأساسي لهذه الأورام هي الجراحة لوضع التشخيص وإزالة الورم أما دور المعالجة الشعاعية فإنه أقل وضوحاً ولكن عدة دراسات سريرية أثبتت على أن إعطاء المعالجة

الشعاعية بعد الإستئصال الجراحي يحسن من معدل الحياة إلا أن هناك دراسات أخرى تشير إلى أنه لا يوجد أي تأثير على معدل الحياة للمعالجة الشعاعية ولكنها قد تزيد من تحول هذه الأورام للخبيث وتجري حديثاً دراسة طويلة الأمد يتم خلالها تحديد تأثير المعالجة الشعاعية على هذه الأورام .

#### المعالجة الكيميائية للأورام الدبقية قليلة الخبيث Low Grade Gliomas :

نظراً لانخفاض معدل الإنقسام لهذه الأورام فإن المعالجة الكيميائية لا تستخدم في معالجة هذه الأورام والدراسات الأولية عن إستخدام النتروسويوريا nitrosourea كمعالجة متممة Adjuvant therapy لم تظهر أي فعالية .

ال BCNU معروف بقدرته على إحداث الأورام عند الحيوانات ولذلك فهناك خطورة من انقلاب هذه الأورام للدرجات العالية الخبيث عند إستخدامه .

نستنتج إنه لا يوجد للمعالجة الكيميائية أي دور في معالجة الأورام الدبقية النجمية قليلة الخبيث ولكن عند حدوث النكس فإنه غالباً ما يكون بدرجة خبيث أعلى في هذه الحالة يمكن للمعالجة الكيميائية أن تعطي نفس النتائج الناجمة عن إستخدامها في معالجة الأورام عالية الخبيث .

#### ورم الخلية العصبية الناقصة Oligodendrio Glioma :

وهي أورام بطيئة النمو تصيب بشكل أساسي نصفي الكرة المخية والأورام التي تكون نقية غالباً ما تكون سليمة ويمكن أن تستأصل بشكل تام أما في حالة عدم الإستئصال التام فإن دور المعالجة الشعاعية لا يزال قيد الجدل والمناقشة ولكن الكثير من الدراسات أكدت على أن المعالجة الشعاعية بعد العمل الجراحي تزيد من معدل الحياة .

المعالجة الكيميائية :

وهي عادة غير مستطبة في معالجة الأورام النقية pure oligodendroglioma ولكن في حال كون الورم نسيجياً وسريعاً سريع النمو فإنه يمكن المعالجة بالمشاركة ما بين CCNU + بروكاربازين والفنكرستين ويمكن إعطاء هذه المعالجة كمعالجة متممة بعد

الإستئصال التام وقبل المعالجة الشعاعية ولقد بينت الدراسات على أن الأورام الخبيثة تميل للإستجابة للمعالجة الكيميائية بشكل جيد .

#### ورم الرءاء الفوقاني Ependymomas :

وهي تنشأ من الخلايا المبطنة للبطينات Ependymal cells والقناة المركزية للنخاع الشوكي و ٧٠٪ من هذه الأورام تتوضع في الحفرة الخلفية وأورام الحفرة الخلفية أشيع حدوثاً عند الأطفال منه عند الكبار .

الإستئصال الجراحي هو العلاج الأساسي ولكن نتيجة للتوضع العميق لمعظم هذه الأورام فإن الإستئصال الجراحي قد يكون صعباً أو مستحيلاً وإعتماداً على الدراسات المختلفة فإنه يمكن للمعالجة الشعاعية أن تحسن من معدل الحياة ولأن هذه الأورام تميل للإنتشار عبر السائل الدماغي الشوكي فإن الساحات الشعاعية المثالية لاتزال تتبرر اجدل ففي حالة الأورام عالية الخبث High Grade والمتوضعة تحت الخيمة يفضل جميع الباحثين في هذه الحالة معاجة المحور العصبي بشكل كامل cranio spinal .

المعالجة الكيميائية : لم يختبر العلاج الكيميائي لهذه الأورام عند الكبار بالتجارب السريري ولكن هناك معلومات قليلة عن الأورام الناكسة حيث جرى إستخدام النتروسويوريا - الخردل الآزوتي - البروكاربازين والفنكرستين وكذلك النظام العلاجي MOPP وكان نسبة النجاح ضئيلة كما جرب إستخدام السييسبلائين في بعض الدراسات ولقد حقق معدل إستجابة يصل حتى ٥٠٪ .

و جرب إستخدام الـ CCNU مع الفنكرستين كمعالجة متممة عند الكبار والصفار أظهرت النتائج عسى أن معدل الحياة تحسن بالمقارنة مع المجموعات غير المعالجة.

#### اللمفوما البدئية في الجهاز العصبي المركزي Primary Central Nervus System

##### : Lymphoma ( PCNSL )

اللمفوما البدئية في الجهاز العصبي المركزي RCNSL وتدعى أيضاً الأورام الدبقية

الدقيقة Microglioma او غرن الخلايا الشبكية Reticulum cell sarcoma نادرة نسبيا وتشكل ١٪ من كل أورام الدماغ البدئية وهي شائعة الحدوث عند المعالجين بالمنبطات المناعية immunosuppressive drugs وخاصة المتعرضين لعمليات زرع الأعضاء وكذلك عند المرضى المصابين بمتلازمة عوز المناعة المكتسب AIDS .

الإصابة عادة ماتكون متعددة البؤر وتصيب عميقاً انادة البيضاء. دور الجراحة فقط لوضع الشخيص أما المعالجة الشعاعية فإنها تعطى إستجابة كبيرة ولكن عادة ماينكس الورم والمعدل الوسطي للحياة بعد المعالجة الشعاعية هو ٣٥ شهر ولم يلاحظ أي حالة عاشت لـ ٥ سنوات . حوالي ٢٥ ٪ من المرضى يكون السائل الدماغى الشوكى مصابا بالخلايا الورمية ولقد لوحظ في بعض التقارير السريرية أن هناك زيادة في معدل الحياة في عدد قليل عند تشيع كامل المحور العصي .

#### المعالجة الكيميائية Chemotherapy :

عدة أدوية إستخدمت عند عدد قليل من المرضى وهذه الأدوية هي الأدوية الفعالة في حالة اللمفوما مثل سيكلوفوسفاميد - أدرياميسين - فنكرستين - ٦- ميركاتوبورين مع الريدنزون . أطول معدل للحياة لوحظ عند المرضى المعالجين بالنظام CHOP وفي مجموعة من ١٠ مرضى عولجوا بواسطة الديكساميثازون مع السيتاراين arac بجرعة عالية والسيبلائين حيث أدت إلى الهجوع التام عند ٢ من أصل ٤ مرضى وإلى الهجوع التام عند ٤ من أصل ٦ مرضى تعرضوا للنكس ، أما الجرعات العالية من الديكساميثازون قبل العلاج الشعاعى أدت على الهجوع التام عند ٨ وإستجابة جزئية عند ٤ من أصل ١٣ مريض .

المرضى المعالجين بمنبطات المناعة بعد تعرضهم لعمليات زرع الأعضاء يكون سبب الإصابة لديهم غالباً الحمى الراشحة : إيشتاين بار " ولذلك يمكن معالجتهم بإقلال جرعة منبطات المناعة مع إعطاء الأدوية المضادة للحمى الراشحة antiviral drugs ويمكن أن تؤدي هذه المعالجة للهجوع التام .



## المعالجة الكيميائية للأورام البدنية للجهاز العصبي المركزي عند الأطفال :

### أ. أورام جذع الدماغ الدبقية Brain stem Gliomas :

وتشكل ٢٥٪ من الأورام البدنية للدماغ عند الأطفال وتحدث عند الكبار أيضاً ولكنها تشكل أقل من ٥٪ والتشخيص يوضع عادة نتيجة للصورة السريرية والموجودات الشعاعية بعد إجراء المرنان MRI والتصوير الطبقي المبرمج C.TScan ونادراً ما يمكن الحصول على خزعة للفحص النسيجي نظراً لصعوبة التداخل الجراحي على هذه المنطقة لذلك العلاج الوحيد هو العلاج الشعاعي ولكن لسوء الحظ فإن معدل الحياة اوسطي ١٥ شهر و ٢٠٪ من المرضى يعيشون لـ ٥ سنوات .

المعالجة الكيميائية :

بمجموعة قليلة من الأدوية إستخدمت في علاج أورام جذع الدماغ وكل الدراسات تشمل على عدد قليل من المرضى والمشكلة الأخرى هي نقص المعلومات عن النوع النسيجي لهذه الأورام في معظم هذه الدراسات .

المعالجة الكيميائية للأورام الناكسة لم تكن فعالة وإعتماداً على مراجعة العالمين Friedman و Oades الذين أشارا إلى أن الأدوية التالية المستخدمة لم تعطي فائدة كبرى وهذه الأدوية هي BCNU - CCNU - سيسبلاتين - سيكلوفوسفاميد والميثوتركسات ( حقناً داخل السيساء وجرعة منخفضة داخل الوريد ) - بروكاربازين وكذلك المشاركة COPP كما جرب إستخدام الكاربوبلاتين carboplatin كدواء وحيد ولكن دون نجاح .

وأكثر الدراسات الواعدة هي إستخدام السيكلوفوسفاميد بجرعات عالية وكذلك الجرعات العالية من الميثوتركسات ويمكن القول أنه حتى هذا الوقت لا يوجد أي فائدة من المعالجة الكيميائية بالنسبة لأورام جذع الدماغ الدبقية .

### ب. ميديوبلاستوما Medulloblastoma :

وهو من أشيع أورام الدماغ عند الأطفال ويمكن حدوثه بشكل نادر عند الكبار معظم التوضعات هي في اخفرة الخلفية posterior Fossa ولها ميل كبير للإنتشار عن

طريق السائل الدماغي الشوكي كما يمكن حدوث النقائل خارج الجهاز العصبي ومعدل ٥٪ وهذا لا يشاهد بباقي أورام الدماغ .

المعالجة هي الجراحة كخطوة أولى وهناك تناسب ما بين امتداد الاستئصال الجراحي وما بين معدل الحياة ولكن للأسف فإن معظم المرضى المعالجين بالجراحة فقط تعرضوا للنكس مهما كان درجة استئصال الورم وإن الزيادة في معدل الحياة في معظم الحالات كان نتيجة للمعالجة الشعاعية .

المعالجة الشعاعية تكون بمعالجة كامل المحور العصبي cranio spinal axis بجرعة تتراوح ما بين ٢٥٠٠ - ٣٥٠٠ راد ( سنتي غري ) ثم تعطى جرعة داعمة Boosting Dose للحفرة الخلفية حتى تصبح الجرعة ٥٠٠٠ - ٥٥٠٠ راد أما الأماكن في الجهاز العصبي المصابة بالنقائل فإنها تعالج حتى ٤٠٠٠ راد .

معدل الحياة لـ ٥ سنوات عند المرضى المعالجين بالأشعة يتراوح ما بين ٥٠ - ٦٠٪ .

المعالجة الكيميائية Chemo therapy :

في المعالجات الحديثة لاتلعب المعالجة الكيميائية دوراً هاماً في علاج الميديولوبلاستوما وهناك عدة أدوية إستخدمت في التجارب السريرية وأكثر هذه الأدوية فعالية هي سيكلوفوسفاميد - فنكرستين - سيسبلاتين - وكاربوبلاتين وهناك عدة مشاركات دوائية أكثرها تأثيراً هي CCNU + بروكاربازين + فنكرستين + ara-c + + هيدروكسي يوريا + سيسبلاتين + DTIC + ميثيل بريدنيزولون ( ثمانية في واحد Eight in one كما تم تقييم المعالجة المتممة في العديد من الدراسات السريرية وبعضها أثبت أن هناك بعض الفائدة من حيث معدل الحياة .

جـ - الأورام الدبقية قليلة الخبث ( ورم الخلايا النجمية المخيخي - أورام التصالب البصري الدبقية ) ،

تشكل الأورام النجمية المخيخية عند الأطفال حوالي ١٠٪ من الأورام البدئية في الدماغ والجراحة هي العلاج الأساسي وعند كون الورم جيد التمييز فإن معدل الحياة الوسطي أكثر من ١٨ سنة ودور المعالجة الشعاعية لا يزال غير واضح أما في حال

الإستصال غير التام للورم أو عند ميل الورم للنمو السريع فإنه عادة ماتسطب المعالجة الشعاعية بعد العمل الجراحي على الرغم من عدم ملاحظة أي فائدة محددة وواضحة .  
الورم الدبقي للتصالب لبصري وتحت المهاد يحدث عادة عند الأطفال الصغار ما بين ٦ أشهر و ٣ سنوات ، الإستصال الجراحي مفيد ولكن عادة مايصعب الإستصال التام وعادة ماتؤدي المعالجة الشعاعية إلى إستقرار الورم ولكن النكس شائع الحدوث وبنسبة ٥٠% .

#### المعالجة الكيميائية Chemotherapy :

إستخدمت المعالجة الكيميائية عند عدد قليل من الأطفال المصابين بالأورام النجمية المخيخية في حالة النكس ولكن نظراً للعدد القليل فإنه يصعب تقييم النتائج .  
إستخدمت عدة أدوية منها BCNU - CCNU - VP16 ، كما استخدمت المشاركات BCNU + بروكاربازين و BCNU + فنكرستين + ميثوتركسات + بريدنيزون ونظراً للإلتذار الجيد فلم تُجدي أي محاولة لإعطاء المعالجة الكيميائية المتممة بالنسبة لورم التصالب البصري الدبقي والأورام الدبقية تحت المهاد Hypothalamus فقد إستخدمت الأدوية التالية CCNU + فنكرستين أو CCNU + فنكرستين + بروكاربازين ، كما استخدم السيسبلاتين في معالجة الأورام الناكسة وقد سجلت بعض حالات الإستجابة .

#### د. أورام فوق الخيمة الدبقية عالية الخبت Supratentorial High Grade Glioma :

المعالجة الأساسية هي بالجراحة ثم المعالجة الشعاعية ولكن معظم الحالات تنكس ومعدل الحياة الوسطي هو ١٥ شهر بعد المعالجة الجراحية والشعاعية .  
المعالجة الكيميائية :

ولها دور في معالجة الأورام عند الأطفال والأدوية المستخدمة هي التي أثبتت فعالية واضحة مثل مركبات النتروسويوريا nitrosourea . أما باقي الأدوية لم يكن لها أي فائدة مثل سيسبلاتين - كاربوبلاتين MOPP - COPP - فنكرستين + CCNU

والمشاركة المعروفة باسم ثمانية في واحد Eight in one .

المعالجة الكيميائية المتبعة أثبتت عدة دراسات على فعاليتها في إطالة معدل الحياة وإستخدم الـ CCNU + الـ فنكرستين بعد العلاج الجراحي والشعاعي ومعدل الحياة لـ ٥ سنوات في المجموعة المعالجة كيميائياً ٤٢٪ مقابل ١٠٪ في المجموعة غير المعالجة .

**أورام الخلايا المولدة في الجهاز العصبي المركزي C.N.S. Germ cell Tumors :**

يمكن أن نقسم أورام الحفرة الصنوبرية إلى أورام الخلايا المولدة Germ cell Tumors

وأورام غير المولدة non Germ cell Tumors :

أورام الخلايا المولدة تشمل Germinoma - السرطانة الجنينية Embryonal carcinoma -

المسخوم Tertoma - السرطانة المشيمية chorio carcinoma و Endodermal Sinus Tumor .

أما المجموعة الثانية تشمل ورم الغدة الصنوبرية pincaloma والأورام البدئية الأخرى للجهاز العصبي المركزي .

المعالجة الأساسية هي المعالجة الشعاعية مع معدل حياة لـ ٥ سنوات يتراوح ما بين ٦٠ - ٩٠٪ .

**المعالجة الكيميائية :**

تستجيب أورام الخلايا المولدة للعديد من المشاركات الكيميائية منها

السيكلوفوسفاميد + سيسبلائين أو سيكلوفوسفاميد + أكيثومايسين D أو فنكرستين

+ بليومايسين + VP16 ( Etoposids ) .

# سرطان الرأس والعنق

## Head and Neck Cancers

تشكل ٥٪ من جميع سرطانات الجسم ٣/١ الحالات تشخص بمراحل مبكرة و ٣/٢ الحالات تشخص بمراحل موضعية وناحية متقدمة Advanced locoregional أما النقائل البعيدة فتشاهد في ٢٠٪ من الحالات معظم أورام الرأس والعنق من نوع سرطانية شائكة الخلايا ولذلك سوف نتحدث في هذا القسم عن المعالجة الكيميائية لهذا النوع .

إن هذه السرطانات عادة ماترافق بالتدخين المزمن والكحولية مما يؤدي لوجود بعض الإضطرابات الرئوية والقلبية التي تعتبر مشكلة أخرى للطبيب المعالج . تمتلك بعض أورام المواضع التشريحية خصائص وسلوك خاصين مثل سرطان الحنجرة له إنذار أفضل من سرطان الجيب الإحاضي .

### المعالجة الأساسية ( النظامية ) Stand arnd therapy :

المعالجة الأساسية تعتمد على الجراحة والمعالجة الشعاعية وهذا يتناسب مع السير الطبيعي للورم Natural History حيث تمثل هذه السرطانات لتظاهر موضعياً أو ناحياً في البداية مع معدل منخفض للنقائل البعيدة Distant Metastases لذلك كانت المعالجة الموضعية هي المناسبة لإحداث الهجوم أو لإعطاء التأثير الملطف.

المراحل المبكرة T<sub>1</sub>,T<sub>2</sub> NOMO تعالج بقصد الشفاء باستخدام غط واحد من المعالجة الموضعية الجراحة أو المعالجة الشعاعية Radiotherapy والإختيار الدقيق لنمط المعالجة يعتمد على خبرة الطبيب وعلى حالة المريض العامة وعلى الموقع التشريحي للورم فمثلاً الآفات الصغيرة للسان يمكن أن تعالج بشكل فعال بالإستئصال الموضعي وبالتالي نتجنب المعالجة الشعاعية التي تستهلك وقتاً طويلاً مع مايرافقها من آثار جانبية مزعجة ( التهاب المخاطية الشعاعي فقدان الذوق - جفاف الفم Xerostomia ) في المقابل فإن

الآفات الصغيرة في الحنجرة يفضل أن تعالج شعاعياً وذلك للحفاظ على الحنجرة .  
- في الأورام المتقدمة Advanced Tumors (  $T_3 - T_4 - N_1 - N_3M_0$  ) فإن العلاج يتألف من الجراحة أولاً ثم يُتبع بالمعالجة الشعاعية Postoperative Radiotherapy ويكون الهدف هو الشفاء ولكن عادة ماتكون نسبة الشفاء ضئيلة ويمكن القول بشكل عام أنه أقل من ٣٠٪ من المرضى يعيشون لمدة ٥ سنوات وأكثر وأسباب الوفاة عند هؤلاء المرضى هو تقدم المرضى موضعياً ونسبة قليلة من المرضى تعرضوا للإصابة بالنقائل البعيدة خاصة للرئة - العظام والكبد كما أن جميع المرضى المصابين بسرطان الرأس والعنق لديهم خطورة الإصابة بورم خبيث ثاني Second Malignancy ( الرئة - المري ) التي تشترك بنفس العوامل المسببة .

تلعب المعالجة الكيميائية دوراً بسيطاً في المعالجة النظامية لسرطانات الرأس والعنق والإستطباب هو وجود نقائل بعيدة أو عند حدوث النكس التالي للمعالجة - الموضعية شعاعية أو جراحية وتكون الغاية من المعالجة هي التلطيف وحتى هذا الوقت لم يثبت تأثير هذه المعالجة على تحسين معدل الحياة وسوف نستعرض فيما يلي العناصر الدوائية الفعالة والمشاركات الدوائية فيما بينها .

#### العناصر الدوائية الفعالة عند إستخدامها كدواء وحيد Single agent :

- الميثوتركسات Methotrexate : هو الدواء الأكثر إستخداماً ويعتبر المقياس الدوائي لمعايرة فعالية الأدوية الجديدة وعند إعطائه بجرعته الإعتيادية فإن معدل الإستجابة يصل حتى ٣٠٪ ولفترة تتراوح ما بين ٢ - ٤ أشهر ويعطى بجرعة أسبوعية تبدأ بـ ٤٠ - ٥٠ مغ / ٢م وتزداد تدريجياً بمقدار أسبوعي ١٠ مغ / ٢م حتى حدوث السمية من الدرجة الأولى أو الثانية وأكثر الإختلاطات التي تحدث من الجرعة هي التهاب الأغشية المخاطية وتثبط نقي العظم ثم جرت محاولات لزيادة تأثير الميثوتركسات وذلك بزيادة الجرعة وإعطاء اللوكوفورين Leucovorin ولكن عدة دراسات سريرية لم تثبت أي زيادة في معدل الإستجابة بالمقارنة مع الجرعة الإعتيادية كما أن الآثار الجانبية من جهة أخرى

تكون شديدة عند إعطاء الجرعة العالية ولذلك تبقى الطريقة الإعتيادية هي الطريقة القياسية بالنسبة لسرطانات الرأس والعنق .

- السيسبلاتين Cisplatin : يعتبر دواء قياسي آخر ومعدل الإستجابة يصل حتى ٣٠٪ وهناك بعض الحالات النادرة التي تكون الإستجابة فيها كاملة **complete Response** . أكثر الأعراض الجانبية شيوعاً هي الغثيان والإقياء والسمية الكلوية والعصبية وكذلك السمية على العصب السمعي أما الجرعة تتراوح ما بين ٦٠ - ١٢٠ مغ / ٢م كل ٣ - ٤ أسابيع .

بعض التجارب السريرية إستخدمت جرعة عالية هي ٤٠ - ٥٠ مغ / ٢م يومياً  $5 \times$  أيام بجرعة كلية لا تتجاوز ٢٠٠ مغ / ٢م وقد أظهرت هذه الطريقة معدل إستجابة يتراوح ما بين ٤٦ إلى ٧٣٪ . ولوحظ في هذه الدراسة أن درجة تثبيط نقي العظم أكثر من الطريقة الإعتيادية وكذلك السمية على العصب السمعي والأعصاب المحيطة . - كاربوبلاتين Carboplatin : وهو دواء مشابه للسيسبلاتين ولكن أقل سمية على الكلية وأقل إحداثاً للإقياء من السيسبلاتين ويمكن إعطائه بطريقة سهلة دون الحاجة لإدخال المريض المشفى وله تأثير على سرطانات الرأس والعنق ولايزال مجهولاً هل هذا التأثير مماثل لتأثير السيسبلاتين عند إعطائه بجرعته النظامية ويمكن أن نقول بإختصار أن السيسبلاتين والميثوتركسات لهما نفس الفعالية ويمكن أن نعتبرهما العنصرين القياسيين .

هناك أدوية أخرى لها فعالية في سرطانات الرأس والعنق من هذه الأدوية الفلورويوراسيل الذي يبدو أن إعطائه دفعة واحدة يمكن أن يقلل من تأثيره بينما عند إعطائه بتثريب وريدي مستمر لمدة ٥ أيام كل ٣ أسابيع يمكن أن يكون تأثيره أكبر إلا أن إثبات ذلك يحتاج لمزيد من الدراسات السريرية .

- البليومايسين : يعطى معدل إستجابة يصل حتى ٢٠٪ ويمكن إستخدامه بمعظم المشاركات الدوائية ومن الأدوية الأخرى السيكلوفوسفاميد - والهيدروكسي يوريا -

الأدرياميسين والميتومايسين Mitomycin c .

### المشاركات الدوائية :

إن محاولة زيادة فعالية المعالجة باستخدام المشاركات ما بين الأدوية لم تلاقي نجاحاً ملحوظاً في حالات النكس أو النقائل وأكثر الدراسات السريرية إستخدمت المشاركة ما بين السيسبلائين والميثوتركسات الدوائين الأكثر فعالية وأحياناً يشاركان مع البليومايسين الذي يمتلك سمية مختلفة مما يجعله مناسباً للمشاركة مع أدوية أخرى وهناك دراسة أخرى تقارن ما بين المشاركة فيما بين الميثوتركسات + بليومايسين + هيدروكسي يوريا والمشاركة ما بين تلك الأدوية مع السيسبلائين فوجد أنه المشاركة الحاقية على السيسبلائين أكثر فعالية والمشاركة الراجعة هي المشاركة ما بين السيسبلائين والفلورويوراسيل بشرب وريدي لمدة ٥ أيام ويجري حديثاً اختبار إضافة اللوكوفورين Leucovorin لهذه المشاركة .

### المعالجة الكيميائية الشعاعية المتلازمة Concomitant Chemo Radio therapy :

إن البديل لإعطاء المعالجة الكيميائية بعد إنتهاء العلاج الشعاعي الموضعي هي إستخدام المعالجة الشعاعية الكيميائية بشكل متلازم وأسس إستخدام هذه الطريقة هي:

- ١ - إن التأثير المضاد للورم للأشعة يمكن أن يزداد بإستخدام المعالجة الكيميائية أثناء العلاج الشعاعي حيث قد تعمل هذه الأدوية على زيادة حساسية الخلايا للأشعة (Radiosen Sitisers) إلا أن هذه الطريقة قد تزيد من إرتكاس النسيج السليمة مثل زيادة التهاب الأغشية المخاطية .

- ٢ - إن الفعالية الجهازية للمعالجة الكيميائية يمكن أن تؤدي لإزالة النقائل المجهرية البعيدة Micro metastases الواقعة خارج ساحة المعالجة الشعاعية وبالتالي يمكن أن تزيد من معدل الحياة .



إن المعالجة الكيميائية الشعاعية المتلازمة يمكن أن تزيد من السيطرة الموضعية على الورم كما أنها يمكن أن تعالج النقائل البعيدة التي قد تكون موجودة عند وضع التشخيص .

يمكن إستخدام عدة أدوية كيميائية في هذه المعالجة منها ميثوتركسات — بليومايسين — فلورويوراسيل — هيدروكسي يوريا — سيسبلائين — كاربوبلاتين — والميتومايسين - C . Mitomycin

## المعالجة الكيميائية لسرطان الرئة Chemo therapy of Lung Cancer

### ١ - المعالجة الكيميائية لسرطان الرئة صغير الخلايا ( SCLC ) Small cell Lung Cancer

يشكل سرطان الرئة صغير الخلايا ٢٥٪ من سرطانات الرئة المختلفة ويتميز بنموه السريع وانتشاره المبكر كما يتميز بحساسيته للمعالجة الشعاعية والكيميائية ويجب أن يعتبر سرطان الرئة صغير الخلايا مرضاً جهازياً عند وضع التشخيص بغض النظر عن القدرة على إثبات وجود النقائل البعيدة لذلك فإن المعالجة الكيميائية هي حجر الأساس في تدبيره بغض النظر عن مرحلته السريرية.

التصنيف الإعتيادي Conventional Staging لهذا السرطان يقسم المرض إلى مرحلتين : مرحلة المرض المحدود ( L D ) Limited Discase ) ويكون المرض محدوداً في نصف الصدر himithorax ويشمل أي نقائل عقدية منصفية والنقائل للعقد فوق الترقوة في جهة الإصابة وفي الجهة المقابلة .

٢ - مرحلة المرض المنتشر ( E . D ) Extensive Disease ) ويشمل أي توضع للمرض غير المرحلة المحدودة L . D .

أما إنباب الجنب فلا يزال يثير الجدل حول التصنيف .

عند وضع التشخيص فإن ٣٠ - ٤٠٪ من الحالات تكون في المرحلة المحدودة L.D وباقي الحالات في المرحلة المنتشرة ED أما عوامل الإنذار فيأتي في مقدمتها الحالة العامة للمريض ووجود وموقع النقائل البعيدة فمثلاً النقائل الكبدية ونقائل الجهاز العصبي المركزي تترافق بمعدل حياة قصير بينما نقائل العظم والأنسجة الرخوة لها تأثير بسيط على معدل الحياة ومن عوامل الإنذار الأخرى مرحلة المرض - فقدان الوزن قبل المعالجة الكيميائية والجنس والعمر .

إن معدل الحياة الوسطي مع المعالجة الكيميائية يتراوح ما بين ١٠ - ١٢ شهر و ٥  
- ١٠٪ من المرضى يعيشون لستين ومعدل الإستجابة أعلى عند كون الورم في  
المرحلة المحدودة .

#### المعالجة الكيميائية بدواء وحيد Single agent Chemotherapy :

- السيكلوفوسفاميد Cyclophosphamide أول دواء أثبت فعالية أساسية في معالجة  
سرطان الرئة صغير الخلايا وعند إعطائه بجرعة ٥٠٠ - ١٢٠٠ مغ / ٢م كل ٣ - ٤  
أسابيع فإن معدل الإستجابة الكلي يصل ٤٠٪ ومعظم الحالات كانت إستجابة جزئية  
partial Response كما لوحظ تحسن في معدل الحياة الوسطي .

- الكارموستين ( BCNU ) و carmustine واللوموستين ( CCNU ) Lomustine يعتبران من  
الأدوية الفعالة عند إستخدامها كدواء وحيد ومعدل إستجابة ٢٠ - ٣٠٪ .

- العناصر المقلونة alkylating agents الأخرى مثل الميلفالن Melphalan و كلور  
امبيوسيل Chlorambucil و بيسلفان Busulfan - ثيوتيا thiotepa - والخردل الآزوتي كلها  
إستخدمت كدواء وحيد .

- الايتوبوسيد Etoposide ( VP16 ) يعتبر أكثر الأدوية فعالية كدواء وحيد Single  
agent ومعدل الإستجابة الكلي يتراوح ما بين ٥٠ و ٦٠٪ عند المرضى غير المعالجين  
سابقاً أما عند إستخدامه عند المرضى المعالجين سابقاً فإن فعاليته محدودة كما يتأثر  
معدل الإستجابة بطريقة إعطاء الدواء فعند إعطائه على مدى ٥ أيام يكون معدل  
الإستجابة أعلى من إعطائه بجرعة واحدة كبيرة .

- التينيبوسيد tiniposide ( VM26 ) من الأدوية الفعالة وجرعته ٦٠ مغ / ٢م / يومياً  
ولمدة ٥ أيام وعند المرضى غير المعالجين سابقاً يصل معدل الإستجابة الكلي لـ ٩٠٪  
( ٣٠٪ إستجابة تامة وفترة ) الإستجابة الوسطية هي ٨ أشهر ومن الأدوية الفعالة  
نذكر السيسبلاطين - أدرياميسين - ميثوتركسات - البروكاربازين ومجموعة الـ Vinka  
alkaloids .

الدواء المشتق من السيسبلاتين carboplatin ويتميز بسمية أقل على الأعصاب والكلية له فعالية عند إستخدامه كدواء وحيد بجرعة ٣٠٠ - ٤٥٠ - مغ / ٢م شهرياً وبمعدل إستجابة كلي يصل حتى ٨٠٪ ( ٥٠ - ٨٠ ) .

وكذلك الدواء المشابه للسيكلوفوسفاميد ifosfamide ويتميز بأن تأثيره المبطل على نقي العظم أقل إذا أعطي بجرعة ١,٥ - ٢ مغ / ٢م يتوافق بمعدل إستجابة يتراوح ما بين ٥٠ - ٨٠٪ .

#### المعالجة الكيميائية بالمشاركة الدوائية Combination Chemotherapy :

أول المشاركات الدوائية في معالجة سرطان الرئة صغير الخلايا كانت في أواسط السبعينات من هذا القرن ولقد كان لها تأثيراً واضحاً بمعدل إستجابة كلي يتراوح ما بين ٧٠ - ٩٠٪ وإستجابة تامة ٢٥ - ٥٠٪ ولقد أثبتت جميع الدراسات على أفضلية المشاركة الدوائية أكثر من إعطاء دواء وحيد وأكثر المشاركات شيوعاً هي النظام العلاجي CAV سيكلوفوسفاميد + أدرياميسين + فنكرستين وتعتبر المشاركة القياسية التي تعابر بها فعالية المشاركات الأخرى .

الجدول التالي يبين المشاركات الحاوية على الأدرياميسين المستخدمة في علاج سرطان الرئة صغير الخلايا :

C	Cyclophosphamide	1000 mg/m <sup>2</sup>	Day 1	Repeat every 3 weeks
A	Adriamycin ( doxorubicin )	50 mg/m <sup>2</sup>	Day 1	
V	Vincristine	1 mg/m <sup>2</sup>	Day 1	
C	Cyclophosphamide	1000 mg/m <sup>2</sup>	Day 1	Repeat every 3 weeks
A	Adriamycin	45 mg/m <sup>2</sup>	Day 1	
E	Etoposide ( VP - 16 )	50 mg/m <sup>2</sup>	Day 1 - 5	
V	Vincristine	1.4 mg/m <sup>2</sup>	Day 1	Repeat every 3 weeks
A	Adriamycin	60 mg/m <sup>2</sup>	Day 1	
P	Procarbazine	100 mg/m <sup>2</sup>	Day 1 - 10	
M	Methotrexate	30 mg/m <sup>2</sup>	Day 1	Repeat every 3 weeks
A	Adriamycin	40 mg/m <sup>2</sup>	Day 1	
C	Cyclophosphamide	400 mg/m <sup>2</sup>	Day 1	
C	CCNU	30 mg/m <sup>2</sup>	Day 1	

ومن المشاركات الأخرى النظام العلاجي CMC سيكلوفوسفاميد + ميثوتركسات + CCNU - النظام CAE المكون من السيكلوفوسفاميد + أدرياميسين + Etoposide : وهو المشاركة الأكثر اختصاراً في الدراسات المختلفة حيث تم تحقيق ٦٥٪ من حالات الاستجابة التامة CR في حالة المرض المحدود LD و ٤٣٪ في المرض المنتشر ED ومعدل الحياة الوسطي يتراوح ما بين ٩ - ١٥ شهر .

ومن المشاركات الحاوية على الأدرياميسين نذكر أيضاً VAP ( فنكستين + أدرياميسين + بروكاربازين و MACC ( ميثوتركسات + أدرياميسين + سيكلوفوسفاميد + CCNU ولقد جرى دراسة إضافة الايتوبوسيد Etoposide : للمشاركة CAV ولقد تبين أن هذه الإضافة ترفع من معدل الاستجابة الكلي كما تزيد من عدد حالات الاستجابة التامة complete Rrsponse أما الأنظمة العلاجية غير الحاوية على الأدرياميسين يبينها الجدول التالي :

P	Cisplatin	25 mg/m <sup>2</sup>	Day 1 - 3	Repeat every 3 weeks
E	Etoposide	100 mg/m <sup>2</sup>	Day 1 - 3	
J	Carboplatin ( CBDCA )	100 mg/m <sup>2</sup>	Day 1 - 3	Repeat every 4 weeks
E	Etoposide	125 mg/m <sup>2</sup>	Day 1 - 3	
I	Ifosfamide	1.5 mg/m <sup>2</sup>	Day 1 - 5	Repeat every 4 weeks
E	Etoposide	120 mg/m <sup>2</sup>	Day 3 - 5	
C	Cyclophosphamide	500 mg/m <sup>2</sup>	Day 1	Repeat every 3 weeks
M	Methotrexate	10 mg/m <sup>2</sup>	Twice Weekly	
C	CCNU	50 mg/m <sup>2</sup>	Day 1	

فالمشاركة ما بين السيسبلاتين والايثوبوسيد Etoposide ( PE ) هي من المشاركات الشائعة التي تستخدم عند المرضى المعرضين للنكس أو كمعالجة تكتيف Consolidation وعادة ما يكون الإنذار في حالة النكس سيء للغاية ويتوافق بمعدل حياة وسطي من ٢ - ٣ اشهر وقبل الثمانينات من هذا القرن كانت المعالجات الإنقاذية Salvage therapy تتوافق بمعدل إستجابة لايزيد على ٢٠٪ أما عند إستخدام النظام PE فإنه لوحظ معدل إستجابة كلي يصل حتى ٥٥٪ عند المرضى المعرضين للنكس بعض الدراسات

الأخرى إستخدمت الـ PE كمعالجة لإحداث الهجوع ويتراوح معدل الإستجابة الكلي ما بين ٧١ و ٩٤٪ ومعدل الإستجابة التامة CR ٣٠ - ٥٣٪ أما معدل الحياة الوسطي فيتراوح ما بين ٦٣ - ٧٠ شهر في حالة المرض المرحل LD و٣٩ أسبوع في المرض المنتشر ED .

الكاربوبلاتين له فعالية مشابهة للسيسلاتين ولكن بأقل سمية ويمكن إستخدامه مشاركة مع الايتوبوسيد ( الكاربوبلاتين ١٠٠ مغ / ٢م يومياً لمدة ٣ أيام وVP16 ١٢٠ مغ / ٢م يومياً مع المشاركة الأخرى لمدة ٣ أيام ) .

الإفوسفاميد Ifosfamidc مع الايتوبوسيد IE حيث يعطى الإفوسفاميد بجرعة ٥ غ / ٢م مع الميزنا Mesna و VP16 ١٢٠ مغ / ٢م يوم ١ و ٢ ويريدى ثم ٢٤٠ مغ / ٢م عن طريق الفم في اليوم الثالث يكرر كل ٦ أسابيع .

#### المعالجة الكيميائية والمعالجة الشعاعية في المرض المرحل L . D :

إن التقدم الكبير في معالجة سرطان الرئة صغير الخلايا حصل في معالجة المرض المحدود ومن المعروف أن أكثر حالات النكس تحدث في الرئة ولذلك فإن مشاركة المعالجة الشعاعية مع المعالجة الكيميائية كثيراً ما تستخدم والتجارب السريرية الأولى استخدمت طريقة الـ Sandwich حيث تعطى المعالجة الكيميائية قبل وبعد المعالجة الشعاعية أما التجارب الحديثة فإنها تعابير فعالية استخدام المعالجة الشعاعية والمعالجة الكيميائية بشكل متلازم أو متعاقب ومعظم التجارب السريرية أثبتت على أن نتائج المشاركة ما بين المعالجين أفضل من إعطاء المعالجة الكيميائية لوحدها ولكن لم يلاحظ أي تأثير على معدل الحياة الوسطى .

#### الجديد في معالجة سرطان الرئة صغير الخلايا :

لم يحدث تطور أساسي أو كبير في معالجة سرطان الرئة صغير الخلايا منذ ادخال المشاركة الدوائية في السبعينات ولكن هناك مسائل يجب أن تلاهي الحل المناسب مثل المقاومة الدوائية - النمو السريع للورم وانتشاره المبكر وهذا أدى إلى بعض الأساليب

الحديثة التي تحاول التغلب على هذه المشاكل منها المشاركة ما بين المعالجة الكيميائية والشعاعية حيث تبدأ المعالجة بتصغير حجم الورم والنقائل بالمعالجة الكيميائية ثم تتبع بالمعالجة الشعاعية وكذلك هناك بعض الأساليب العلاجية التي تستخدم الأضداد وحيدة النسيلة Monoclonal antibodies الموجهة ضد الخلية الورمية أو إستخدام عوامل النمو الدموية للتغلب على تثبيط نقي العظم الناجم عن المعالجة الكيميائية .

إن عملية التخثر بما فيها تشكل الفيبرين قد تكون إحدى آليات حدوث النقائل ولذلك كانت هناك عدة تجارب تستخدم مضادات التخثر كالوارفارين Warfarin مع المعالجة الكيميائية وبعض هذه التجارب أثبتت أنها تزيد من معدل الحياة وأخيراً فإنه يمكن إستخدام بعض المحسسات Sinsitizers مثل الفيرباميل الذي يعقد عليه الآمال بأن يحقق النتائج المفضلة في التسعينات من هذا القرن .

## ٢ - المعالجة الكيميائية لسرطان الرئة غير صغير الخلايا :

إن دور المعالجة الكيميائية في سرطان الرئة غير صغير الخلايا ضعيف بالمقارنة مع تأثير هذه المعالجة على سرطان الرئة صغير الخلايا ويمكن أن نقول أنها تستخدم في حالة الأورام الموضعية كمعالجة متممة للجراحة أو المعالجة الشعاعية أما في معالجة الحالات المنتشرة فإنها أقل نجاحاً ويمكن أن نقول إنه ليس هناك نظام علاجي قياسي .

التصنيف Staging ، T الورم البلغي

T1 : الورم بقطر أقل من ٣سم محاط بالرئة أو بالوريقة الحشوية للجنب ولا يوجد أي دليل بالتنظير على إصابة القصبة الفصية أو الرئيسية .

T2 : الورم بقطر أكبر من ٣سم يغزو الوريقة الحشوية للجنب أو يسبب انخماص أو ذات رئة انسدادية ولكن لا تشمل كل الرئة والورم ٢سم أو أبعد من المهماز Carina .

T3 : الورم بأي حجم ولكن يحتاج جدار الصدر - الحجاب الحاجز - التامور ويترافق بانخماص كامل الرئة أو الورم أقل من ٢سم من المهماز .

N - العقد الناحية Regional Lymph Nodes :

NO : لا يوجد إصابة للعقد الناحية .

N1 : إصابة العقد حول القصبة في جهة الإصابة أو إصابة العقد في سرة الرئة في نفس جهة الإصابة .

N2 : إصابة العقد المنصفية في جهة الإصابة أو إصابة العقد تحت المهماز Subcarinal . Nodes

N3 : إصابة العقد المنصفية في الجهة المقابلة أو إصابة العقد في سرة الرئة في الجهة المقابلة أو إصابة عقد فوق الترقوة .

Stage I	$T_1 N_0 M_0$ $T_2 N_0 M_0$
Stage II	$T_1 N_1 M_0$ $T_2 N_1 M_0$
Stage IIIA	$T_1 N_2 M_0$ $T_2 N_2 M_0$
Stage IIIB	$T_3 N_{0-2} M_0$ $T_{any} N_3 M_0$
Stage IV	$T_4 N_{any} M_0$ $T_{any} N_{any} M_1$

جدول رقم ٥ يبين التصنيف السريري لسرطان الرئة غير صغير الخلايا

المعالجة الكيميائية المتممة بعد العمل الجراحي Post operative adjuvant chemo

: therapy

المرحلة السريرية الأولى st I والثانية st II والثالثة هي المراحل المرشحة للعمل الجراحي ولكن معدل الحياة الوسطي لمرضى المرحلة الثانية أقل من ٢ سنة وللمرحلة الثالثة أقل من سنة ولذلك تم إدخال المعالجة الكيميائية المتممة لهذين المرحلتين كمحاولة لتحسين معدل الحياة . عدة تجارب سريرية إستخدمت دواء وحيد كمعالجة متممة ولم يلاحظ أي تأثير على معدل الحياة وأكثر الأدوية إستخداماً في هذه



التجارب هي الخردل الآزوتي nitrogen mustard - السيكلوفوسفاميد - CCNU و Busulfan . الدراسات الحديثة إستخدمت المشاركة الدوائية CAP كمعالجة متممة للمرحلة T<sub>2</sub>N<sub>1</sub>M<sub>0</sub> والمرحلة الثالثة ، سيكلوفوسفاميد ٤٠٠ مغ / ٢م + أدرياميسين ٤٠ مغ / ٢م وريدي + سيسبلاتين ٤٠ مغ / ٢م تعطى شهرياً ولوحظ أن هناك زيادة في معدل الحياة الوسطي أما إستخدام المعالجة المتممة في المرحلة T<sub>2</sub> N<sub>0</sub> فلم يلاحظ أي تأثير على معدل الحياة في هذه الحالة .

#### المعالجة الشعاعية والمعالجة الكيميائية Radiotherapy and chemo therapy :

باعتبار أن المعالجة الشعاعية غير قادرة على قتل كل الخلايا الورمية فإن إضافة المعالجة الكيميائية لا يمكن إعتبارها معالجة متممة حقيقية ولكن هناك عدة دراسات إستخدمت المعالجة الكيميائية بعد إعطاء المعالجة الشعاعية الجذرية ( بقصد الشفاء ) منها إستخدام دواء وحيد مثل ( سيكلوفوسفاميد - 5 - Fu - فنبلاستين والخردل الآزوتي nitrogen mustard : ولم يلاحظ أي تأثير على معدل الحياة بالمقارنة مع المرضى المعالجين بالأشعة فقط وهناك عدة تجارب سريرية حديثة إستخدمت المشاركة الدوائية بعد إعطاء ٤٥ غري خلال ٣ أسابيع وهذه المشاركة هي CAMP سيكلوفوسفاميد ٣٠٠ مغ / ٢م + أدرياميسين ٢٠ مغ / ٢م + ميتوتركسات ١٥ مغ / ٢م جميع ماسبق يعطى في اليوم الأول والثامن + البروكاربازين ١٠٠ مغ / ٢م عن طريق الفم من اليوم الأول حتى العاشر يكرر هذا النظام العلاجي كل ٤ أسابيع لـ ١٢ جرعة ولم يلاحظ أي تأثير واضح على معدل الحياة وفي دراسة أخرى تم إستخدام النظام العلاجي CAP مع المعالجة الشعاعية ولم يلاحظ أي تأثير على معدل الحياة الوسطي .

#### المعالجة المتممة الحديثة Neoadjuvant chemotherapy :

إن الإستجابة للمعالجة الكيميائية في سرطان الرئة غير صغير لخلايا NSCLC عندما يكون موضعاً في الصدر أكثر مما لو كان منتشرأً لخارج الصدر نتيجة لهذه الملاحظة فإنه تم إستخدام المعالجة الكيميائية قبل العمل الجراحي ( المعالجة المتممة

الحديثة ) ولقد أثبتت الدراسات على معدل الإستجابة العالي وعلى إمكانية تحول الورم غير القابل للإستئصال إلى ورم قابل للإستئصال الجراحي ولكن هناك عدة أسئلة يجب الإجابة عليها منها المعالجة الكيميائية المثالية والوقت المناسب للعمل الجراحي .  
تم أيضاً إعطاء المعالجة الكيميائية قبل المعالجة الشعاعية في الأورام المتقدمة موضعياً Locally Advanced Tumors ولوحظ أن هناك زيادة في معدل الحياة في بعض الدراسات عند إضافة المعالجة الكيميائية للمعالجة الشعاعية .

#### المعالجة الكيميائية للحالات المنتشرة ( NSCLC ) chemo therapy for disseminated :

إن قدرة المعالجة الكيميائية على تحسين معدل الحياة في أورام الرئة غير صغير الخلايا المنتشرة لم يكن مؤكداً حتى الآن ولذلك يجب أن يتم اختيار المرضى الذين يتوقع أن يستجيبوا للمعالجة الكيميائية وهناك العديد من عوامل الإنذار التي يمكن بموجبها اختيار المرضى منها الحالة العامة الحسنة - الإناث - حالات نقص الوزن أقل من ٥% . كلها يمكن أن تترافق بنتائج معالجة أفضل أما وجود النقائل البعيدة التي تصيب العظم والكبد والنسيج تحت الجلد وكذلك ارتفاع الـ L . D . H . كلها تترافق بسوء الإنذار ونتائج غير مفضلة للمعالجة الكيميائية .

#### - المعالجة الكيميائية بدواء وحيد Single - agent chemotherapy

لا يوجد دواء حتى الآن يمكن أن يعطي معدل إستجابة كلي أكثر من ٣٠% في أورام الرئة غير صغيرة الخلايا NSCLC والإستجابة عادة ماتكون لفترة قصيرة والإستجابة التامة نادرة وينخفض معدل الإستجابة عند المرضى المعالجين كيميائياً في السابق .

من أكثر الأدوية فعالية عند إستخدامه كدواء وحيد هو الـ Ifosfamide الذي يترافق بمعدل إستجابة ٢١% . ويعطى بجرعة ١,٢ - ٢ غ / ٢م / ويدي لمدة ٥ أيام وهي أكثر تحملاً من إعطائه بجرعة واحدة ٥ غ / ٢م / ولكن التأثير واحد في كلا الحالتين ومن الأدوية الحديثة الـ trimetrexate الذي يترافق بمعدل إستجابة ١٧% . ويعطى بجرعة ٨ مغ / ٢م / يومياً لمدة ٥ أيام ومن الأدوية الأخرى الدواء EDAM - 10

الذي يتزافق بمعدل إستجابة ٣٢٪. ويعطى بجرعة ٨٠ مغ / ٢م اسبوعياً ، الدواء الحديث من المجموعة الـ Vinka aslalooids : المسمى Navelbine أثبتت فعالية في معالجة أورام الرئة وبمعدل إستجابة ٣٣٪ واستمرت الإستجابة لفترة وسطية هي ٣٤ أسبوع والجرعة هي ٣٠ مغ / ٢م اسبوعياً حقناً وريدياً .

المشاركة الدوائية combination chemotherapy :

إن الإستجابة في المشاركة الدوائية أعلى من الإستجابة عند إستخدام دواء وحيد ولكن المشاركة الدوائية ليس من الضروري أن تؤدي لزيادة معدل الحياة مقارنة مع الدواء الوحيد .

أكثر المشاركات الدوائية تحوي على السيسبلاتين والجدول رقم ٦ يبين المشاركات الخاوية على السيسبلاتين .

فيمكن مشاركته مع الفنبلاستين أو مع الايتوبوسيد أو الإفوسفاميد كما يمكن مشاركته مع عدة أدوية مثل ميتومايسين والفنبلاستين أو الفلورويوراسيل مع الأدريامايسين وكلها تتزافق بمعدل إستجابة يتراوح ما بين ٢٠ و ٣٠٪ ومعدل الحياة الوسطي ٢٢ أسبوع وليس من الواضح أن إعطاء جرعة عالية من السيسبلاتين

<b>Vinblastine and cisplatin</b>			
Vinblastine	8 mg/m <sup>2</sup> I . v .	Day 1,14,28,	then every 3 weeks
Cisplatin	120 mg/m <sup>2</sup> I . v .	Day 1,28,	then every 6 weeks
<b>VP - 16 and cisplatin</b>			
VP - 16	120 mg/m <sup>2</sup> I . v .	Day 4,6,8	Repeat all every 3 weeks
Cisplatin	60 mg/m <sup>2</sup> I . v .	Day 1	
<b>Ifosfamide and cisplatin</b>			
Ifosfamide	2 mg/m <sup>2</sup> I . v .	Day 1 - 5	Repeat all every 3 weeks
Cisplatin	75 mg/m <sup>2</sup> I . v .	Day 1	
<b>MVP</b>			
Mitomycin C	10 mg/m <sup>2</sup> I . v .	Day 1	Repeat all every 3 weeks
Vinblastine	6 mg/m <sup>2</sup> I . v .	Day 1	
Cisplatin	40 mg/m <sup>2</sup> I . v .	Day 1	
<b>CAP</b>			
Cyclophosphamide	400 mg/m <sup>2</sup> I . v .	Day 1	Repeat all every 3 weeks
Doxorubicin	40 mg/m <sup>2</sup> I . v .	Day 1	
Cisplatin	40 mg/m <sup>2</sup> I . v .	Day 1	

جدول رقم ٦ يبين الأنظمة العلاجية الخاوية على السيسبلاتين لمعالجة سرطان الرئة غير صغير الخلايا

١٢٠ مغ / ٢م أكثر تأثيراً من إعطائه بالجرعة النظامية ٦٠ مغ / ٢م ومن المشاركات غير الحاوية على السيسبلائين مثل CAMP أو المشاركة ما بين الفلورويوراسيل والفنكرستين مع الميثومايسين FOMI فإن لها نفس التأثير للمشاركات الحاوية على السيسبلائين وباختصار يمكن القول إنه لا يوجد الآن مشاركة دوائية لهاتأثير واضح ملئ معدل الحياة وهذا يتطلب البحث عن أدوية جديدة ومشاركات جديدة ونعود ونؤكد على ضرورة انتقاء المرضى الذين يتوقع أن يستجيبوا للمعالجة وفقاً لعوامل الإنذار المذكورة سابقاً .

## المعالجة الكيميائية لسرطان الثدي Chemotherapy of Breast Cancer

لقد بات من المتفق عليه أن سرطان الثدي هو مرض جهازى Systemic disease عند وضع التشخيص كما أنه بات من المؤكد أن إصابة العقد اللمفاوية الإبطية وعدد هذه العقد المصابة من أهم العوامل التي تحدد الإنذار وإعتماداً على ذلك تم إدخال المعالجة الجهازية التامة Adjuvant chemotherapy : والتي ساهمت في تحسين معدل الحياة والإقلال من معدل النكس .

### المستقبلات الهرمونية Hormonal receptors :

في بداية السبعينات من هذا القرن تم وصف المستقبلات الهرمونية وعلاقتها بالاستجابة للمعالجة الهرمونية وبالإنذار فلقد لوحظ أنه عندما تكون المستقبلات الإستروجينية إيجابية  $ER > 10 \text{ Fmol / mg protein}$  فإن معدل الإستجابة للمعالجة الهرمونية يرتفع من ٢٥٪ في الحالات غير المنتفخة إلى ٥٥٪ كما أن معدل الإستجابة يتناسب طردياً مع كمية مستقبلات الإستروجين . إن وجود المستقبلات البروجيسترونية PR ومستقبلات الإستروجين في خلايا سرطان الثدي يعتبر من عوامل الإنذار الهامة كما يعتبر مشعراً هاماً للإستجابة للمعالجة الهرمونية ( عند كون مستقبلات البروجيسترون إيجابية ومستقبلات الإستروجين إيجابية أيضاً فإن معدل الإستجابة للمعالجة الهرمونية يرتفع إلى ٧٨٪ لذلك فإن إيجابية المستقبلات تترافق بمعدل حياة أطول وبمعدل نكس أقل .

### المعالجة الهرمونية Endocrine therapy :

الإستروجين هو الهرمون الأساسي الذي يبحث على نمو الخلية الورمية لسرطان الثدي المعتمدة على الهرمون وإن معظم العلاجات الهرمونية توجه نحو تثبيط أو إلغاء أو التداخل مع نشاط الإستروجين .

المبيضين هما المصدر الأساسي للإستروجين ولكن يمكن أن ينتج من قشر الكظر ومن النسيج الشحمية وحتى من الخلية الورمية لسرطان الثدي .  
البرولاكتين هو الهرمون اهام الثاني الذي يلعب دوراً في نمو ووظيفة الثدي حيث يؤدي بالتعاقد مع هرمون النمو إلى تحريض نمو الأفتية اللبنية ولقد تم إكتشاف مستقبلات خاصة للبرولاكتين في الخلية الورمية لسرطان الثدي مع أن دور هذا الهرمون في إحداث سرطان الثدي لا يزال غير واضح .  
البروجيسترون ليس له أي تأثير على الثدي الطبيعي مالم يكن هناك تنبيه متلازم للإستروجين في هذه الحالة يمكن أن يتداخل البروجيسترون مع البرولاكتين ويحرض نمو الفصيصات .

المعالجة الهرمونية قد تكون بالضهي الجراحي أو الشعاعي واستئصال الكظر واستئصال النخامة كل هذه الوسائل استعاض عنها بالمركبات الهرمونية ( الإستروجين - الأندروجين - البروجيسترون ) .  
- التاموكسيفين Tamoxifen ،

وهو الدواء الهرموني الأول في معالجة المريضات بعد سن اليأس وخاصة في حال كون المستقبلات الهرمونية إيجابية ، يقوم التاموكسيفين بالارتباط مع المستقبلات الإستروجينية ويشكل مركب يثبط تركيب الإستروجين كما أن التاموكسيفين يترافق بآثار جانبية قليلة بالمقارنة مع الدواء القديم ( دي ايثيل ستيلبيستيرون DES ) .  
التاموكسيفين مضاد استروجيني غير سترئويدي يشبه تركيبه الـ DES ولكن له تأثيراً استروجيني ضعيف وهذا مايفسر لماذا لا يؤدي إلى ترقق العظام Osteoporosis ، التاموكسيفين موقف لنمو الخلايا أكثر من كونه قاتل للخلايا كما أنه يؤدي لتثبيط دورة حياة الخلية ويؤدي لتراكم الخلايا في المرحلة  $G_0$  ,  $G_1$  .

الآثار الجانبية للدواء قليلة كالصداع والتوهج الحار Hot flashes كما سجلت بعض الحالات من انخفاض مستوى anti thrombin III ولكن هناك بعض الدراسات التي تشير

إلى إمكانية حدوث سرطان باطن الرحم عند النساء المعالجات لفترة طويلة بهذا الدواء.

- التاموكسيفين للنساء في سن النشاط التناسلي .

إن معدل الإستجابة للضهي الجراحي عند النساء في سن النشاط التناسلي هو نفس معدل الإستجابة للمعالجة بالتاموكسيفين كما أن الإستجابة السابقة للتاموكسيفين يمكن أن نعتبرها مشعراً جيداً للإستجابة للضهي الجراحي وهذا يعني أن التاموكسيفين يجب أن يستخدم كمعالجة بدئية ويجري الضهي الجراحي فقط عند المستجيبات للمعالجة بالتاموكسيفين إلا أن ذلك لم يتم إثباته حتى الآن بواسطة الأبحاث المختلفة ولذلك فإن التاموكسيفين يعتبر الدواء الأول عند النساء في سن النشاط التناسلي وفي سن اليأس إذا كانت المستقبلات الهرمونية إيجابية .

الجرعة : ١٠ مغ مرتين يومياً عند النساء في سن اليأس وعند النساء في سن النشاط التناسلي ولكن بعض الدراسات حربت إعطاء جرعات أعلى من ذلك عند النساء في سن النشاط التناسلي تصل حتى ١٢٠ مغ مرتين يومياً وهي أكثر فعالية في إيقاف الطمث ولكن ليست أكثر تأثيراً على نمو الورم .

البروجيستينات Progestines :

وتعتبر الخط الثاني للمعالجة الهرمونية وعند حصول النكس بعد الإستجابة للمعالجة بالتاموكسيفين ومعدل الإستجابة يتراوح ما بين ١٤ و ٢٢٪ أما إذا كانت المعالجة البدئية بالبروجيستينات ثم أعطي بعد ذلك التاموكسيفين فإن معدل الإستجابة يتراوح ما بين ٢٣,٥٪ الآثار الجانبية قليلة ولكنها أكثر من تلك الملاحظة في التاموكسيفين من هذه الآثار زيادة الوزن .

المركبات المستخدمة سريراً .

١ - ميغسترول Megestrol<sup>R</sup> ( Megace<sup>R</sup> ) جرعته ١٦٠ مغ يومياً .

٢ - ميلروكسي بروجيسترون Medroxy Progesterone<sup>R</sup> ( Depoprovera<sup>R</sup> ) ٥٠٠ مغ

ثلاث مرات أسبوعياً .

ـ أمينوغلوتيثيميد ( AG ) Amino glutethemide :

وهو دواء يثبط تحول الأندروستينديون Androstenidione إلى الاسترون Estrone وبالتالي تثبيط إنتاج الاستروجين من الكظر والنسج الشحمية ومن خلايا سرطان الثدي ولذلك فإنه يمكن أن يعيـض عن استـصال الكـظرين والنخامة في معالجة السرطان المتقدم .

يمكن أن يؤدي إلى تخفيف الألم عند المصابات بالنقائل العظمية إلا أنه نظراً لأن آثاره الجانبية أشد من تلك التي ترافق التاموكسيفين والبروجيستيرون فإن إستخدامه أقل من تلك الأدوية في المعالجة الهرمونية .

الآثار الجانبية الحادة تحدث بعد ٦ أسابيع وتشمل التعب Lethergy - الطفح الدوائي - انخفاض التوتر الشرياني الانتصابي Orthostatic hypotension الدوار - الرنح Ataxia والحمى ثم بعد ذلك تميل هذه الآثار للتناقص . يمكن أن يحدث انخفاض البيض والصفائح وحتى نقص الخلايا الشامل Pancytopenia يمكن أن يحدث في ٤٪ من الحالات .

الجرعة النظامية : هي ١٠٠٠ مغ يومياً ( ٢٥٠ مع كل ٦ ساعات ) .

ويعطى الهيدروكورتيزون ٢٠ - ٣٠ مغ عن طريق الفم يومياً صباحاً .

بعض الدراسات تشير إلى أن الجرعة المنخفضة ٥٠٠ مغ يومياً يمكن أن يكون لها نفس تأثير الجرعة السابقة .

ـ الاستروجينات Estrogens :

قبل إكتشاف التاموكسيفين كان الدواء الاستروجيني ( DES ) Di Ethylstilbesterol

هو الدواء الأول للنساء بعد سن اليأس وعند كون السرطان متقدماً وآلية تأثيره غير معروفة جرعة DES هي ٥ مغ ثلاث مرات يومياً .

الغثيان شائع الحدوث وخاصة بشكل مبكر ويمكن تجنبه بزيادة الجرعة تدريجياً كأن تبدأ الجرعة بـ ٥ مغ يومياً لمدة ٥ - ٧ أيام ثم ٥ مغ مرتين يومياً لمدة ٥ - ٧ أيام ثم



تعطى الجرعة النظامية بعد ذلك ومن الآثار الأخرى زيادة تصبغ الحلمة والتهالة والابط  
- احتباس السوائل كما يمكن أن تحدث النزوف النسائية عند النساء بعد سن اليأس في  
٤٠٪ من الحالات ويتوقف بإيقاف المعالجة عادة .

عند المريضات المستجيبات على الاستروجين في البداية ثم حدث بعد ذلك بوقت  
متأخر زيادة نمو الورم فإنه يمكن أن يؤدي إيقاف المعالجة إلى الإستجابة بمعدل ٣٢٪  
حيث يتراجع الورم وهذا ما يدعى Estrogen rebound regression ويمكن أن تستمر  
الإستجابة لفترة قد تصل حتى ٨ اشهر .  
- الاندروجينات androgens ،

وهي من أقدم الأدوية الهرمونية إستخداماً في المعالجة الهرمونية وهي تعطي تأثيرها  
المضاد للاستروجين بتداخلها مع المستقبلات الثلاثية الاستروجينية والبروجيستيرونية  
والاندروجينية وآثارها الجانبية مزعجة منها الشعرانية وضمور البظر والصفات  
الذكورية الثانوية ولذلك فهي قليلة الإستخدام . أشهر المركبات هو Fluoxymesterone  
ويعطى بجرعة ٢٠ - ٣٠ مغ يومياً .

- المركبات المشابهة للهرمون المحرر للهرمون الملوتن LHRH agonists :  
لقد لوحظ أن إعطاء المركبات الشبيهة بـ Luteinizing Hormone - Releasing LHRH  
Hormone يؤدي إلى :

- نقص افراز الهرمونات LH و FSH
- نقص افراز البرولاكتين .
- انخفاض مستوى الهرمونات الجنسية في البلازما .
- نقص عمل الهرمونات الجنسية على الأعضاء المتأثرة بها .
- كما لوحظ أنه يؤدي لنقص حجم سرطان الثدي في الفئران .
- و يتم حديثاً دراسة المركبات الشبيهة بالـ LHRH عند الإنسان من هذه المركبات  
Leuprolide - Goserelin و buserelin وكلها توافقت مع إستجابة بمعدل ٤٥٪ .

أكثر الآثار الجانبية هي انقطاع الطمث - الصداع واضطرابات النوم .  
المعالجة الكيميائية لسرطان الثدي :

في عام ١٩٦٩ أشار العالم ريتشارد كوبر Richard Cooper بتقريره أنه حصل على معدل إستجابة يصل حتى ٨٨٪ بالمشاركة الدوائية CMFVP : ( سيكلوفوسفاميد ميثوتركيمات + فلورويوراسيل + فنكرستين + بريدنيزون ) عند المصابات بسرطان الثدي غير المتسحج على المعالجة الهرمونية . ثم توالى بعد ذلك الدراسات السريرية التي تقيم المشاركات الدوائية المختلفة مما أدى إلى تبني المشاركة الكيميائية كمعالجة أساسية للسرطان المتقدم المترافق مع النقائل البعيدة .

المعالجة بدواء وحيد لسرطان الثدي :

يستجيب سرطان الثدي لكل المجموعات الدوائية المضادة للسرطان : العوامل المقلونة - مضادات الاستقلاب - مثبطات الانقسام mitotic inhibitors والصادات المضادة للأورام anti tumor anti biotics وعلى الرغم من العدد الكبير للأدوية الفعالة ضد سرطان الثدي عند إستخدامها بمفردها إلا أنها جميعاً تستخدم في المشاركات المختلفة . ويمكن أن نستعرض بعض الأدوية بشيء من التفصيل :

١- الانثراسيكلين anthracyclin :

١- الأدريناميسين Adramycin - Doxorubicin :

ولا يزال أكثر الأدوية فعالية في معالجة سرطان الثدي ولكنه يترافق بمجموعة من الآثار الجانبية مثل السمية على العضلة القلبية وتساقط الشعر وهذا ما شجع الباحثين على إيجاد مركبات شبيهة أقل سمية وخاصة على العضلة القلبية .

الجرعة الدوائية ٥٠ - ٧٥ مغ / م<sup>٢</sup> حقناً وريدياً كل ٣ أسابيع ويزداد معدل حدوث اعتلال العضلة القلبية Cardionopathy بشكل كبير إذا ازدادت الجرعة التراكمية عن ٥٥٠ مغ / م<sup>٢</sup> وهناك ثلاث وسائل للتغلب أو للاقلال من سمية الدواء على العضلة القلبية وهي :

١ - إعطاء الدواء اسبوعياً لوحظ من خلال الدراسات أن إعطاء الدواء بجرعة أسبوعية ٢٠ مغ / ٢م وريدياً يترافق بسمية أقل على العضلة القلبية من إعطاء الدواء بجرعته النظامية كل ٣ أسابيع .

٢ - إعطاء الدواء بتثريب وريدي مستمر .

لوحظ في سرطان الثدي المتقدم أن إعطاء الأدريامايسين بتثريب وريدي مستمر يترافق بانخفاض السمية على العضلة القلبية ( دراسة في مركز M. D Anderson ) كما لوحظ أنه لا يوجد اختلاف ما بين معدل الإستجابة في الحقن الوريدي دفعة واحدة والتثريب الوريدي المستمر .

٣ - دواء الـ Bisphosphonate لوحظ أن له تأثير واقى ضد سمية الأدريامايسين على العضلة القلبية .

ب - الـ Epirubicin : الـ إبيريبيسين

ويشابه الأدريامايسين وله نفس التأثير ولكن أقل سمية على العضلة القلبية كما أن تصفية الكبد أقل من الأدريامايسين أي أنه يمكن إستخدامه في النقائل الكبدية المتقدمة.

ج - الـ Idarubicin : الـ ايداربيسين

وهو أقل سمية على العضلة القلبية من الأدريامايسين والـ Epirubicin : وله ميزة أخرى أنه يمكن أن يعطى عن طريق الفم وهو دواء فعال في معالجة سرطان الثدي ولكن لا يزال غير معروف هل له تأثير معادل لتأثير الأدريامايسين في معالجة سرطان الثدي .

٢ - ميتوكسانترون Mitoxantron :

وهو دواء فعال في معالجة سرطان الثدي وكذلك ابيضاض الدم واللمفومات السمية على العضلة القلبية غير شائعة وتحدث بنسبة ٣٪ عندما تكون الجرعة التراكمية للدواء ١٧٥ - ٢٥٠ مغ / ٢م ومعدل الإستجابة في سرطان الثدي أقل بـ ١٠٪ من معدل الإستجابة للأدريامايسين الجرعة الأولى ١٠ - ١٤ مغ / ٢م وريدي كل ٣ أسابيع .

### ٣ - الفلورويوراسيل Flououracil - 5 :

وهو موجود في معظم المشاركات الدوائية المستخدمة في معالجة الثدي المتقدم .

#### - الفلورويوراسيل مع اللوكوفورين Fu + Leucovorin - 5 :

ملاحظة أن اللوكوفورين يقوي تأثير الفلورويوراسيل السام للخلايا أعاد الانتباه لهذا الدواء وهناك عدة دراسات حديثة تقيم نتائج إعطاء الفلورويوراسيل 5 - flououracil عند المصابات بسرطان الثدي والمعالجات سابقاً ففي دراسة للعالم Sivain التي تم فيها إعطاء ٥٠٠ مغ / ٢م من اللوكوفورين مع الفلورويوراسيل ٣٧٥ مغ / ٢م وريدي يومياً ولمدة ٥ أيام لاحظ أن معدل الإستجابة يصل حتى ٢٤٪ وفي دراسة أخرى للعالم Jabbonry تم فيها إعطاء اللوكوفورين بمعدل ٢٠٠ مغ / ٢م بترتيب وريدي لمدة ٣٠ دقيقة مع الفلورويوراسيل بجرعة ٢٠٠ مغ / ٢م يومياً بترتيب وريدي مستمر لمدة ٥ إلى ١٢ يوم ولاحظ معدل إستجابة يصل حتى ٦٠٪ عند المصابات والمعالجات سابقاً وهذه الدراسة توعد بالأمل ولكنها تحتاج للإثبات بدراسات سريرية .

#### المعالجة الكيميائية بالمشاركة الدوائية Combination Chemotherapy :

هناك عدة عوامل يمكن أن تترافق بإستجابة جيدة للمعالجة الكيميائية مثل الحالة العامة الحسنة - عدد محدود من التوضعات الورمية - الإستجابة السابقة للمعالجة الهرمونية - النقائل للنسج الرخوة وبالمقابل هناك عوامل تترافق بإستجابة متخفضة للمعالجة الكيميائية منها - النقائل العظمية أو الكبدية - المعالجة الكيميائية السابقة أو المعالجة الشعاعية السابقة - انخفاض عدد اللمفاويات في الدم .

#### مشاركات الخط الأول للمعالجة الكيميائية First line chemotherapy :

الأنظمة العلاجية كخط أول في معالجة سرطان الثدي المتقدم يمكن أن نقسمها إلى أنظمة كوبر Cooper = العلاجية والأنظمة أو المشاركات الحاوية على الأدريناميسين ولكل منها مؤيديها ومن الصعب تحديد أي منها يمكن إعتباره المعالجة القياسية .

أ - المشاركات الدوائية غير الحاوية على الأديرياميسين .

وفيما يلي نستعرض الجرعة وطريقة إعطاء هذه المشاركات :

#### ١ - CMFVP :

C - سيكلوفوسفاميد Cyclophosphamide ١٠٠ مغ / ٢م عن طريق الفم من اليوم الأول حتى اليوم الرابع عشر .

M - ميثوتركسات Methotrexate ٤٠ مغ / ٢م ويريدي في اليوم الأول والثامن .

F - فلورويوراسيل 5-flourouracil ٥٠٠ مغ / ٢م ويريدي في اليوم الأول والثامن .

V - فنكريستين Vincristine ١ مغ / ٢م ويريدي في اليوم الأول والثامن .

P - بريدنيزون Prednisone ٤٠ مغ / ٢م عن طريق الفم من الأول وحتى الرابع عشر .

يكرر كل ٢٨ يوماً .

#### ٢ - CMF :

C - سيكلوفوسفاميد Cyclophosphamide ١٠٠ مغ / ٢م عن طريق الفم من اليوم الأول حتى اليوم الرابع عشر .

M - ميثوتركسات Methotrexate ٤٠ مغ / ٢م عن طريق الوريد في اليوم الأول والثامن ( عند كبار السن أكبر من ٦٥ سنة يعطى ٣٠ مغ / ٢م ) .

F - فلورويوراسيل 5-flourouracil ٦٠٠ مغ / ٢م ويريدي في اليوم الأول والثامن .

عند كبار السن أكبر من ٦٥ سنة يعطى ٤٠٠ مغ / ٢م .

يكرر كل ٢٨ يوماً .

#### ٣ - CMF :

نفس السابق ماعدا السيكلوفوسفاميد يعطى ويريدي وبجرعة ٤٠٠ مغ / ٢م ويريدي في اليوم الأول .

#### ٤ - CMFP :

C - سيكلوفوسفاميد Cyclophosphamide ١٠٠ مغ / ٢م عن طريق الفم في اليوم الأول وحتى الرابع عشر .

M - ميثوتركسات Methotrexate ٤٠ مغ / ٢م وريدي في اليوم الأول والثامن .  
( ٣٠ مغ / ٢م  $\leq$  ٦٥ سنة )

F - فلورويوراسيل 5-Fu : ٦٠٠ مغ / ٢م وريدي في اليوم الأول والثامن .  
( ٤٠٠ مغ / ٢م  $\leq$  ٦٥ سنة )

P - بريدنيزون Prednisone ٤٠ مغ / ٢م عن طريق الفم من اليوم الأول حتى ١٤ .  
يكبر كل ٢٨ يوماً .

#### ٥ - CFP :

C - سيكلوفوسفاميد Cyclophosphamide ١٥٠ مغ / ٢م وريدي يومياً لمدة ٥ أيام .

F - فلورويوراسيل 5-Fu ٣٠٠ مغ / ٢م وريدي يومياً لمدة ٥ أيام .

P - بريدنيزون Prednisone ٣٠ مع يومياً لمدة ١٤ يوم ثم ٢٠ مغ / ٢م يومياً لمدة ٧ أيام ثم ١٠ مغ / يومياً .

يكبر كل ٥ أسابيع .

ب - المشاركات الحاسوبية على الأديرياميسين :

وفيما يلي نستعرض الجرعة وطريقة إعطاء هذه المشاركات :

١ - AC ( جامعة الازيزونا ) ( Arizona university ) :

A - أديرياميسين Adriamycin ٤٠ مغ / ٢م في اليوم الأول .

C - سيكلوفوسفاميد Cyclophosphamide ٢٠٠ مغ / ٢م عن طريق الفم من اليوم

الثالث وحتى السادس .

يكبر كل ٢١ يوماً .

**٢ - AC ( NSABP ) National Surgical Adjuvant Breast Project :**

- A - أدرياميسين Adriamycin ٤٠ مغ / م٢ في اليوم الأول .
- C - سيكلوفوسفاميد Cyclophosphamide ٦٠٠ مغ / م٢ في اليوم الأول وريدي .
- يكرر كل ٢١ يوماً .

**٣ - CAF ( Cancer and Leukemia Group B ) :**

- C - سيكلوفوسفاميد Cyclophosphamide ١٠٠ مغ / م٢ عن طريق الفم من اليوم الأول حتى الرابع عشر .
- A - أدرياميسين Adriamycin ٢٥ مغ / م٢ وريدي في اليوم الأول والثامن .
- F - فلورويوراسيل 5-Fu ٥٠٠ مغ / م٢ وريدي في اليوم الأول والثامن .
- تكرر كل ٢٨ يوماً .

**٤ - CAF ( South eastern cancer study Group ) :**

- C - سيكلوفوسفاميد ٥٠٠ مغ / م٢ وريدي في اليوم الأول .
- A - أدرياميسين ٥٠٠ مغ / م٢ وريدي في اليوم الأول .
- F - فلورويوراسيل 5-Fu ٥٠٠ مغ / م٢ وريدي في اليوم الأول .
- يكرر كل ٣ أسابيع .

**٥ - CAF ( M . D Anderson cancer centre ) :**

- F - فلورويوراسيل 5-Fu ٥٠٠ مغ / م٢ وريدي في اليوم الأول والثامن .
- A - أدرياميسين ٥٠ مغ / م٢ بترتيب وريدي مستمر لمدة ٤٨ ساعة إلى ٩٦ ساعة .
- C - سيكلوفوسفاميد ٥٠٠ مغ / م٢ وريدي في اليوم الأول .
- يكرر كل ٢٨ يوماً .

لقد برهنت التجارب السريرية المختلفة على أن المشاركة CAF هي المفضلة على CMF ولكن لا يوجد أي دليل أو تفاصيل على أنها يجب أن تكون هي المعالجة القياسية .

المشاركات الحاوية على المركبات الشبيهة بالأدرياميسين :

١ - المشاركة CEF ( سيكلوفوسفاميد + Epirubicin ) ٥٠ مغ / ٢م وريدي + فلورويوراسيل ) لها نفس التأثير من حيث معدل الإستجابة ومدة إستمرارها أي أن نتائجها مطابقة لنتائج المشاركة CAF .

٢ - الايدرايسين Idarubicin :

يمكن إعطاء الايدرايسين بجرعة ١٥ مغ / ٢م عن طريق الفم في الأيام ١ - ٢ و ٣ بدلاً عن الأدرياميسين في المشاركة CAF والنتائج هي نفسها ولكن الآثار الجانبية أقل.

المشاركات الحاوية على الميتوكسانترون Metoxantrone combination :

يمكن إعطاء المشاركة CNF ( N: Novantrone ) وهي عبارة عن :

C - السيكلوفوسفاميد ٥٠٠ مغ / ٢م في اليوم الأول والثامن .

N - نوفانترون Mitoxantrone ١٠ مغ / ٢م وريدي .

F - فلورويوراسيل 5-Fu ٥٠٠ مغ / ٢م وريدي في اليوم الأول والثامن .

وقد تكون هذه المشاركة أقل تأثيراً من الـ CAF ولكنها أقل سمية .

المشاركات الحاوية على النيسبلاطين Cisplatin combination :

لقد تمت دراسة السيسبلاطين والمشاركات الحاوية عليه في معالجة سرطان الثدي المنتشر

وقد أظهر فعالية جيدة في المعالجة ومن هذه المشاركات نذكر CAP ( سيكلوفوسفاميد

+ أدرياميسين + سيسبلاطين ) والمشاركة ماين السيسبلاطين وايتوبوسيد ( VP16 )

والمشاركة MVAC ( ميتوتركسات + فنبلاستين + أدرياميسين + سيسبلاطين ) ولكن

هذه المشاركة ليست أكثر فعالية من المشاركة CAF أو المشاركة CMF .



## أنظمة الخط الثاني العلاجية Second line chemotherapy :

### ١ - المشاركة VATH :

- V - فنبلاستين Vinblastine ٤,٥ مغ / م٢ في اليوم الأول .
- A - أدرياميسين Adriamycin ٤٥ مغ / م٢ في اليوم الأول .
- T - ثيوتيبا Thiotepa ١٢ مغ / م٢ في اليوم الأول .
- H - هالوتستين Holotestin ١٠ مغ ثلاث مرات يومياً عن طريق الفم بشكل مستمر .  
يكبر كل ٢١ يوماً .

### ٢ - المشاركة DVM :

- D - دوكتوربيسين Doxorubicin ( أدرياميسين ) ٥٠ مغ / م٢ حقن وريدي في  
اليوم ( ١ ) و ( ٢٨ ) .
- V - فنكريستين Vincristine ١ مغ / م٢ في الأيام ( ١ ) و ( ٢٨ ) .
- M - ميتومايسين Mitomycin ١٠ مغ / م٢ في اليوم ( ١ ) .  
يكبر كل ٨ أسابيع .

### ٣ - المشاركة VAM :

- V - فنبلاستين Vinblastine ٦ مغ / م٢ في اليوم ( ١ ) و ( ٢٨ ) .
- A - أدرياميسين Adriamycin ٣٠ مغ / م٢ في اليوم ( ١ ) و ( ٢٨ ) .
- M - ميتومايسين Mitomycin c ١٠ مغ / م٢ في اليوم ( ١ ) .  
يكبر كل ٨ أسابيع .

### ٤ - المشاركة ماين الفنبلاستين والميتومايسين Vinblastine + Mitomycine :

- أول شوطين : Frist two cycles :

- ميتومايسين Mitomycin c ١٠ مغ / م٢ حقناً وريدي في اليوم ( ١ ) و ( ٢٨ ) .
- فنبلاستين Vinblastine ٥ مغ / م٢ وريدي في الأيام ( ١ ) و ( ١٤ ) و ( ٢٨ ) و ( ٤٢ ) .

الاشواط الباقية :

ميتومايسين Mitomycin ١٠ مغ / ٢م وريدي في اليوم ( ١ ) .

فنبلاستين vinblastine ٥ مغ / ٢م وريدي في اليوم ( ١ ) و ( ٢١ ) .

تكرر كل ٦ إلى ٨ أسابيع .

## المعالجة الكيميائية لسرطانات الجهاز الهضمي Chemotherapy of Gastrointestinal cancers

١ - سرطان المري Esophageal Cancer :

١ - المعالجة الجهازية Systemic therapy :

على الرغم من أن معدل الحدوث incidence : لسرطان المري ضئيل جداً ١٠,٩٠٠ كل سنة إلا أن هناك ٩٨٠٠ حالة وفاة سنوياً بسبب هذا السرطان أي معدل الوفاة ٩٠٪ ومعدل الحياة الكلي لجميع المرضى لا يتجاوز الـ ٥٪ .

المعالجة الأساسية بالجراحة أو بالمعالجة الشعاعية وعادة ماتكون فاشلة بسبب انتشار الورم موضعياً أو بسبب وجود النقائل البعيدة Distant Metastases أما المعالجة الكيميائية فكانت تستخدم في السابق فقط بعد فشل المعالجة الموضعية وعادة مايصعب تقييم نتائج هذه المعالجة لسبب سوء حالة المريض العامة الناجمة عن نقص التغذية وعموماً هناك ١٥ دواء تتوافق بمعدل إستجابة يصل حتى الـ ١٥٪ وهذه الأدوية هي الفلورويوراسيل 5 - Fu - السيسبلاتين cisplatin - بليومايسين Bleomycin - الفنديزين Vindesine - والميتومايسين Mitomycin .

عند إستخدام هذه الأدوية بالمعالجة بدواء وحيد فإن عدد قليل جداً من الحالات يستجيب بشكل كامل C . R وتأثيرها بسيط على معدل الحياة ولذلك فإن المشاركة الدوائية هي المعالجة القياسية ومعظم هذه المشاركات تحوي على السيسبلاتين وحتى الآن لا يوجد دراسات سريرية تقارن ما بين المشاركات المختلفة أو ما بين المشاركة والدواء الوحيد إلا أن معدل الإستجابة للمشاركة الدوائية يتراوح ما بين ٤٠ و ٦٠٪ أما في الحالات المتقدمة فإن معدل الإستجابة يتراوح ما بين ٢٠ - ٣٠٪ .

ب - المشاركة ما بين الأساليب العلاجية Multimodality therapy :

إن إعطاء المعالجة الكيميائية قبل العمل الجراحي Neo adjuvant chemotherapy : لها عدة

محاسن منها :

- قد تكون أكثر فعالية مما لو استخدمت بعد العمل الجراحي .
- قد تقلل من احتمال حدوث المقاومة العفوية Spontaneous drug Resistance للدواء .
- تقلل من حجم الورم البدئي وبالتالي تزيد من إمكانية الاستئصال الجراحي للورم .
- تسمح هذه الطريقة بتقييم نتائج وتأثير المعالجة الكيميائية ويمكن أن نقول بشكل عام أن هناك ٣ طرق للمشاركة ما بين المعالجات المختلفة المعالجة الكيميائية قبل العمل الجراحي ثم المعالجة الشعاعية والمعالجة الكيميائية بعد ذلك أو المعالجة الكيميائية ثم بعد ذلك الإستئصال الجراحي أو المعالجة الشعاعية والمعالجة الكيميائية دون التداخل الجراحي ويمكن أيضاً إعطاء المعالجة الشعاعية قبل العمل الجراحي Preoperative Radiotherapy = ٥٥ غري ؟

## ٢ - سرطان المعدة Gastric Cancer :

### ١ - المعالجة الجهازية Systemic therapy :

هناك سبعة أدوية كيميائية تتمتع بتأثير جيد على سرطان المعدة وهي Fu - 5 - ميتومايسين - الأدرياميسين - السيسبلاتين - BCNU - الميثوتركسات والايثوبوسيد ( VP16 ) Etoposide إلا أن فترة الإستجابة قصيرة وليس هناك أي تأثير على معدل الحياة والمشاركات الدوائية تتوافق بمعدل إستجابة يتراوح ما بين ٣٠ و ٤٥٪ مع معدل حياة ما بين ٦ و ٩ أشهر .

الفلورويوراسيل Fu-5 هذا الدواء المشترك في جميع المشاركات مثل FAM والمشاركة FAP والمشاركة FAME و FAB وجميع هذه المشاركات متقاربة بالتأثير أما المشاركة ( EAP VP16 + أدرياميسين + سيسبلاتين ) فيلاحظ أنها تتوافق بمعدل إستجابة يتراوح ما بين ١٠ و ١٥٪ وهي إستجابة مشابهة للمشاركة ما بين الفلورويوراسيل و VP16 و Leucovorin ( ELF ) ولكن الأخيرة أقل سمية .

#### ب - المعالجة المتممة Adjuvant chemotherapy :

حتى هذا الوقت لم يتم التأكد من أن هناك فائدة لهذه المعالجة في أكبر دراسة سريرية تم فيها استخدام الفلورويوراسيل مع methyl CCNU كمعالجة متممة تم الحصول على نتيجة واحدة ايجابية ونتيجتين سلبيتين كما فشلت باقي المشاركات على إعطاء نتائج إيجابية .

#### ٣ - سرطان الكبد البدني Hepatic Cancer :

بعض الأدوية أدت إلى إستجابة وبنسبة ضئيلة في السرطان غير المستأصل من هذه الأدوية الفلورويوراسيل - النتروسويوريا nitrosourea والأدرياميسين وحتى الآن لا يوجد دواء أو مشاركة يمكن إعتبارها المعالجة القياسية .

- المعالجة الكيميائية بالحقن داخل الشريان intra arterial therapy : هناك عدة دراسات سريرية جرت لتقييم إعطاء المعالجة الكيميائية عن طريق الشريان الكبدي Hepatic artery مع أو بدون ربط هذا الشريان وبعض هذه الدراسات أشارت إلى تحسن في معدل الإستجابة وفي معدل الحياة إلا أن ذلك يحتاج لدراسات أخرى .  
- بعض الطرق الخاصة .

إن الطبيعة الموضعة لمعظم أورام الكبد دفع بعض الباحثين لايجاد طرق أخرى منها الأضداد الموسومة بالعناصر المشعة مثل anti ferritin<sup>131</sup> مع المشاركة بالمعالجة الكيميائية والمعالجة الشعاعية الخارجية external Radiotherapy وهذه الطرق لاتزال قيد الدراسة .

#### ٤ - سرطان البنكرياس pancreatic Cancer :

نظراً لصعوبة التشخيص المبكر فإن معظم الحالات تراجع بسرطان متقدماً موضعياً أو بسرطان متقل للبعد وبالتالي فإن الجراحة غير قادرة على الشفاء وكذلك المعالجة الشعاعية كما أن معدل الإصابة بهذا السرطان يزداد وكل ذلك يدفع الباحثين لايجاد دواء أو مشاركة فعالة ولسوء الحظ فإن معظم المرضى يراجعون بحالة عامة سيئة

وبسرطان متقدم مما يجعل من الصعب إعطاء المعالجة الكيميائية وتقييم نتائجها. هناك مجموعة من الأدوية الكيميائية الفعالة التي يمكن أن تعطي معدل إستجابة يصل حتى ١٥٪ أو أكثر من هذه الأدوية الفلورويوراسيل - ميتومايسين و CCNU وهناك أدوية أقل فعالية هي Streptozotocin - أدياميسين - سيسبلاتين و methyl CCNU . وهناك عدة مشاركات مابين هذه الأدوية منها FAM ( أدياميسين + فلورويوراسيل + ميتومايسين - SMF ( 5 Fu + Mitomycin c + Streptozotain ) و FAM - S ( المشاركة FAM + Sterptozotocin ) FAP — ( 5 Fu + أدياميسين + سيسبلاتين ) وكل الدراسات تشير إلى أفضلية إستخدام المشاركات عن إستخدام دواء وحيد والمشاركات الحديثة الواعدة هي المشاركة مابين الفلورويوراسيل + السيكلوفوسفاميد + الميثوتركسات + فنكرستين : والميتومايسين Mitomycin c حيث توافقت بمعدل إستجابة يصل حتى ٢١٪ بينما معدل الإستجابة للـ 5 Fu لوحده ٥٧٪ وللمشاركة FAM ١٥٪ .

وحتى الآن لا يوجد دواء وحيد أو مشاركة فعالة والتقدم مرهون باكتشاف عناصر دوائية جديدة .

#### ٥ - سرطان المرارة Gall bladder carcinoma :

وهو سرطان نادر والقليل من الحالات ترشح للمعالجة الكيميائية وذلك لكون الغالبية العظمى تشخص بمرحلة متأخرة ولذلك فإن الخبرة في المعالجة الكيميائية محدودة وهناك دراسة تقارن مابين إعطاء 5Fu عن طريق الفم وإعطاء الـ 5Fu عن طريق الفم مع دواء Streptozotocin أو مع methyl CCNU ولوحظ أن إعطاء الـ 5 Fu عن طريق الفم يتوافق بمعدل إستجابة ١١٪ وعند إعطائه مشاركة مع Streptozotocin ١٢٪ .

#### ٦ - سرطان الطرق الصفراوية Bile Duct Cancer :

مذكور في سرطان المرارة ينطبق أيضاً على سرطان الطرق الصفراوية من ناحية

الخبرة في المعالجة الكيميائية ولقد جربت عدة مشاركات منها تلك المستخدمة في سرطان المرارة والمشاركة الأخرى هي FAM التي تترافق مع معدل إستجابة يصل حتى ٢٥٪ ويتم اختبار إعطاء الفلورويوراسيل والأدرياميسين عن طريق الشريان الكبدي.

#### ٧ - سرطان الأمعاء الدقيقة Small bowel cancer :

وهي نادرة وتشكل ٢٩٠٠ حالة كل سنة وأغلب الأنواع هي السرطانة الغدية Adeno carcinoma - الغرن Sarcoma - اللومفوما والكارسينويد Carcinoid . بالنسبة لمعالجة الغرن واللمفوما والكارسينويد سوف تستعرض في أبحاث قادمة أما المعالجة للسرطانة الغدية فإنها تتم بالإستئصال الجراحي وليس هناك أي معالجة كيميائية فعالة لحالات السرطان المنتشر أو كمعالجة متممة .

#### ٨ - سرطان الكولون والمستقيم Colorectal Cancr :

##### ١ - المعالجة الجهازية للحالات المتقدمة advanced disease - systemic therapy :

إن أكثر الأدوية فعالية هو الفلورويوراسيل 5Fu إلا أنه منذ إكتشافه منذ ٢٧ عام وحتى الآن لم يتم الإتفاق على الطريقة المثلى لإعطائه ولاعلى الجرعة المثالية ولكن إعطائه عن طريق الوريد يترافق بمعدل إستجابة يصل حتى ٢٠٪ .

من الأدوية الأخرى الفعالة نذكر ( FUdR ) Flourodeoxyuridine - methyl CCNU - Mitomycin - C و .

وجميعها لها نفس معدل إستجابة الفلورويوراسيل ولكن سميتها أكثر .

إن مشاركة الفلورويوراسيل مع Methyl CCNU والفنكرستين .

المشاركة MOF : وهي مشاركة قديمة كانت توعد بالأمل إلا أنها لم تنجح في الدراسات التالية وكذلك المشاركة MOF - Strep وهي المشاركة ما بين الأدوية المذكورة سابقاً مع دواء ال Streptozotocin .

إن المشاركة ما بين 5 - Fu و Leucovorin حددت الأمل وتوعد بنتائج جيدة ويعتقد أن إعطاء ال Leucovorin : قبل إعطاء ال 5 - Fu يقوي تأثير الدواء المثبط

لتكوين الـ DNA و عدة دراسات سريرية أثبتت على أن هذه المشاركة أفضل من إعطاء الـ 5-Fu لوحده من حيث معدل الإستجابة والتأثير على معدل الحياة ومن أهم اختلاطات هذه المعالجة هي الإسهال الشديد الذي قد يؤدي للتخفاف وبالتالي للوفاة. المشاركات ما بين 5-Fu والانترون 2-interferon-a ترافقت بمعدل إستجابة جزئية عالي ٧٦٪ عند المرضى غير المعالجين سابقاً وأهم الاختلاطات هي زيادة التهاب الأغشية المخاطية وتبسيط نقي العظم وهذه المشاركة تحتاج لمزيد من الدراسات للتقييم .

#### ب - المعالجة الناحية للحالات المتقدمة Regional therapy for Advanced disease :

إن إعطاء المعالجة الكيميائية عن طريق الحقن بالشریان الكبدي هي أسلوب جديد لمعالجة النقائل الكبدية وتسمح هذه الطريقة بتعريض الخلية الورمية لتركيز دوائي عالي ولفترة طويلة وهناك عدة دراسات حديثة تقيم وتقارن ما بين هذه الطريقة والمعالجة الجهازية ولوحظ أن معدل الإستجابة أعلى في الطريقة الموضعية ولكن لا يوجد تأثير على معدل الحياة .

#### ج - المعالجة الكيميائية المتممة Adjuvant chemotherapy :

٧٥٪ من الحالات في سرطان الكولون والمستقيم يتم التدخل الجراحي عليها بقصد الإستصال التام ولكن ١/٢ هذه الحالات توفى بسبب النقائل البعيدة Distant Mctastases وهذا كان أحد الأسباب الهامة لايجاد المعالجة المتممة علها تؤثر على معدل الحياة .

المعالجة المتممة السابقة كانت تركز على المرحلة B2 و C ( Duke's clasification ) وقارنت التجارب السريرية ما بين الجراحة لوحدها والجراحة مع إعطاء الفلورويوراسيل 5-Fu وكل النتائج أشارت إلى أن تأثير هذه المعالجة المتممة غير كافي كما أجريت المشاركة ما بين 5-Fu و methyl CCNU والفنكرستين MOF كمعالجة متممة ولم تكن النتائج مرضية أيضاً. في عام ١٩٧٨ إستخدمت المشاركة ما بين الـ



5 - Fu ودواء الـ Lcvamisole . وقد أثبتت هذه المشاركة فعالية في الإقلال من معدل النكس ومن معدل الوفيات . بالنسبة لسرطان المستقيم فإن المشكلة هي بالنكس الموضعي Local Recurrence ولذلك فإن كل الباحثين أجمعوا على ضرورة إعطاء المعالجة الكيميائية والمعالجة الشعاعية المتممة للمراحل الثانية والثالثة ST II , ST III ( Duke's B<sub>2</sub> - B<sub>3</sub> - C ) وهناك عدة دراسات قارنت ما بين إعطاء المعالجة الشعاعية بعد العمل الجراحي للمراحل الثانية والثالثة وما بين إعطاء المعالجة الشعاعية والمعالجة الكيميائية بالمشاركة ما بين 5 - Fu و methyl CCNU . وقد أظهرت هذه الدراسات على أن المعالجة الشعاعية والكيميائية هي أفضل من المعالجة الشعاعية لوحدها حيث انقصت المشاركة من معدل النكس ومن معدل حدوث النقائل البعيدة وحديثاً استبعد methyl CCNU وأصبحت المعالجة القياسية المتممة هي الفلورويوراسيل 5 - Fluorouracil .

#### ٩ - سرطان الشرج anal carcinoma :

السرطانة الشائكة الخلايا Squamous cell carcinoma للشرج تشكل ١ - ٤٪ من سرطانات الجهاز الهضمي والجراحة لاتزال هي المعالجة الأساسية ولكن عدة دراسات جربت إعطاء المعالجة الكيميائية والشعاعية في الحالات المبكرة ومن هذه المشاركات المشاركة ما بين الفلورويوراسيل والميتومايسين وهي الأكثر شيوعاً وفعالية .

## المعالجة الكيميائية لأورام الغدد الصم Chemotherapy of Endocrine tumors

### أ- أورام الكظر Adrenal gland tumors :

إن المعالجة الكيميائية لأورام الغدة الكظرية يحددها منشأ السرطان هل هو من القشرة أم من اللب Medulla .

بالنسبة لأورام قشر الكظر Cortical tumor فإن المعدل الوسطي للحياة هو ٣ أشهر وقد تكون هذه الأورام مفرزة للهرمونات وفي هذه الحالة يكون الإنذار أفضل .

ومنذ عام ١٩٤٧ حيث لوحظ أن دواء الـ ( Mitotane ( O . RDDD يؤدي إلى حدوث التمتوت Necrosis في الغدة الكظرية وهو الدواء الأكثر إستخداماً في أورام الكظر ويمكن مشاركته مع الـ 5 - Fu في السرطانات المنتقلة للثثة والكبد .

جرعة الدواء تتراوح ما بين ٨ - ١٠ غ / يومياً وتزافق هذه الجرعة بالاختلاطات المعوية والعصبية المزعجة هناك بعض الأدوية التي حربت في معالجة أورام قشر الكظر ولكن بفعالية قليلة من هذه الأدوية العناصر المقلونة الأديرياميسين - والفلورويوراسيل أما الدواء الذي يتم حالياً دراسته بشكل مفصل فهو السيسبلاتين Cisplatin حيث لوحظ من الدراسات المختلفة أن معدل الإستجابة يصل لـ ٣٥٪ ويتم حالياً دراسة تأثير المشاركة ما بين السيسبلاتين و Mitotane .

ويمكن إستخدام الأدوية الهرمونية المثبطة لتكوين الستيروئيدات مثل Amino glutethemide وهو دواء يستخدم في سرطان الثدي أكثر منه في سرطان قشر الكظر ومن الأدوية الأخرى دواء الـ ketoconazol الذي يثبط تشكل Ergosterol له تأثير مثبط لنمو الخلايا .

الأورام التي تنشأ من لب الكظر نادرة جداً وتشكل جزء من متلازمة أورام الغدد الصم المتعددة Multiple Endocrine neoplasia syndrom والورم الوحيد الذي عرّج

جهازياً Malignant pheochromocytoma حيث إستخدمت المشاركة ماين السيكلوفوسفاميد + فنكرستين و Dtic ولوحظ أن انخفاض مستوى الكاتيكول أمين في الدم وتراجع الورم في ٥٣% من الحالات .

#### ب - سرطان الدرق Thyroid Cancer :

إن معظم سرطانات الدرق تعالج جراحياً وبالمعالجة المثبطة للهرمون الحاث للدرق وفي بعض الحالات باليود المشع <sup>131</sup> I .

الأورام التي تنشأ من الدرق تبدي تباين في سيرها الطبيعي Natural History فهي بطيئة النمو في السرطانات المميزة differentiated carcinoma ( مثل الحليمي - الجريبي ) أما السرطانة اللبية Medullary carcinoma التي تفرز الكالسيوتونين فهي تكون أسرع نمواً أما السرطانات اللامصنعة anaplastic فهي سرطانات قاتلة وسريعة النمو جداً وعميل للاحتياح الموضعي وللاتقال للبعد .

هناك مركبين يستخدمان في المعالجة منذ عقدين ماضيين الأديرياميسين Adriamycin والبليوميسين Bleomycin ثم بعد ذلك تم دراسة تأثير الأديرياميسين عند إستخدامه بمفرده وعند إستخدامه مع المشاركات المختلفة من هذه المشاركة AP (أديرياميسين + سيسبلاتين) - ABV ( أديرياميسين + بليوميسين + فنكرستين ) والمشاركة ABVM ويمكن أن نقول بأن معدل الإستجابة الكلي لهذه المشاركات لايتجاوز الـ ٢٨% .

#### ج - سرطانات البنكرياس المفرزة للهرمونات Pancreatic Endocrine cancers :

ومنها Gastrinomas ( المرافقة مع متلازمة زولنجر - ايلسون Zollinger - Ellison .  
- أورام خلايا الجزر Islet cell tumors ( الأورام التي تنشأ من خلايا ألفا تدعى Glucagonomas والتي تنشأ من خلايا B تدعى insulinomas ومن أورام الجزر مايفرز مادة تثبط السوماتوستاتين somatostatinoma وبعض الأورام تكون غير مفرزة وتسمى أورام خلايا الجزر غير الوظيفية non Function Islet cell Tumors كل هذه الأورام نادرة

جداً ولذلك فإن تقييم المعالجة الكيميائية سوف يكون في دراسات سريرية تجمع كل هذه الأورام وذلك لقلة الحالات .

في دراسة سريرية من هذه الدراسات تم مقارنة إعطاء الـ Streptozotocin بمفرده وإعطائه مشاركة مع الفلورويوراسيل Fu - 5 ولوحظ أن معدل الإستجابة للدواء الوحيد ٦٣٪ ومن المركبات التي لها فعالية في معالجة هذه الأورام الـ Dtic .

#### ٥ - الكارسينويد الخبيث Malignant Carcinoide :

وهي أورام نادرة جداً يمكن أن تصيب أي مكان من الجسم ولكنها عادة ماتصيب الرئة والجهاز الهضمي والتوضعات الأخرى غير الشائعة هي الخنثرة - المبيض - الرحم - عنق الرحم والمنصف وفي هذه الحالة يصيب التيموس ويميل إلى إفراز هرمونات قشر الكظر Adreno cortico tropic ويمكن أن تشاهد في حالات نادرة جداً عند الأطفال .

تشبه خلايا الكارسينويد بالشكل والوظيفة - خلايا سرطان الرئة صغير الخلايا وقد يلتبس التشخيص مجهرياً ما بينهما ويشير بعض الباحثين إلى أن المجموعة القليلة من المرضى المصابين بسرطان الرئة صغير الخلايا والذين عاشوا لفترة طويلة قد تكون هذه المجموعة مصابة بالكارسينويد .

تفرز هذه الأورام مجموعة واسعة من المركبات الحيوية النشطة مثل الكينين Kinins (المسببة للتوهج Flashing) - هيستامين - بروتاغلاندين والسيروتونين وهو أهمها .

في حال وجود نقائل كبدية من الكارسينويد المتوضع في الأمعاء فإن كمية السيروتونين المفرزة تكون عالية وهذا يسبب الإسهال - تليف البريتوان - قصور قلب كين وارتفاع 5-Hydroxy indol acetic acid 5HIAA في البول .

إن المعالجة الجهازية الناجحة أو التخدير العام يمكن أن يؤدي إلى هبوط توتر شرياني شديد والموت أحياناً وهذا ما يدعى Carcinoid Crisis وإن وجود السوماتوستاتين يمكن أن يكون له تأثير واقى لمرضى الكارسينويد عند إجراء الجراحة والتخدير ويمكن

للسوماتوستاتين Somatostatin أن يسيطر على الأعراض عند نسبة كبيرة من مرضى الكارسينويد مثل التوهج أو الإسهال وإقلال مستوى SHIAA في البول .

في العقدين الماضين كان هناك توجه نحو اجراء استئصال للنقائل الكبدية ( حتى ولو كانت متعددة ) أو ربط الشريان الكبدي أو المعالجة الكيميائية عن طريق الشريان الكبدي وكلها ترافقت بنسبة عالية من التحسن وذلك بتراجع الأعراض المزعجة وتراجع في حجم النقائل الكبدية ومن المركبات المستخدمة في معالجة الكارسينويد أثبت التاموكسيفين وفي عدة دراسات سريرية قدرته على السيطرة على الأعراض السريرية وحتى تراجع النقائل الكبدية في بعض الحالات ثم في دراسات تالية فشل في تحقيق هذه النتائج حتى بجرعة ٣٠ مغ / يومياً .

الانزوفرون يمكن أن يؤدي لتراجع الأعراض السريرية في ٦٧٪ من الحالات وعلى الرغم من هذه الإستجابة للانزوفرون والتاموكسيفين لا يمكن إعتبارهما من الأدوية الأساسية ويقى دواء Streptozotocin : هو أكثر الأدوية إستخداماً في معالجة الكارسينويد سواء بمفرده أو بالمشاركات المختلفة ومن الأدوية الأخرى التي جربت في معالجة الكارسينويد وأثبتت فعالية الأكينومايسين والـ DTIC ويمكن أن نقول بشكل عام أن معدل الإستجابة للمعالجة الكيميائية تتراوح ما بين ٢٠ و ٣٠٪ من الحالات ويجب أن نذكر هنا أن نسبة جيدة من المرضى المعالجين بالسوماتوستاتين تراجعت لديهم الأعراض السريرية ويمكن لهذا الدواء أن ينقذ حياة المريض من انخفاض التوتر الشرياني .

## المعالجة الكيميائية لسرطانات الجهاز البولي والتناسلي

### Chemotherapy of Genitourinary Cancers

#### ١ - سرطان البروستات Prostate Cancer :

وهو أشيع السرطانات عند الرجال والسبب الثاني للوفيات الناجمة عن السرطان لديهم ( ١ من كل ١٢ رجل يصاب بسرطان البروستات ) .  
أسباب سرطان البروستات لاتزال غير معروفة إلا إنه نلاحظ أن هناك عوامل عرقية ووراثية حيث يلاحظ أنه أكثر شيوعاً عند الرجال الأفريقيين والأمريكيين وأقل شيوعاً عند الشرقيين كما أشارت بعض الدراسات أن زيادة تناول الدهون قد تزيد من معدل الإصابة .

يشكل سرطان البروستات الموضع localized ٣٠٪ إلى ٦٠٪ من الحالات المشخصة حديثاً وهناك جدال كبير حول أسلوب معالجة هذه الحالات المبكرة وذلك لطول السير الطبيعي ( حوالي ٨ سنوات وسطياً ولكن المرض في هذه الحالة غير عرضي ومن أهم الوسائل التشخيصية نذكر :

١ - المس الشرجي Digital rectal examination .

٢ - الأمواج فوق الصوتية عبر الشرج .

٣ - الخزعة بواسطة الإبرة الموجهة بالأمواج فوق الصوتية .


٤ - الواسمة الورمية P . S . A Prostate Specific Antigen .

٥ - الفوسفاتاز الحامضية الخاصة بالبروستات Prostatic acid phosphatase .

٦ - ومضان العنظام Bone scan صورة صدر بالوضعين والوسائل الشعاعية الأخرى بمنزل

. I . V . P

إذا كان الورم من المرحلة T1a أو A1 وهي المرحلة التي تكشف صدفة عند استئصال



شكل رقم ١٨ يبين تصنيف سرطان البروستات وفق نظام ال T . N . M

البروستات عن طريق الإحليل وعند الفحص المجهرى يلاحظ وجود بؤر من السرطانة الغدية Well - differentiate Adeno carcinom جيدة التمايز ( أقل من ٥٪ من نسيج الغدة ) ويجب أن تكون الفوسفاتاز الحامضية ضمن الحدود الطبيعية وفي هذه الحالة فإن الوفاة الناجمة عن السرطان لا تتجاوز ال ٢٪ ولذلك فإن المعالجة في هذه الحالة تكون بالجراحة أو بتكرار الاستئصال عبر الإحليل TURP في هذه الحالة لا يستطب إجراء ومضات العظام ولوحظ أن أكثر من ١٦٪ من المصابين لهذه المرحلة يعيشون

لأكثر من ٨ سنوات بعد وضع التشخيص ومن المهم جداً متابعة المرضى لفترة طويلة من الزمن .

- المرحلة T1b أو A2 وتكون الغدة في هذه الحالة طبيعية بالجنس ولكن بالفحص المجهرى يلاحظ وجود بؤر مجهرية من السرطانة الغدية متوسطة أو سيئة التمايز (أكثر من ٥٪ من نسيج الغدة ) والفوسفاتاز الحامضية يجب أن تكون طبيعية في هذه الحالة تكون الفترة الوسطية لتطور الورم ( زيادة نموه ) هي ٤ - ٥ سنوات ومعدل الوفاة الناجمة عن السرطان ٥٠٪ عند المرضى غير المعالجين . المعالجة تكون إما بالاستئصال الجذري للبروستات أو المعالجة الشعاعية الجذرية Radical Radiotherapy .

- المرحلة T2a أو B1 حيث تجس في هذه الحالة عقيدة في أحد الفصوص والتشخيص يوضع إما بالخزعة بواسطة الإبرة F.N.b وخاصة الموجهة بالأمواج فوق الصوتية وتكون الفوسفاتاز الحامضية طبيعية في هذه الحالة أيضاً والمعالجة تكون بالاستئصال الجراحي الجذري إذا كان وضع المريض يسمح بذلك وهي المعالجة الأساسية ومعدل الحياة لـ ١٠ سنوات يصل لـ ٥٠ - ٦٠٪ أما المعالجة الشعاعية تعطى في حال وجود مضاد إستطباب للتخدير ولها نفس نتائج المعالجة الجراحية من حيث معدل الحياة .

- المرحلة B2 ( T2b ) وتكون بوجود عقد تصيب كلا الفصين ولكنها لا تلغى الثلم الجانبي Lateral sulcus والفوسفاتاز الحامضية في المصل طبيعية وهناك جدل كبير حول تفريق المرحلة B1 و B2 تشريحياً مرضياً . يعتبر حجم الورم مشعراً جيداً للإنذار إذ يسوء الإنذار إذا كان حجم الورم أكبر من ٤ سم ٣ بالنسبة لهذه المرحلة فإن المعالجة الجراحية والمعالجة الشعاعية لهما نفس النتائج والاختيار مابين الأسلوبين متعلق بعوامل خاصة بالمريض والطبيب المعالج .

- المراحل T3a - T3b - T4 أو المرحلة C : يكون الورم شاملاً للفصين أو يصيب حدار الحوض أو يحتاج الحويصل المنوي Seminal vesical أو إصابة المثانة والمستقيم مع ارتفاع الفوسفاتاز الحامضية المعالجة لهذه المراحل تكون بالمعالجة الشعاعية الجذرية مع المعالجة



الهرمونية الباكورة ويتوفر حزمة التزونات حديثاً تحسنت نتائج المعالجة الشعاعية ولكن لسوء الحظ الاختلاطات الشعاعية للمعالجة بالتزونات شديدة وخاصة تلك التي تحدث في المثانة والأمعاء .

- في حال وجود إصابة عقدية ( المرحلة D1 ) يكون الإنذار سيء و ٨٥٪ إلى ٩٠٪ من المرضى سوف يصابون بالنقائل البعيدة خلال الـ ١٠ سنوات ولايزال السؤال قائماً هل تعطى المعالجة الهرمونية قبل ظهور النقائل ؟ أم تؤجل إلى وقت ظهورها ؟ وقد يستفيد المرضى من استئصال الخصيتين .

المعالجة الهرمونية :

إن معالجة سرطان البروستات المتقدم موضعياً أو الحالات المترافقة مع النقائل البعيدة تكون باستئصال الخصيتين وتحسن الأعراض لدى معظم المرضى وقد يتحسن معدل الحياة عند بعضهم ثم بعد ذلك يعطى دواء ( DES ) Diethylstilbesterol وجرعة ١مغ يومياً لتخفيف الآثار الجانبية الوعائية والقلبية لهذا الدواء ويفضل معظم الأطباء استئصال الخصيتين على استخدام هذا الدواء وذلك لأن استئصال الخصيتين لايزافق مع التثدي والاختلاطات القلبية وينقص التسترون للحد الأعظمي أما الحسنة الوحيدة لدواء DES هي تجنب العمل الجراحي .

يمكن استخدام مضاد الأندروجين Flutamide وهو دواء حديث وآثاره الجانبية قليلة .

في عام ١٩٧٠ تم تركيب الأدوية الشبيهة بالهرمون المحرر للهرمون الملوتن LHRH agonists مثل دواء Leuprolide واستخدمت هذه الأدوية في معالجة سرطان البروستات وتمتع بنفس تأثير دواء DES ولكن آثارها الجانبية أقل والسيئة الوحيدة هي طريقة إعطاء الدواء بالحقن تحت الجلد يومياً ولذلك تم تطوير مركبات حديثة مديدة التأثير Long acting LHRH agonists مثل <sup>R</sup> zoladex وتعطى شهرياً .

يمكن استخدام الواسمة الورمية PSA في معايرة فعالية المعالجة الهرمونية لأن قيمة هذه الواسمة تتناسب مع حجم الورم في البروستات .

دور المعالجة الكيميائية في سرطان البروستات :

لايزال دور المعالجة الكيميائية في تدبير سرطان البروستات غير واضح وذلك

للسباب التالية :

- ١ - صعوبات في أسلوب المعالجة .
  - ٢ - كبر سن المرضى وبالتالي نقص تحملهم للمعالجة الكيميائية .
  - ٣ - تنوع السير الطبيعي لهذا الورم .
  - ٤ - فشل معظم الدراسات السريرية في إثبات أي تحسن ناجم عن المعالجة الكيميائية بدواء وحيد مثل الأدريناميسين Adriamycin – سيكلوفوسفاميد Cyclophosphamide – فلورويوراسيل 5-flourouracil والميسبلاتين Cisplatin .
- أو بالمشاركات الدوائية المختلفة
- لذلك فإن معظم الأطباء يفضلون إستخدام المعالجة الهرمونية مشاركة مع المعالجة الشعاعية ( الملطفة أو الجذرية ) .

## ٢ - سرطان الخصية Testicular Cancer :

من أشيع السرطانات التي تصيب الشبان ما بين الـ ١٥ و ٤٣ سنة يصيب العرق الأبيض ( القوقاز خاصة ) أكثر من الأفارقة . ويمكن أن تكون بعض التشوهات الخلقية من العوامل المؤهبة مثل الخصية الهاجرة Cryptorchinism وتترافق بزيادة بمعدل الإصابة ٥ - ١٠ مرات أكثر من الشخص العادي كما لوحظ زيادة في معدل الإصابة بسرطان الخصية عند المصابين بالفتق الإربي الخلقي Congenital Inguinal Hernia وعند المصابين بالشوك المشقوق Spina Bifida ويزداد معدل الإستجابة في حال وجود قصة عائلية .

- التشريح المرضي :

١٣٪ من الحالات من أورام الحبل الجنسي Sex - cord - stromal tumors أو اللمفوما Lymphoma .

- الغالبية العظمى تكون من نوع الخلايا المولدة Germ cell tumors ويشكل الورم المنوي seminoma ٥٠ - ٦٠٪ منها .

- السرطانة الجنينية Embryonal carcinoma تشكل ٢٠ - ٣٠٪

- المسخوم teratoma ١٠ - ٢٠٪

- السرطانة المشيمية chorio carcinoma تشكل ٥٪

- الواسمات الورمية tumor Markers

BHCG ( Human chorionic Gonado tropin - B ) وألفا فيتوبروتين AFP من أهم الواسمات الورمية في تشخيص ومتابعة العلاج بالنسبة لأورام الخصية .

١٠ - ١٥٪ من حالات الورم المنوي يمكن أن تترافق بارتفاع ملحوظ في هاتين

الواسمتين ولكن الورم المنوي النقي Pure لا يمكن إنتاج AFP

- السرطانة المشيمية تفرز الواسمة BHCG بشكل كبير بينما يفرز ورم الكيس المحي

Yolk sac tumor الواسمة AFP وتفرز السرطانة الجنينية الإنئين معاً .

من الواسمات الأخرى نذكر Lactate Dehydro Genase LDH وتفرز من الأورام المنوية وغير المنوية ورغم أنها غير نوعية إلا أن لها قيمة تشخيصية هامة في حالة النكس كما أن ارتفاعها لا يشير بالضرورة لوجود نقائل كبدية ولكنها تشير لدرجة نمو وإمتداد الورم .

#### التصنيف Staging :

وسوف نستعرض التصنيف السريري الأكثر شيوعاً :

- المرحلة الأولى SI : الورم محدود في الخصية .
- المرحلة الثانية SII : الورم يمتد للعقد اللمفاوية الناحية .
- المرحلة الثالثة SIII : الورم ينتقل للبعد Distant Metastases .
- معالجة الورم المنوي treatment of seminoma :

المعالجة الشعاعية للعقد اللمفاوية خلف اليريتوان Retro peritoneal lymph nodes في المرحلة الأولى SI تترافق بمعدل حياة لـ ٥ سنوات يصل حتى ٩٨٪ والساحة المستخدمة تشبه عصاة الهوكي Hockey stick Field الحد العلوي للساحة هو الحجاب الحاجز ( الفقرة الظهرية الحادية عشر T11 ) والحد السفلي عند الندبة المغنية والحدود الجانبية هي سرتي الكليتين ويتم حماية الخصية الأخرى ولكن رغم ذلك فإنها تتعرض إلى ١٪ من الجرعة المستخدمة في حال إصابة الصنف فإن الساحة العلاجية تشمل نصف الصنف في جهة الإصابة وسوف نستعرض فيمايلي تصنيف الورم المنوي وفقاً للنظام المتبع في مشفى Royal Mardsen .

- المرحلة الأولى SI : الورم محدود في الخصية .
- المرحلة الثانية SII : A - كتلة خلف اليريتوان قطرها أقل من ٢سم - أو إيجابية تصوير الأوعية اللمفاوية Lymph angia garaphy .
- B - كتلة خلف اليريتوان بقطر ما بين ٢ و ٤,٩ سم .
- C - كتلة خلف اليريتوان بقطر ما بين ٥ و ٩,٩ سم .

D - كتلة خلف البريتوان بقطر أكبر من ١٠ سم .

- المرحلة الثالثة StIII : إصابة العقد اللمفاوية فوق الحجاب .

- المرحلة الرابعة StIV : إنتشار خارج العقد اللمفاوية .

في المرحلة الثانية ينخفض معدل الحياة لـ ٥ سنوات إلى ٧٩٪ لذلك فإن المعالجة تكون كما في المرحلة الأولى ولكن يشعع النصف بشكل وقائي المعالجة للمرحلة الثالثة والرابعة هي نفسها معالجة الأورام غير المنوية في نفس المرحلة .

- معالجة المرحلة الأولى من الأورام غير المنوية StI non seminoma :

العلاج التقليدي لهذه المرحلة هو الإستئصال مع تجريف العقد اللمفاوية خلف البريتوان وتسمح هذه المعالجة بتحديد الحالات المترافقة مع النقائل المجهريّة أو الصغيرة للعقد التي لا ترى بواسطة التصوير الطبقي المبرمج CT أو بتصوير الأوعية اللمفاوية وتسمح أيضاً بتعقيم منطقة خلف البريتوان إلا أنها تترافق ببعض الإختلاطات مثل شلل الأمعاء - الإلتان - القذف الخلفي Retrograde ejaculation وهذا مايجعل الطبيب والمريض يبحثان عن طرائق بديلة للمعالجة وأحد أنجح هذه الطرق هي تجريف العقد خلف البريتوان مع الحفاظ على الأعصاب Nerve Sparing Retroperitoneal Lymph Nodes dissection وهي تمنع حدوث القذف الخلفي أو الراجع .

- قد يلجأ بعض المراكز إلى تشعيع العقد اللمفاوية خلف البريتوان وإعطاء ٤٠ - ٥٠ غري ولكن الدراسات السريرية لم تثبت أي تبدل في معدل الحياة عند إعطاء المعالجة الشعاعية وفي حال عدم إعطائها ولذلك فإن بعض المراكز يكفي بالمراقبة الدقيقة بإجراء التصوير الطبقي المبرمج C. Tscan للبطن والحوض كل شهرين ومعايرة الواسمات الورمية وإجراء الفحص السريري كل شهرين ايضاً .

- المعالجة الكيميائية المتممة Adjuvent في هذه المرحلة قد تقلل من معدل النكس في العقد اللمفاوية وقد تقلل أيضاً من حدوث النقائل البعيدة وهي طريقة بدأت تجلب الأنظار في الآونة الأخيرة على الرغم من أنها يمكن أن تؤدي لمعالجة زائدة عند ٧٥ -

٨٠٪ من المرضى ويمكن القول أن وجود الغزو الورمي للأوعية الدموية Vascular Invasion ونسبة السرطانة الجنينية في الورم البدئي هي أكثر العوامل المؤهبة لحدوث النكس وبالتالي يمكن تطبيق المعالجة المتممة في هذه الحالة وباختصار نقول أن معالجة المرحلة الأولى تكون إما بالاستئصال وتجريف العقد اللمفاوية خلف البريتوان مع الحفاظ على الأعصاب أو بالاستئصال مع المراقبة الدقيقة و ٧٥٪ من المرضى يختارون الطريقة الأولى لأنها أكثر دقة .

#### علاج المرحلة الثانية StII من الأورام غير المنوية non Seminoma StII :

عند كون الإصابة العقدية مجهرية StII A فإن معدل النكس يصل حتى ٤٠٪ وفي حالة الإصابة العيانية للعقد ولكن بقطر أقل من ٥ سم StII B ومعدل النكس ٥٠٪ وفي المرحلة StII C يصل معدل النكس حتى ٦٠٪ لذلك فإن دور المعالجة الكيميائية المتممة أساسي حيث ينقص معدل النكس للصفر ومعظم الباحثين يفضلون إعطاء ٣ - ٤ أشواط من المشاركات الحاوية على سيسبلاتين ويدخر تجريف العقد اللمفاوية خلف البريتوان للحالات التي يستمر فيها وجود الورم بعد المعالجة الكيميائية .

#### - علاج المرحلة الثالثة للأورام غير المنوية non seminoma STIII :

يمكن لسرطان الخصية المنتشر أن يشفى بالمعالجة الكيميائية باستخدام المشاركات المختلفة مثل PVB سيسبلاتين بجرعة ٢٠ مغ / ٢م يومياً ٥ أيام ، فنبلاستين Vinblastine بجرعة ٠,١٥ مغ / كغ في اليوم الأول والثاني والبليوميسين Bleomycin بجرعة ٣٠ مغ / ٢م في اليوم ٢ و ٩ و ١٦ وتكرر هذه المشاركة كل ٣ أسابيع وهي من المشاركات الفعالة جداً .

ومن الأنظمة العلاجية الأخرى ١ - VAB ( فنبلاستين + اكيثومايسين - د + بليومايسين ) وفي حال إضافة سيسبلاتين ٢ - VAB و ٣ - VAB و ٤ - VAB وبجرعة ١٢٠ مغ / ٢م كل ٣ - ٤ أسابيع يرتفع معدل الشفاء من ١٥٪ إلى ٥٠٪ .

ومن الأدوية الفعالة الأخرى دواء Etoposide ( VP16 ) إذ يتمتع بتأثير تعاضدي Synergistic مع السيسبلاتين ومن المشاركات الحاوية على الدوائين المشاركة PEB سيسبلاتين ٢٠ مغ / ٢م يومياً × ٥ أيام ( ١٢٠ مغ / ٢م كل ٣ أسابيع ) + Etoposide ١٠٠ مغ / ٢م يومياً × ٥ أيام + بليومايسين ٣٠ مغ / ٢م في الأيام ٢ و ٩ و ١٦ .

ومن الأدوية الحديثة والفعالة في معالجة سرطان الخصية دواء ifosfamide ويستخدم بشكل أساسي بعد فشل المعالجات الأخرى ويتم حديثاً المقارنة مابين تأثير المشاركة PEB والمشاركة PEI ( سيسبلاتين + Etoposide + ifosfamide ) لمعرفة هل فعالية الأخير أكثر من فعالية البليومايسين في معالجة الحالات المتقدمة .

يمكن أن نصنف المرضى إلى مجموعة ذات الخطر العالي High Risk أو إلى المجموعة ذات الخطر المنخفض Low Risk اعتماداً على مستوى LDH و BHCG في المصل وعلى حجم النقائل ( خاصة الرئوية ) .

أكثر الآثار الجانبية للمعالجة الكيميائية هي الأذية الكلوية ( فشل كلوي - ارتفاع التوتر الشرياني ) - نقصان المغنيزيوم المزمن وهو إختلاط نادر الحدوث - العقم وهذا بالنسبة للمشاركات الحاوية على السيسبلاتين Cisplatin في المشاركات الحاوية على البليومايسين Bleomycin ٤٠٪ من المرضى يمكن أن يعانون من ظاهرة رينود Reynaud's phenomenon بالنسبة للعقم معظم المرضى يتمثلون للشفاء منه خلال ٢ - ٤ سنوات من إنتهاء المعالجة الكيميائية .

### ٣ - سرطان الكلية Renal Carcinoma :

أشيع الأنواع النسيجية التي تصيب الكلية هو clear cell carcinoma أما التي تصيب حويضة الكلية فأشيعها سرطانة الخلية الإنتقالية Transitional cell carcinoma .

#### - التصنيف Staging :

وسوف نستعرض نظام روبسون Robson staging system :

- المرحلة الأولى SI : الورم محدود في الكلية .

- المرحلة الثانية SII : الورم يمتد للنسيج الشحمي حول الكلية Perirenal Fat ولكنه يبقى محدوداً ضمن صفاق Gerota .

- المرحلة الثالثة SIII :

A - الورم يحتاج الوريد الكلوي أو الأحوف Vena Cava .

B - الورم يصيب العقد اللمفاوية Lymph Nodes .

C - A و B معاً .

- المرحلة الرابعة SIV :

A - ارتشاح الورم في الأعضاء المجاورة ( ما عدا الكظر ) .

B - نقائل بعيدة Distant Metastases .

- معالجة سرطان الكلية :

المعالجة الأساسية هي الاستئصال الجراحي ويجب أن تجرى حتى ولو كان هناك إصابة للأعضاء المجاورة ومعدل الحياة لـ ٥ سنوات بعد الإستهصال ٥ - ١٠٪ تستطب المعالجة الشعاعية كعلاج ملطف palliative عند وجود نقائل عظمية أو دماغية وعلى الرغم من أن سرطان الكلية من الأورام المقاومة للأشعة إلا أن معظم التقارير تشير إلى تحسن الأعراض لدى معظم المرضى وخاصة الألم بعد المعالجة الشعاعية .

سرطان الكلية من أكثر الأورام التي يمكن أن يحدث فيها التراجع العفوي Spontaneous regerssion كما أن ملاحظة شيوع الإصابة عند الذكور أدى إلى الإستهخدام المبكر



للمعالجة بالبروجيسترون حيث قد تؤدي للهجوع بنسبة ٢٪ ثم بعد ذلك تم اختبار مضادات الاندروجين مثل Flutamide حيث أشارت إحدى الدراسات أن نسبة الهجوع باستخدام هذا الدواء تصل حتى ٦٪ في دراسة لمجموعة الأورام الجنبوية الغربية ( SWOG ) South westren oncology Group تم إستخدام التاموكسيفين Tomoxifen الذي ترافق بمعدل إستجابة ٥٪ من كل هذه الدراسات يمكن أن نقول أن دور المعالجة الهرمونية ضئيل .

- المعالجة الكيمائية Chemo therapy :

لقد تم دراسة دور المعالجة الكيمائية في سرطان الكلية المنتشر بشكل مكثف ولم يلاحظ من خلال الدراسات المختلفة أي دواء يمكن إعتباره دواءً قياسياً Standard therapy على الرغم من اختبار مجموعة كبيرة من الأدوية ولوحظ حديثاً أن Flourodeoxy uridin ( FUDR ) يمكن أن يكون له بعض الفعالية إلا أن المشاركات الدوائية المختلفة لم تحقق نتائج مرضية ولذلك لا تعطى بشكل روتيني في معالجة سرطان الكلية.

يعتبر سرطان الكلية من السرطانات التي تحوي على أعلى كمية من بروتين يدعى P - Glycoprotein والذي يعمل كمضخة للدواء Drug pump حيث يرتبط هذا البروتين بالأدوية الكيمائية ويخرجها خارج الخلية وهذا مايجعل سرطان الكلية مقاوماً للمعالجة الكيمائية وهناك دراسات سريرية حديثة تحاول التغلب على هذه الآلية للمقاومة الدوائية بإستخدام بعض الأدوية مثل الفيرباميل Verapamil أو السيكلوسبورين cyclosporine .

- الإنترفيرون والحرائك الخلوية الأخرى cytokines في معالجة سرطان الكلية : سرطان الكلية من أكثر الأورام التي حرب فيها الإنترفيرون وذلك لمقاومته للمعالجة الكيمائية ولإمكانية حدوث التراجع العقوي وأكثر التقارير تشير إلى إمكانية حدوث إستجابة واضحة في ١٦٪ من الحالات .

بالنسبة للجرعة المثالية وطريقة إعطاء الانترفيرون فهي متنوعة فالعالم Sarana يشير إلى أن الجرعة المنخفضة (  $5 \times 10^6$  Mm / م / يومياً ) تترافق بمعدل إستجابة ٢ - ٣٪ أما الجرعة المتوسطة (  $5 - 20 \times 10^6$  Mm / م / يومياً ) بمعدل الإستجابة ٢٠٪ والجرعة أكثر من (  $20 \times 10^6$  Mm / م / يومياً ) تترافق بانخفاض معدل الإستجابة ( ١٠ - ١٢٪ ) .

وفي دراسة للعالم Quesada تم فيها إعطاء الانترفيرون بجرعة  $2 \times 10^6$  Mm / م / يومياً و بجرعة  $20 \times 10^6$  Mm / م / يومياً فلم يلاحظ أي إستجابة في الجرعة المنخفضة بينما توافقت الجرعة العالية بمعدل إستجابة ٢٧٪ .

- بعد دخول الانترلوكين ٢ (  $inter\ leukin - 2$  ) في الدراسات السريرية يمكن أن نقول بأن هناك ثورة في معالجة سرطان الكلية حيث يمكن أن يكون العلاج الوحيد أو يعطى مشاركة مع الانترفيرون وبشكل مختصر فإن معالجة سرطان الكلية المنتشر يجب أن تتضمن الإنترفيرون أو الانترلوكين أو كليهما .

#### ٤ - سرطان المثانة Bladder Cancer :

##### الاسباب Etiology :


- بعض المواد الكيميائية ذات التأثير المسرطن على المثانة مثل صبغة الانيلين aniline dyes
  - ٢ - نفتلامين naphthylamine - 2 والبنزيدين Benzidine .
  - الزمرة المعرضة للخطر High Risk : العاملون في صناعة المطاط والدهانات والأكبال الكهربائية وصناعة الجلود .
  - بعض الأدوية مثل phenacetin .
  - التدخين وتشعيع الحوض .
  - الإصابة بالمنشقات ( البلهارسيا ) schisto somiasis : أحد أسباب السرطانة الشائكة الخلايا squamous cell carcinoma
- التشريح المرضي pathology :
- ٩٠٪ من الحالات من نوع سرطانة الخلية الإنتقالية Transitional cell carcinoma وتصنف إلى جيدة التمايز - متوسطة التمايز سيئة التمايز أو درجة أولى وحتى الثالثة G1 - 3 باقي الحالات تكون من نوع السرطانة الغدية Adeno carcinoma أو من نوع السرطانة شائكة الخلايا .

##### التصنيف Staging :

وسوف نستعرض تصنيف أورام المثانة وفقاً للنظام العالمي T . N . M :

- Tis - سرطان في موضعه insitu .
- Ta - الورم المحدود في المخاطية ( أو الورم الحليمي ) papillary .
- T0 - لا يوجد دليل على الورم البدئي .
- T1 - الورم يحتاج طبقة الـ lumina propria .
- T2 - الورم يحتاج الطبقة السطحية من الطبقة العضلية Superficial Muscle .
- T3 - a - الورم يحتاج طبقة العضلية Deep Muscle .
- b - الورم يحتاج النسيج الشحمي المحيط بالمثانة أو يحتاج كامل جدار المثانة .

- T4 - الورم يصيب الأعضاء المجاورة .
- a - الورم يحتاج البروستات - الرحم - المهبل .
- b - الورم يصيب جدار الحوض أو جدار البطن .



شكل رقم ١٩ يبين تصنيف سرطان القولون وفق نظام الـ T . N . M

• معالجة الأورام السطحية ( T<sub>2</sub> - T<sub>1</sub> - Tis ) Cancer Management of superficial

إن تدبير الأورام السطحية للمثانة من المواضيع الهامة التي نوقشت في عدة دراسات وتبين أن هناك معدل وسطي لتحول هذه الأورام إلى سرطان غازي invasive يصل حتى ١٠٪ ومعدل الحياة لـ ٥ سنوات لهذه الأورام يصل حتى ٨٦٪ .

يتم اختيار المعالجة المناسبة بناءً على عوامل انذارية هامة منها درجة الخبث النسيجية grade فالأورام العالية الخبث High grade بغض النظر عن تصنيفها تترافق بانذار سيء ومن عوامل الإنذار السيء تعدد البؤر Multicentricity - عدم امكانية استئصال الآفة بشكل تام - الإنتشار الخفي للبروستات واستمرار التعرض للمادة المسرطنة .

المعالجة القياسية للأورام السطحية هي الإستئصال عبر الإحليل Trans Urethral Resection of Bladder Tumor ( TURB ) مع أو بدون التخثير الكهربائي electro cautery - المعالجة الكيميائية بالحقن داخل المثانة - المعالجة المناعية داخل المثانة أو بالمعالجة الضوئية داخل المثانة باستخدام الليزر .

في حال كون الإستئصال الجراحي غير تام فإنه من الشائع إعطاء المعالجة الكيميائية بالحقن داخل المثانة حيث تقلل من حدوث النكس الموضعي وتؤجل من إستئصال المثانة ومن الأدوية التي يمكن إستخدامها Mitomycin c - Epodyl - thiotepa - Adriamycin ولقاح السل BCG ونظراً للإنتشار الواسع للحقن داخل المثانة فإنه من الضروري معرفة الآثار الجانبية لهذه المعالجة فإستخدام دواء thiotepa يمكن أن يترافق بتثبيط نقي العظم بنسبة ١٥ - ٢٠٪ ولابيضاض الدم Leukemia أما دواء Mitomycin فيترافق بحدوث التهاب المثانة الكيميائي في ٨٠٪ من الحالات ولالتهاب جلد بالتماس contact dermatitis في القضيبي والصفن وأحياناً في اليدين بنسبة ٢٠٪ .

حقن لقاح الـ BCG داخل المثانة من أكثر العلاجات فعالية في معالجة الأورام السطحية وأكثر الاختلاطات حدوثاً هو تحريش المثانة ( ٩٠٪ ) كما يمكن أن يحدث ما يسمى بـ BCGosis وتعالج بإعطاء الازونيازيد isonia zid .

ويتم حالياً دراسة إعطاء الانترفيرون ألفا داخل المثانة ويمكن إعطاء جرعة عالية تصل حتى ١٠٠ مليون وحدة .

الحالات المنتشرة من السرطانة الموضوعة Diffuse insitu تعالج باستئصال المثانة لأن أكثر من ٧٠٪ من الحالات تتحول إلى سرطانة غازية invasive .

• معالجة السرطانات الغازية للطبقة العضلية Muscle invasive tumors ،  
نظراً لكون جدار المثانة رقيقاً فإن اجتياح الورم للطبقة العضلية يمكن أن يؤدي لانتشار الورم للأعضاء المجاورة بسهولة ولذلك فإن المعالجة الأساسية هي استئصال المثانة الجذري Radical Cystectomy ويشمل استئصال المثانة - البروستات - الرحم - البوقين والمبيضين مع تجريف العقد اللمفاوية وتحويل مجرى البول أما دور المعالجة الشعاعية فلا يزال يثير جدلاً كبيراً إلا أنه يمكن أن تستخدم المعالجة الشعاعية قبل الإستئصال .

الإنذار سيء سواءً بالمعالجة الجراحية أو الشعاعية ولم يتغير الإنذار عند إضافة المعالجة الكيميائية الجهازية بإستخدام المشاركات مثل MVAC ( ميثوتركسات + فنبلاستين + أدرياميسين + سيسبلاتين ) أو المشاركة MVC .

• معالجة سرطان المثانة المنتشر metastatic bladder cancer ،  
هناك عدة أدوية فعالة يمكن إستخدامها في معالجة الحالات المتقدمة منها  
السيسبلاتين - ميثوتركسات - الأدريناميسين - سيكلوفوسفاميد - فنبلاستين -  
ميثومايسين - فلورويوراسيل والدواء الحديث الشبيه بالميتوتركسات المسمى  
(10EDAM) 10 - deazo amino pterin تستخدم هذه الأدوية في مشاركات دوائية  
مختلفة ومن المشاركات الفعالة نذكر MVAC والمشاركة MCV ( ميثوتركسات +  
سيسبلاتين + فنبلاستين ) وترافقت بمعدل إستجابة يتراوح ما بين ٥٦ و ٦٩٪ وبالرغم  
من هذه المعدلات العالية للإستجابة إلا أن الفائدة من المعالجة بالمشاركة لا تزال بحاجة  
لكثير من الدراسة .

## المعالجة الكيميائية لأورام الأعضاء التناسلية عند الإناث

### Chemotherapy of the Female Genital tract

#### ٨- سرطان باطن الرحم Carcinoma of the Endometrium :

من أشيع أورام الأعضاء التناسلية عند النساء وأكثر الأعراض شيوعاً هو النزف الرحمي واضطرابات الطمث ولذلك تشخص معظم الحالات بمراحل مبكرة .

#### - التشريح المرضي Pathology :

- ٧٠٪ من الحالات تكون من نوع السرطانات الغدية Adenocarcinoma

- باقي الحالات تكون من الأنواع التالية :

- السرطانة الغدية الشائكة اخلايا AdenoSquamous carcinoma

- adeno canthoma

- clear cell carcinoma

- السرطانة المصلية الحليمية papillary serous carcinoma

- معظم المريضات بدنيات ومصابات بارتفاع التوتر الشرياني أو السكري .

- إذا كان الورم محصوراً في الرحم فإن المعالجة المثالثة تكون باستئصال الرحم والملحقات .

- معالجة الحالات المتقدمة أو الناكسة :

أقل من ١٥٪ من حالات تشخص بمراحل متقدمة و ٣٠ - ٤٠٪ من الحالات المشخصة بمرحلة مبكرة تتعرض للنكس وفي هذه المرحلة تستطب المعالجة الجهازية التي تشمل المعالجة الهرمونية والمعالجة الكيميائية .

#### أ- المعالجة للمهرمونية :

من الواضح والثابت سريرياً أن سرطان باطن الرحم من الأورام المتأثرة بالهرمونات فلقد اتهم الاستروجين كأحد الأسباب ولذلك يستخدم البروجسترون في

المعالجة حيث أشارت التقارير على أن معدل الاستجابة الهرمونية يصل حتى ٣٣٪ ويعتمد ذلك على درجة خبث الورم وحالة المستقبلات الهرمونية فالسرطانات جيدة التمايز تميل للاستجابة للمعالجة بالبروجسترون (نسبة إيجابية المستقبلات عالية) من أكثر مركبات البروجسترون استخداماً هو ميدروكسي بروجيسترون (MPA) Medroxyprogesteron Acete والجرعة الدوائية هي ١٥٠ مغ / يومياً ويدرس حالياً بشكل مكثف استخدام التاموكسيفين Tamoxifen في معالجة سرطان باطن الرحم .

#### بـ . المعالجة الكيميائية ،

لقد تم دراسة أكثر من ١٨ دواء خلال العقدين الماضيين إلا أن هناك دوائين فقط أثبتا فعالية واضحة في معالجة سرطان باطن الرحم هما الأديرياميسين والسيكلاتين ومشتقاته ( الكاربوبلاتين ) أما دور المشاركات الدوائية فلقد تم تقييمه في عدة دراسات سريرية منها دراسة مجموعة الأورام النسائية ( GOG ) Gynecologic oncology Group حيث قارنت هذه الدراسة ما بين النظام العلاجي CAF ( سيكلوفوسفاميد + أديرياميسين + فلورويوراسيل ) مع الميديروكسي بروجيسترون والنظام العلاجي MF ( ميلفالان + فلورويوراسيل ) والميديروكسي بروجيسترون لوحظ أن النظام العلاجي الأول أكثر فعالية من الثاني حيث ترافق بمعدل استجابة ٩٤ ٪ بينما معدل الاستجابة في الثاني كان ٧٥ ٪ إلا أن النتائج في الدراسات السريرية التالية لم تكن مرضية حيث كان معدل الاستجابة للنظام الأول ٣٨ ٪ مقابل ٣٦ ٪ للنظام العلاجي الثاني .

ويمكن أن نقول بأن الحالات الجيدة التمايز ( grade 1,2 ) تعالج بالبروجيسترون في حال كون المستقبلات الهرمونية إيجابية أما في حال كون المستقبلات سلبية أو في حال فشل المعالجة الهرمونية يمكن استخدام المعالجة الكيميائية وبدواء وحيد مثل الأديرياميسين .



أما الحالات المتقدمة أو الناكسة فتعالج بالمشاركات الدوائية بالإضافة للمعالجة الهرمونية .

• معالجة المرض المحدود ، **limited disease** •

في المراحل المبكرة للورم ( مرحلة أولى وثانية ) هناك عدة عوامل تشريحية مرضية تحدد إمكانية حلوث النكس وهي :

١ - درجة الخبيث النسيجية **Histological Grade** .

٢ - عمق الإصابة في عضلة الرحم .

٣ - إصابة الورم لخارج الرحم .

٤ - إصابة العقد اللمفاوية .

٥ - موجودات الفحص الخلوي للبريتوان .

في حال كون المريضة من الزمرة ذات الخطر المنخفض **lowRisk** ( الورم جيد التمايز - لا يوجد غزو للطبقة العضلية - لا يوجد عقد لمفاوية مصابة - لا يوجد امتداد لخارج الرحم الفحص الخلوي للبريتوان سلمي ) فإن معدل الحياة لـ ٥ سنوات بعد العمل الجراحي ٩٠ ٪ ولا تحتاج لأي علاج آخر .

أما في حال وجود واحد أو أكثر من العوامل المذكورة سابقاً فإن المريضة تحتاج لاعطاء المعالجة المتممة **Adjuvent therapy** وخاصة المعالجة الشعاعية للاقلال من النكس ولكن الدراسات المختلفة لم تثبت أي فائدة من اضافة المعالجة الكيميائية إلى المعالجة الشعاعية ولهذا لا يوجد حتى الآن أي دليل علمي على استخدام المعالجة الكيميائية المتممة في المراحل المبكرة من سرطان باطن الرحم .

٢ - **الفرن الرحمي Uterine Sarcomas** :

إن إصابة الرحم بالفرن أقل شيوعاً من الإصابة بسرطان باطن الرحم ويتوافق الفرن بمعدل عالي للنكس ( ٥٠ ٪ ) حتى بالمراحل المبكرة كما يميل الفرن للانتقال للبعد وهذه السببين فإن الفرن مناسب جداً لتطبيق المعالجة الكيميائية ولكن ندرة

الاصابة بهذا المرض جعل الحالات المدروسة محدودة .

#### - الأنواع النسيجية :

أشيع الأنواع حدوثاً ٩٠ ٪ هما :

Mixed Mesodermal sarcoma والغرن العضلي الأملس Leomyosarcoma وأما الأنواع الأقل شيوعاً فهو Endometrial stromal sarcoma والنوعين الأولين هنا الأكثر دراسة من ناحية تأثير المعالجة الكيميائية ولكن استجابتهما للمعالجة مختلفة لذلك سوف يدرس كل نوع على حدة .

#### - معالجة الحالات المتقدمة أو الناكسة :

##### ١- المعالجة بدواء وحيد single agent ،

- بالنسبة للنوع النسيجي Mixed Mesodermal فهناك ٦ عناصر دوائية تم دراستها ولكن اثنان فقط أثبتا فعالية واضحة وهما السيسبلاتين و ifosfamide الذي يعطى بجرعة ١٠٥ غ/م<sup>٢</sup> يومياً ولمدة ٥ أيام كل ٤ أسابيع ويبدو أنه أكثر الأدوية فعالية حتى هذا اليوم السيسبلاتين cisplatin جرعته ما بين ٧٥ - ١٠٠ مغ / م<sup>٢</sup> كل ٣ أسابيع الأدريامايسين كان أقل فعالية وجرعته ٦٠ مغ/ م<sup>٢</sup> كل ٣ أسابيع وفي دراسة أخرى كانت جرعته ٧٥ - ٩٠ مغ/ م<sup>٢</sup> . من الأدوية الأخرى التي درست ولم تظهر أي فعالية نذكر Etoposide و mitoxantrone و piperazinedione .

- في الغرن العضلي الأملس درست أيضاً ٦ أدوية أكثرها فعالية كان الأدريامايسين ( Doxorubicin ) والجرعة الدوائية ٦٠ مغ/ م<sup>٢</sup> كل ٣ أسابيع دواء الـ ifosfamide كانت فعاليته متوسطة وكذلك الـ Etoposide أما الأدوية التي لم تبدي أي فعالية فكانت السيسبلاتين cisplatin و Mitoxantrone و piperazindione .

##### ب- المشاركات الدوائية Combination chemotherapy :

لم تأخذ الدراسات التي قيمت المشاركات المختلفة بعين الاعتبار أن هناك فرق في الاستجابة ما بين الأنواع النسيجية للغرن .

في الدراسة الأولى جرى تقييم الأدريناميسين كدواء وحيد أو مشاركة مع الـ Dtic ( Dacarbazine ) ولم يلاحظ أي فرق في النتائج .

الدراسة الثانية قيمت استخدام الأدريناميسين بمفرده ومشاركة مع السيليكوفوسفاميد cyclophosphamide ولوحظ أن هناك فرق بسيط في النتائج مابين الاسلوبين ولذلك فإن مزيد من الدراسات يجب أن تجرى لمعرفة تأثير المشاركة الدوائية ويمكن أن نقول أنه لا يوجد دليل يدعم استخدام المشاركة الدوائية في معالجة الحالات المتقدمة أو الناكسة في الوقت الحاضر .

بالنسبة للمراحل المبكرة لا يوجد أي دور محدد للمعالجة المتممة بعد الاستئصال الجراحي التام ولذلك فهي غير مستطبة .

### ٣ - سرطان عنق الرحم Carcinoma of the cervix :

المعالجة الأساسية للحالات المبكرة إما الجراحة أو المعالجة الشعاعية أما الحالات التي تتعرض للنكس بعد هذه المعالجة أو الحالات المتقدمة جداً فيمكن أن تعالج بالأدوية الكيميائية على أمل السيطرة على المرضى .  
بعض الاعتبارات العامة :

إن دور المعالجة الكيميائية في سرطان عنق الرحم محدودة لعدة أسباب :

١ - النجاح الكبير للمعالجة الجراحية أو الشعاعية في حالات المبكرة وكذلك ازدياد الحالات المشخصة باكراً بإجراء اللطاخة « pap test » وبالتالي ازدياد معدل الشفاء ونقص عدد الحالات المرشحة للمعالجة الكيميائية .

٢ - إن معظم حالات النكس تكون في الحوض وضمن مساحة المعالجة الشعاعية وبالتالي فإن إيصال الدواء للورم يكون صعباً لسوء التروية الدموية بعد المعالجة الشعاعية .

٣ - المعالجة الشعاعية على الحوض تجعل من نقي العظم أقل تحملاً للمعالجة الكيميائية.

٤ - النكس الحوضي أو السرطان المتقدم عادةً ما يترافق مع انضغاط الحالب والفشل الكلوي وهذا يمنع استخدام بعض الأدوية ذات السمية الكلوية .

وبالرغم من كل هذه الصعوبات إلا أن الابحاث التي تتناول دور المعالجة الكيميائية كانت كثيرة وخاصة بعد عام ١٩٧٦ وتركزت هذه الدراسات على معالجة الحالات المتقدمة أو الناكسة غير القابلة للمعالجة بواسطة الجراحة أو الأشعة كما ركزت بعض الدراسات على دور المعالجة الكيميائية كمحسس للمعالجة الشعاعية . Radiosensitizer

- معالجة الحالات المتقدمة أو الناكسة Advanced recurrent Disease :

أ - المعالجة بدواء وحيد للسرطانة شائكة الخلايا Single agent :

تشكل السرطانة الشائكة الخلايا ٨٠ ٪ من الحالات ولقد تم دراسة أكثر من ٣٨ دواء لتقييم تأثيرها على السرطانة شائكة الخلايا في الحالات المتقدمة أو الناكسة . وعلى الرغم من أن معظم هذه الأدوية لها بعض التأثير إلا أن ثلاثة فقط منها لها تأثير عالي نسبياً .

أول هذه الأدوية هو السيسبلاتين « cisplatin » حيث تم دراسته بشكل مكثف كدواء وحيد ومعدل الاستجابة لهذا الدواء كان ٢٣ ٪ والدواء الثاني هو الافروسفاميد ifosfamide ومعدل الاستجابة يصل حتى ٢٩ ٪ والدواء الثالث هو dibromodulcitol ومعدل الاستجابة ٢٩ ٪ ومن الأدوية الأخرى ذات التأثير المتوسط نذكر : سيكلوفوسفاميد cyclophosphamide - كلور أمبيوسيل chlorambucil الميلفالفان Melphalan - كاربوبلاتين carboplatin - أدرياميسين - الفلورويوراسيل 5-Fu الميثوتركسات - الفنكريستين Vincristien و tineposide ( VM26 ) - فنبلاستين والفنديسين vandisinie والجهود العلمية مستمرة لايجاد أدوية أخرى ذات فعالية عالية ولايجاد المشاركات الدوائية الفعالة والتي تزيد من معدل الحياة ومن هذه المشاركات

النظام العلاجي PF ( سيسبلاتين + فلورويوراسيل ) حيث لوحظ أن معدل الاستجابة لا يتجاوز الـ ٢٢ ٪ وهي نفس معدل الاستجابة للسيسبلاتين لوحده ويمكن أن نقول باختصار أنه لا يوجد في الوقت الحاضر أي دليل على أن المعالجة بالمشاركات الدوائية أكثر فعالية من اعطاء دواء وحيد ويتم حديثاً مقارنة اعطاء السيسبلاتين بمفرده أو مشاركة مع دواء الافوسفاميد ifosfamide أو مع Dibromodulcitol .

ب - المعالجة لسرطان عنق الرحم غير شائكة الخلايا Adeno Carcinoma nonsquamous cell وتشمل هذه السرطانات الغدية Adeno Carcinoma والسرطانة الغدية الشائكة الخلايا Adenoosquamous cell carcimoma ولقد تم دراسة أكثر من ١٠ أدوية ثلاثة منها أبدت تأثير متوسط وهي السيسبلاتين ifosfamide و piperazinedione دون وجود أي تقارير حول المشاركة الدوائية لمعالجة هذه الحالات .

- معالجة الحالات المتقدمة موضعياً locally advanced Disease :

الدور الهام الآخر للمعالجة الكيميائية هو استخدام المشاركة الدوائية مع المعالجة الشعاعية في الحالات المتقدمة موضعياً ( st II وحتى st IV . A ) . واعتماداً على التجارب التي أجريت على الحيوانات لوحظ أن الهيدروكسي يوريا Hydroxyurea يقوي من تأثير المعالجة الشعاعية وفي عام ١٩٧٠ أجريت دراسة على اعطاء الهيدروكسي يوريا أثناء المعالجة الشعاعية للمراحل المتقدمة أو اعطاء دواء Misonidazol مع المعالجة الشعاعية والهدف من هذه المشاركة هو زيادة حساسية الخلية الورمية للأشعة .

٤ - أورام المبيض البشروية : Epithelial carcinoma of the ovary :

وتشكل ٨٥ ٪ من سرطانات المبيض وهي ثالث أشيع السرطانات التي تصيب الجهاز التناسلي الانثوي . تميل هذه الأورام للانتشار عن طريق اليريتوان بالانزراع المباشر Directimplantation وعادة ماتشخص هذه الأورام بمراحل متقدمة ولذلك فإن المعالجة الجراحية هي المعالجة الأساسية لهذه الأورام وحجم البقايا الورمية بعد الجراحة

هو الذي يحدد الاستجابة للمعالجة الكيميائية ومعدل الحياة كما أن هناك عوامل أخرى تأثير على الانتذار مثل سن المريضة - درجة تمايز الورم والنوع النسيجي .

FIGO	T . N . M	الورم وامتداده
	TX	الورم لا يمكن تقييمه
	TO	لا يوجد ورم بدئي
StI	T1	الورك محدود في المبيض
StIA	T1a	الورم محدود في مبيض واحد المحفظة
		سليمة - لا يوجد ورم على سطح المبيض
StIB	T1b	الورم محدود في المبيضين - المحفظة
		الورم محدود في مبيض أو مبيضين مع أي من المرحلات التالية : المحفظة ممزقة -
StIc	T1c	الورم موجود على سطح المبيض - خلايا ورمية في الحبن أو غسالة البيريتوان .
StII	T2	الورم يشمل مبيض أو مبيضين مع نقائل حوضية
StIIA	T2a	الورم يصيب الرحم أو قناة فالوب
StIIB	Tab	الامتداد لأعضاء حوضية أخرى
StIIc	T2c	B+A مع وجود خلايا ورمية في الحبن
StIII	N1 أو T3	الورم يصيب مبيض أو مبيضين مع نقائل بروتوانية خارج الحوض أو اصابة عقدية .
StIIIA	T3a	نقائل خارج مجهرية خارج الحوض
StIIIB	T3b	نقائل بروتوانية خارج الحوض قطرها ٢ سم أو أقل .
StIIIC	T3c	نقائل بروتوانية خارج الحوض قطرها أكبر من ٢ سم أو اصابة عقدية .
StIV	M1	نقائل بعيدة ( ماعدا البريتوان )
		ملاحظة : النقائل للمحفظة الكبدية StIII انصباب الجنب الورمي StIV .

جدول رقم ( ٧ ) بين تصنيف أورام المبيض وفق T . N . M . وتصنيف ( FIGO )

## ١ - معالجة الحالات المتقدمة أو الناكسة Advanced or recurrent Disease :

كما ذكرنا سابقاً معظم الحالات تشخص بمراحل متقدمة أو تكون ناكسة تدبير هذه الحالات يبدأ بفتح البطن الاستقصائي exploratory laparotomy مع المحاولة لاستئصال القسم الأعظم من الورم وبعد اتمام العمل الجراحي يمكن أن نصنف المريضات من ناحية الانذار إلى مجموعتين :

- مرحلة ثالثة st III مع بقايا ورمية قليلة ( لا يوجد أي عقيدة أكبر من ٢ سم ) .

- مرحلة ثالثة st III مع بقايا ورمية كبيرة ( عقيدة أكبر من ٢ سم ) .

ثم بعد ذلك تبدأ المعالجة الجهازية التي تشمل :

### ١ - المعالجة بدواء وحيد single agent :

هناك العديد من الأدوية الكيميائية ودوائين من أدوية المعالجة الحيوية ومن الأدوية الهرمونية فعالة ضد الأورام البشورية للمبيض أهم هذه الأدوية وأكثرها اختباراً في الدراسات السريرية هو السيسبلاتين وله فعالية واضحة ومحددة عند غير المعالجات سابقاً وعند المريضات المتعرضات للنكس بعد المعالجة السابقة بالعناصر المقلونة الكاربوبلاتين المشتق الثاني لمركبات الـ platinum ولكن بسمية أقل على الكلية يتمتع أيضاً بنفس فعالية السيسبلاتين بالنسبة لأورام المبيض .

إن الاستجابة لهذين الدوائين مرتبط بعد عوامل :

١ - حجم البقايا الورمية بعد فتح البطن .

٢ - الجرعة وطريقة إعطاء الدواء .

٣ - المعالجة السابقة بالأدوية الكيميائية ووجود المقاومة الدوائية وفيما يتعلق بالعامل الأخير هناك ثلاثة أدوية يمكن استخدامها عند حدوث المقاومة للسيسبلاتين وهي

التاكسول ( Taxol ) الـ ifosfamide و Hexamethylmelamine .

### - التاكسول Taxol :

ويعمل على تقوية عملية Tubulinpolymerization وبالتالي تشكل حزم من

الأنابيب الدقيقة في الخلية microtubule bundles ولقد أثبت هذا الدواء فعالية واضحة عند المريضات المعالجات سابقاً بالسيسبلاتين أو بالمشاركات الحاوية عليه بالرغم من آثاره الجانبية ( تثبيط نقي العظم - فرط الحساسية - اضطرابات في نظم القلب ) .  
إن حدوث الصدمة التأقية بشكل متكرر عند استخدام الدواء خلال التجارب الأولية أدى إلى استخدام الستروئيدات وقافلات المستقبلات H1 و H2 قبل اعطاء الدواء أما بالنسبة لتثبيط نقي العظم فعادةً ما يكون شديداً ولكن لفترة قصيرة .

#### - Hexamethylmelamine ( Hexalen ) :

آلية عمله غير معروفة وله فعالية جيدة عند المريضات غير المعالجات سابقاً وعند المريضات المتعرضات للنكس بعد المعالجة السابقة وأهم آثاره الجانبية هي الآثار المعوية ( غثيان ، اقياء ) .

#### - ifosfamide : الفوسفاميد

وهو من المركبات الشبيهة بالسيلكوفوسفاميد وله فعالية واضحة على سرطان المبيض وأهم آثاره الجانبية هي تثبيط نقي العظم والسمية على المثانة التي قد تكون شديدة لذلك يعطى دواء الـ mesna بشكل وقائي ومن الآثار الأخرى السمية على الجهاز العصبي المركزي عند الأشخاص المعالجين سابقاً بالسيسبلاتين وعند اعطاء جرعة عالية دفعة واحدة .

#### ٢- المعالجة بالمشاركة الدوائية Combination chemotherapy :

هناك العديد من الدراسات السريرية التي تتناول المعالجة بالمشاركات الدوائية إلا أن ثلاثة منها يمكن أن تعطي المعالجة القياسية . أول هذه الدراسات هي دراسة المشاركة ما بين الميلفالن melphalan مع Hexamethylmelamine ومقارنة هذه المشاركة مع الميلفالن كدواء وحيد أو مع المشاركة AC ( أدرياميسين + سيكلوفوسفاميد ) ولوحظ أن المشاركة AC تعطي نتائج أفضل من حيث معدل الاستجابة التامة complet Response ولذلك تم اختيار المشاركة AC كنظام علاجي لمجموعة المراقبة



control في الدراسة الثانية التي تم فيها المقارنة ما بين المشاركة CAP ( سيلكو فوسفاميد + أدرياميسين + سيسبلاتين ) والمشاركة AC ولوحظ أن المشاركة CAP لها نتائج أفضل من ناحية معدل الاستجابة التامة ومعدل الحياة . الدراسة الثالثة وهي الهامة وتمت على المريضات المصنفات بالمرحلة الثالثة مع بقايا ورمية قليلة ( أصغير من ١ سم) وتم فيها مقارنة المشاركة CAP مع المشاركة ما بين السيسبلاتين والسيكلوفوسفاميد ولم يلاحظ أي فرق هام من ناحية الاستجابة ومعدل الحياة وبين المشاركين هذه الدراسات الثلاثة أكدت على أن المشاركة القياسية هي المشاركة ما بين السيسبلاتين والسيكلوفوسفاميد في معالجة سرطان المبيض المتقدم أو الناكس .

بالنسبة للجرعات الدوائية المستخدمة :

السيسبلاتين : وتتراوح ما بين ٥٠ مغ / ٢م كل ٣ أسابيع و ٢٠٠ مغ / ٢م كل ٤ أسابيع

السيكلوفوسفاميد : ١٠٠٠ مغ / ٢م كل ٣ - ٤ أسابيع

يمكن اعطاء الكاربوبلاتين بدلاً عن السيسبلاتين دون أن يتغير التأثير العلاجي والنتائج إلا أن الكاربوبلاتين أقل سمية على الكلية والاعصاب

- الابحاث الحالية وتوجهاتها :

يتم حالياً دراسة المشاركة ما بين أدوية كيميائية ليس بينها مقاومة مشتركة - non Cross - Resistant drugs مثل التاكسول - الافوسفاميد ودواء الـ Hexamethyl melamine كما يتم المقارنة ما بين مشاركة التاكسول بجرعة ١٣٥ مغ / ٢م مع السيسبلاتين بجرعة ٧٥ مغ / ٢م والمشاركة النظامية ما بين السيكلوفوسفاميد والسيسبلاتين .

ويتم أيضاً المقارنة ما بين مشاركة الأدوية التالية Hexamethyl melamine + سيكلوفوسفاميد + أدرياميسين + سيسبلاتين والمشاركة CAP ولوحظ أن المشاركة الأولى أكثر فائدة من ناحية معدل الحياة .

## - المعالجة الكيميائية داخل البريتوان introperitoneal therapy :

وهي طريقة تبدو منطقة لمعالجة سرطان المبيض المعروف بانشاره بشكل أساسي عبر البريتوان وأثبتت فعالية جيدة عند المريضات المعالجات سابقاً عند كون الورم لديهن صغيراً ومن الأدوية المستخدمة في هذه الطريقة السيسلاتين والكاربوبلاتين .

## - معالجة الورم بمراحله المبكرة limited disease

عند كون المرض .بمرحلة محدودة ( مرحلة أولى وثانية ) وغالباً ماتشخص هذه المراحل صدفة عند فتح البطن لسبب آخر .

المعالجة تبدأ بوضع تصنيف دقيق عن طريق فتح البطن الاستقصائي للتأكد من وجود الاصابة المجهرية للبريتوان والمعالجة الجراحية تكون باستئصال المبيضين مع الرحم والثرب .

ويمكن أن نقسم المريضات الى مجموعتين اعتماداً على العوامل الانذارية التالية :  
درجة الخبث النسيجية - تمزق المحفظة - ايجابية الفحص الخلوي للبريتوان - اصابة سطح المبيض - الخبث والامتداد خارج المبيض .

وجود أحد هذه العوامل يصنف المريضة في المجموعة ذات الخطر العالي High Risk وعند هذه المجموعة تعطى المعالجة الكيميائية المتممة Adjuvant chemotherapy ويمكن استخدام دواء وحيد « Melphalan » وحديثاً يتم تقييم استخدام المشاركات الحاوية على السيسلاتين ومقارنتها مع حقن دواء Clomic phosphate داخل البريتوان .  
بالنسبة للمجموعة ذات الخطر المنخفض low Risk فهي لا تحتاج لأي معالجة أخرى بعد الاستئصال الجراحي .

## ٥- أورام الخلايا المولدة في المبيض : Germ cell tumors of ovary :

تشكل ١٠ ٪ من سرطانات المبيض ويمكن أن نصفها نسيجياً وفقاً لما يلي :

١ - الورم الانتاشي dysgerminoma .

٢ - المسخوم teratoma .

أ - غير ناضجة immature .

ب - ناضجة mature

ج - وحيد البشرة monodermal

٣ - Endodermal sinus tumor

٤ - السرطانة الجنينية Embryonal carcinoma .

٥ - السرطانة المشيمية chorio corcinoma .

٦ - أورام مختلطة الخلايا Mixed cell tumors .

٧ - Polyembryoma .

إن تدبير هذه الأورام يبدأ بفتح البطن الاستقصائي exploratory labaratomy لتحديد درجة انتشار الورم واستئصال مايمكن استئصاله من الورم والخطوة التالية من العلاج تعتمد على النوع النسيجي وعلى موجودات فتح البطن ويمكن أن تكون المريضة من إحدى المجموعتين الأولى ويكون الورم فيها مصنفاً في المرحلة الأولى وحتى المرحلة الثالثة الا انه قابل للاستئصال بشكل تام والثانية يكون الورم فيها في المرحلة الثالثة والرابعة وغير قابل للاستئصال التام .

- المرحلة الأولى وحتى الثالثة القابلة للاستئصال التام stI - st III complete Resected :

بعد الاستئصال التام وعند كون الورم نسيجياً من النوع non dysgerminoma ( سرطانة جنينية - مسخوم ، السرطانة المشيمية ) فإن نسبة النكس عالية لذلك تعطى المعالجة الكيميائية المتممة للاقلال من نسبة النكس ولتحسين معدل الحياة ومن المشاركات الدوائية المستخدمة النظام العلاجي VAC ( فنكرستين ١,٥ مغ/ ٢م كل اسبوعين ١٢ مرة + اكينتومايسين - ٣٥٠ ميكورغرام/ ٢م وريدي يومياً ٥ x أيام كل ٤ أسابيع ٦ x جرعات + سيكلوفوسفاميد ١٥٠ مغ/ ٢م يومياً ٥ x أيام كل ٤ أسابيع ٦ x جرعات .

أو المشاركة BEP ( بليومايسين ٢٠ وحدة / ٢م جرعة قصوى ٣٠ وحدة )  
أسبوعياً لمدة ٩ أسابيع + Etoposide (VP16) ١٠٠ مغ/٢م/يومياً  $\times$  ٥ أيام كل ٣  
أسابيع  $\times$  ٣ جرعات + سيسبلاتين ٢٠ مغ/٢م/يومياً  $\times$  ٥ أيام كل ٣ أسابيع  
 $\times$  ٣ جرعات ولوحظ أن معدل النكس انخفض كثيراً بعد اعطاء هذه المعالجة لذلك  
يمكن أن نقول أن المعالجة القياسية لهذه المجموعة هي المشاركة BEP وتعطى بعد  
الاستئصال التام وثلاث اشواط .

- المرحلة الثالثة والرابعة غير القابلة للاستئصال التام st III incompletely Resected and  
st IV .

في الحالات المتقدمة أو الناكسة هناك نظامين علاجيين لهما فعالية واضحة ومثبتة  
الأول هو النظام العلاجي VAC والثاني النظام العلاجي PVB ( سيسبلاتين +  
فنبلاستين Vinblastine \_ بليومايسين ) .

وعلى الرغم من فعالية كلا النظامين إلا أن المشاركات الحاوية على السيسبلاتين  
أكثر فعالية وتترافق بمعدل استجابة أعلى ومعدل حياة أفضل ويتم حالياً تقييم المشاركة  
BEP .

- الواسمات الورمية tumor Markers :

كما هو الحال في سرطانات الخصية فإن أورام الخلايا المولدة في المبيض تنتج في  
معظم الحالات الواسمات الورمية ألفا فيتوبروتين AFP و HCG - B وقد يرتفع الأخير  
أحياناً في الورم الانتاشي . هذه الواسمات ضرورية لتقييم المعالجة الكيميائية ولتتبع  
الحالات الهاجعة ولتشخيص النكس مبكراً .

الرحى العذارية والسرطانية المشيمية Gestational Trophoblastic Disease :

العلاج الأساسي في هذه الحالات هو المعالجة الكيميائية ويمكن أن يحدث الشفاء  
بواسطتها حتى في المراحل المتقدمة .

- بعض المفاهيم العامة :

ارتفاع الواسمة HCG -B بعد تجريف الرحم لاصابته بالرحى العذارية  
Hydodidiform mole أو بعد الولادة الطبيعية يجب أن يشر الاشتباه بالسرطانة المشيمية  
حيث تكون ٥٠ ٪ من الحالات بعد الرحي العذارية و ٢٥ ٪ بعد الاسقاط و ٢٥ ٪  
بعد الحمل الطبيعي .

بالنسبة للمعالجة الكيميائية يجب أن نميز مجموعتين من المريضات المجموعة ذات  
الخطر العالي High Risk وتتميز بوجود احدى العوامل التالية :

١ - HCG -B أكثر من ١٠٠,٠٠٠ وحدة في بول ٢٤ ساعة أو أكثر من ٤٠,٠٠٠  
وحدة /مل في مصل الدم .

٢ - بدء العلاج بعد ٤ اشهر من تشخيص المرض

٣ - وجود نقائل الى غير المهبل والرئة

٤ - وجود معالجة كيميائية سابقة غير ناجحة .

أما باقي المريضات وفي حال غياب العوامل السابقة يكن من المجموعة ذات  
الخطر المنخفض low Risk

ويمكن أن نذكر التصنيف السريري لهذا المرض :

لمرحلة الأولى stI : المرض محدود بالرحم ( المرض غير المنتشر )

المرحلة الثانية stII : وجود نقائل حوضية أو مهبلية

المرحلة الثالثة stIII : نقائل رئوية

المرحلة الرابعة stIV / نقائل بعيدة ( غير الرئة والحوضية )

- معالجة المرحلة الأولى ( المرض غير المنتشر ) st I (non Metastatic disease) وتعتمد  
المعالجة على رغبة المريضة في المحافظة على وظيفة الانجاب وفي حال غياب هذه الرغبة  
فإن المعالجة باستئصال الرحم .

عند وجود الرغبة في المحافظة على الانجاب أو في حال استئصال الرحم في السابق

فإن المعالجة تكون بالمعالجة الكيميائية واستخدام دواء وحيد Single agent وأكثر الأدوية استخداماً هي الاكيتنومايسين د والميثوتركسات .

- Actinomycin D ( الاكيتنومايسين د ) يعطى بطريقتين الأولى كل أسبوعين بجرعة ١٠ - ١٣ ميكروغرام / كغ يوميا  $\times ٥$  أيام والطريقة الثانية هي جرعة وحيدة ١٠٢٥ مغ/م<sup>٢</sup> كل اسبوعين .

- الميثوتركسات Methotrexate يعطى بطريقتين أيضاً

الأولى ٠،٤ مغ/كغ يوميا  $\times ٥$  أيام كل أسبوعين

الثانية : ٠،١ مغ/كغ في الايام ١ و ٣ و ٥ و ٧ يتبع ذلك اعطاء دواء leucovorin

بجرعة ٠،١ مغ/كغ في الايام ٢ و ٤ و ٦ و ٨ تكرر كل ١٧ - ١٨ يوم

ويتم حديثاً اعطائه بجرعة ٣٠ - ٥٠ مغ/م<sup>٢</sup> اسبوعياً

معدل الشفاء يصل حتى ٨٥ % و أحياناً ٩٠ % .

في حال استمرار ارتفاع B-HCG فإن المعالجة يجب أن تغير باستخدام دواء

آخر أو استئصال الرحم ونادراً ماتعطى المشاركات الدوائية المستخدمة في علاج

المراحل المتقدمة .

- معالجة المرض المنتشر ذو الخطر المنخفض : metastatic disease at lowRisk

والمعالجة هي نفسها للمجموعة السابقة أي باستخدام دواء وحيد إلا أن ٥٠ %

من الحالات سوف تحدث المقاومة للمعالجة وفي هذه الحالة يعطى الدواء البديل ١٠ -

١٥ % من الحالات تفشل المعالجة بكلتا الدوائين مما يستدعي اعطاء المشاركات

الدوائية مع أو بدون الاستئصال الجراحي وفي هذه المعالجة يصل معدل الشفاء إلى

١٠٠ % .

- معالجة المرض المنتشر ذو الخطر العالي metastatic disease at High Risk

المعالجة في هذه الحالة تكون باعطاء المشاركات الدوائية التي تترافق مع معدل

شفاء يصل حتى ٨٠ % أشهر هذه المشاركات MAC ( ميثوتركسات + اكينتومايسين

د + سيكلوفوسفاميد ) والمشاركة CHAMOMA والمشاركة EMA-CO في حال استمرار الورم رغم المعالجات السابقة فإن المعالجة تكون بالمشاركات الحاوية على السيسبلاتين وال Etoposide إذا كانت المعالجات السابقة غير حاوية عليهما وتكون النتائج أفضل باستخدام هذه المشاركات . النقاثل الدماغية يمكن أن تعالج بزيادة المقدار العلاجي للميتوتركسات تدريجياً ولايزال دور المعالجة الشعاعية على كامل الدماغ غير واضح .

# أورام العظم والنسج الرخوة

## Sarcomas of Bone and soft tissue

تشكل ١٪ من أورام البالغين و ١٥٪ من أورام الأطفال

- الأسباب : Etiology :

- ٥ ٪ من حالات الغرن تترافق بقصة تشيع سابقة ( عادةً منذ ٤ - ٢٠ سنة ) وأكثر الأنواع ترافقاً مع المعالجة الشعاعية هو الغرن العظمي osteosarcoma بالرغم من تسجيل حالات من الأنواع mixed mesodermal و Mcsothelioma .

- التعرض لبعض المواد الكيميائية قد يزيد من معدل الإصابة بالغرن مثل العوامل المقلونة alkylating agents المستخدمة في معالجة بعض الأورام التي تصيب الأطفال .  
التعرض للإمينت ( Asbestos ) يمكن أن يسبب الميزوثيليوما .

التعرض لمركب كلور البوليفينيل polyvinyl chloride ( صناعة البلاستيك ) والتعرض لمركبات الحديد يمكن أن يترافقان بالإصابة بالغرن الوعائي angiosarcoma .

- الأدوية المثبطة للمناعة immunosupprissiv drugs ( في حالة زرع الأعضاء ) قد تترافق مع الإصابة بغرن كابوزي Kaposi's Sarcoma .

- بعض الحالات الوراثية : الإصابة بورم الأرومة الشبكية Retioblastoma وداء الأورام الليفية العصبية Neuro Fibro matosis قد تترافق بالإصابة بالغرن بنسبة ٧ - ١٠ ٪ .

- يمكن أن تصاب الندبة الناجمة عن الرض أو الحرق بالغرن اليفي بعد ٣٠ سنة أو أكثر .

- أورام العظم والغضاريف : Sarcomas of Bon and cartilage :

١- الغرن العظمي osteosarcoma :

أشيع الأنواع التي تصيب العظم نسبة إصابة الذكور الى الإناث ١،٥ / ٢،١ هناك ذروتين للإصابة الأولى في العقد الثاني والثالث والثانية في العقد السادس من العمر .



ينشأ الغرن العظمي من صفيحة النمو growth plate في العظام الطويلة عند المراهقين أما عند الكهول فإن الغرن ينشأ من العظام المشعة سابقاً أو تنشأ من ورم عظمي سليم موجود سابقاً ( داء باجت - الورم العظمي الغضروفي osteocondroma ) - يمكن أن يصاب العاملون في طلاء أقرص الساعات بالراديوم بالغرن العظمي إلا أن هذه الحالات قلت بشكل كبير بعد اتخاذ كافة الاحتياطات .

- التشخيص : يعتبر التصوير الطبقي المبرمج ( C. T Scan ) لمكان الآفة وللمرئين من وسائل التشخيص الهامة ( الرئة أكثر الأماكن إصابة بالنقائل البعيدة ) ويمكن إجراء الصور الشعاعية البسيطة للضرف المصاب وقد يكشف ومضان العظام Bone scan عن وجود عدة بؤر للاصابة .

ارتفاع القوسفاتاز القلوية في مصل الدم له أهمية انذارية .

- المعالجة الكيميائية المتممة Adjuvant chemotherapy :

إن معدل الحياة بدون نكس لـ ٥ سنوات « Disease Free Survival » بعد المعالجة الجراحية لوحدها ٢٠٪ و يرتفع هذه المعدل إلى ٥٠ - ٨٠٪ عند اعطاء المعالجة الكيميائية المتممة إلا أن المشاركة المثالية والطريقة المفضلة لاتزال غير محددة مع العلم أن إحدى الدراسات أثبتت أن الجرعة العالية من الميثوتركسات أفضل من الجرعة الاعتيادية أما دور الأدوية التالية : سيكلوفوسفاميد - بليومايسين - والأكتينومايسين د لايزال غير واضح .

المعالجة المتممة قبل العمل الجراحي Ncoadjuvant chemo therapy لها عدة ميزات نظرية منها :

- أن المعالجة الجهازية المبكرة قد تكون أكثر فعالية في القضاء على النقائل المجهرية .
- الاستجابة للمعالجة الكيميائية يمكن معايرتها قبل العمل الجراحي ( بملاحظة تراجع الورم ) وبالتالي يمكن أن نعدل من النظام العلاجي إذا كانت الاستجابة غير كافية .
- في حال وجود مئوت في الورم بنسبة ٩٠ ٪ بعد استئصاله فإن معدل الحياة يكون

أفضل أما عند كون التمثوت أقل من ٩٠٪ فإنه يمكن تعديل المشاركة الدوائية التي استخدمت قبل العمل الجراحي وبالتالي تحسين معدل الحياة .

- يمكن المحافظة على الطرف باستخدام المعالجة الكيميائية قبل العمل الجراحي .

- المعالجة الجراحية surgical treatment :

وتكون إما بالبتر أو الجراحة المحافظة على الطرف ويتم في هذه الحالة استئصال واسع للآفة ( مع حدود أمان كبيرة ) أما في حال وجود إصابة للنسج الرخوة أو للأعصاب والأوعية فإنه يستطب البتر في هذه الحالة وكذلك الإصابات التي تنشأ من أماكن مشعة سابقاً أو الناجمة عن داء باجت .

الجراحة مع الحفاظ على الطرف أكثر نجاحاً في الأطراف العلوية وعادةً ما يتم المحافظة على وظيفة الطرف بنسبة ٦٠ - ٧٥٪ النكس الموضعي يعالج بالبتر .

- الغرن العظمي المنتشر osteosarcoma Metastatic :

النكس شائع الحدوث وبشكل مبكر ( خلال ٢ سنة من انتهاء المعالجة الأساسية ) وأهم عوامل الإنذار هي درجة الخبيث النسيجية ( grade ) واحتياح الورم لقشر العظم وإصابة النسج الرخوة المحيطة بالعظم .

أكثر الأماكن إصابة بالنقائل البعيدة هي الرئين وبشكل أقل العظام . المعالجة الكيميائية بالمشاركة مع الجراحة هي العلاج المفضل لإصابة الرئة بالنقائل وخاصةً إذا كانت قليلة ( ٣ - ٥ عقيدات ) ويمكن أن يحدث الشفاء بنسبة ٢٠ إلى ٤٠٪ أما معدل الحياة دون نكس فيصل حتى ١٢ شهر أو أكثر .

غالباً ما يحدث النكس عند المرضى المعالجين كيميائياً كمعالجة متممة ويمكن أن يكرر نفس الأنظمة العلاجية المستخدمة سابقاً إذا حدث النكس خلال ٦ أشهر من آخر شوط علاجي .

أما الأدوية الفعالة في علاج الغرن العظمي المنتشر إذا استخدمت كدواء وحيد منها:

- الأدرياميسين Adrimycin وبجرعة ٦٠ - ٩٠ مغ/م معدل الاستجابة ( ٢١٪ )

- الميثوتركسات Methotrexate بجرعة ٣ - ١٢ غ/م + Leucovorin ( معدل الاستجابة ٣٠ - ٤٠ ٪ )

- ifosfamide ٥ - ١٠ غ/م + دواء

Mesna ( معدل الاستجابة ٢٥ ٪ )

من الأدوية الأخرى : سيكلوفوسفاميد - Dtic - الميلفالن وهم معدل استجابة ١٥ ٪

٢- غرن إيونغ Ewing's Sarcoma

يشكل ١٠ - ١٤ ٪ من أورام العظم البدئية الخبيثة عند البيض أما عند السود فهو نادر جداً .

ذروة الإصابة تتراوح ما بين ١٠ و ٢٥ سنة . نسبة إصابة الذكور إلى الإناث ١/٢ .  
يمكن أن يراجع المريض بتزعج حروري - ضعف عام - نقص وزن - آلام عظمية مع وجود كتلة سريعة الزيادة في الحجم وقد تترافق هذه الأعراض مع ارتفاع الكريات البيض وسرعة التثفل ESR .

الفخذ هو أكثر الأماكن إصابة ٢٧ ٪ يليه الحوض ١٨ ٪ الشظية والظنوب ١٧ ٪  
ثلث الحالات تراجع مع وجود النقائل وخاصة للرئين - عظام ونقي العظم  
ويمكن أن نقول أن المرض يكون جهازياً عند وضع التشخيص وإن لم تظهر هذه النقائل بالاستقصاءات المختلفة .

المعالجة تكون بالمشاركات الدوائية مثل CAV ( سيكلوفوسفاميد + أدرياميسين + فنكركستين ) ثم تعطى المعالجة الشعاعية على كامل العظم المصاب ( ٦٠ غري )  
ويمكن استخدام دواء ifosfamide بدلاً عن السيلكوفوسفاميد .

أما الجرعة وطريقة إعطاء الدواء فتختلف من دراسة يعطى الأخرى ففي إحدى الدراسات يعطى الفنكركستين بجرعة ١,٥ مغ/م أسبوعياً لمدة ٦ أسابيع ثم راحة أسبوعين ويعطى ل ٦ أسابيع أخرى ويعطى الأكتينومايسين د بجرعة ١,٥ مغ/كغ يومياً ولمدة ٣ أيام يكرر كل ٣ أسابيع ثم تعطى المعالجة الشعاعية بعد الجرعة الرابعة .

يتناسب معدل الحياة عكسياً مع السن كما أن إصابة الحوض والعضد والأضلاع تترافق بانذار سيء ومن عوامل سوء الانذار الاخرى ارتفاع LDH في المصل واصابة النسيج الرخوة .

### ٣- الغرن الغضروفي Chondrosarcoma :

ثاني أشيع غرن يصيب العظام ويشكل ١٧ - ٢٢٪ من أورام العظم البدئية الخبيثة نادراً ما ينشأ عن النسيج الرخوة ويمكن أن يصيب العظام الطبيعية أو ينشأ من آفة عظيمية سليمة مثل Enchondroma وقد ينشأ من عظام مشعة سابقاً أو من عظام مصابة بداء باجت .

يزداد معدل الإصابة بالغرن الغضروفي بازدياد العمر وأكثر الاماكن اصابة الحوض ( ٣١٪ ) - الفخذ ( ٢١٪ ) - الكف ( ٣١٪ ) - الوجه ٩٪ والاضلاع ٩٪ . وقد تكون الآفة غير مؤلمة ويكون الألم بسبب الزيادة السريعة بحجم الكتلة الغرن الغضروفي مقاوم للمعالجة الشعاعية والكيميائية ويميل للنكس الموضعي لذلك يجب أن يستأصل بشكل واسع عند وضع التشخيص .

### ٤- الورم العظمي ذو الخلايا العرطلة ( Giant cell tumor of Bone ( osteoclastoma

ويشكل ٥٪ من أورام العظم البدئية وذروة الإصابة في العقد الثالث من العمر إلا أنه يمكن أن يصيب الأعمار من ٥ وحتى ٧٣ سنة ٥٠٪ من الحالات تتوضع حول الركبة ( نهاية عظم الفخذ - الرضفة patella الشظية والظنوب ) .

٥٥٪ من المرضى نساء

عادةً ما يتعرض المريض لعدة عمليات جراحية يتم فيها تجريف الآفة وذلك لارتفاع معدل النكس الموضعي ٥٠٪ .

١٠٪ من الحالات تكون خبيثة عند وضع التشخيص كما يمكن أن يتحول الورم للخبيث بعد ٩ سنوات وغالباً ماينجم هذا التحول عن المعالجة الشعاعية السابقة .

## ٥- بعض الأنواع الأخرى التي تصيب العظام

الغرن الليفي - Fibrosarcoma - الغرن الوعائي angiosarcoma الورم الليفي الناسج  
الخبث Malignant Fibrous Histiocytoma وكلها تعالج كباقي أورام النسيج الرخوة .

- أورام النسيج الرخوة SOFT tissue Sarcoma :

١- الورم الليفي الناسج Malignant Fibrous Histiocytoma :

وهو أشيع الأنواع التي تصيب النسيج الرخوة ويصيب المرضى في سن ٥٠ و ٧٠ سنة .

نسبة إصابة الذكور الى الاناث ١/٢ .

الآفات التي تصيب الجلد لها انذار جيد أما الآفات العميقة فتميل للنكس  
الموضعي وللاتنقال للعبد .

المعالجة تكون بالاستئصال الواسع مع المعالجة الشعاعية أو بالتبر .

نسبة إصابة العقد اللمفاوية الناحية تبلغ ٤ - ١٧٪

٢- الغرن الدهني liposarcoma :

وهو ثاني أشيع أورام النسيج الرخوة الخبيثة التي تصيب البالغين ويتدرج من حيث  
الخبثاءة من الورم جيد التمايز قليل الخبث والنوع Myxiod إلى الورم الشديد الخبث (   
الغرن الدهني ذو الخلايا المدورة Roundcell Liposarcoma والنوع Pleomorphic ) .

أكثر الأماكن إصابة هو الفخذ وخلف اليرتوان ونادراً مايتطور الورم الدهني  
السلیم lipoma إلى هذا الشكل ٥٥ - ٦٥٪ من المرضى رجال وفي العقد السادس من  
العمر .

٣- الغرن الليفي Fibrosarcoma :

ينشأ من النسيج الليفي في العضلات والأوتار وهو أشيع عند الذكور

٤- الغرن الذليلي synovial sarcoma :

ويصيب المراهقين والشباب ( ٢٧ سنة) ويصيب الذكور أكثر من الاناث يصيب

الاطراف وخاصة الاماكن القريبة من المفاصل ( حول الركبة بشكل خاص ) .  
أكثر من ثلث الحالات تحوي على التكلسات ويبدو أن الجراحة المحافظة  
على الطرف صعبة لقرب الآفة من المفاصل .

٥ - الغرن العصبي Neurosarcoma :

ويشكل ٥٪ من أورام النسيج الرخوة و ٥٠٪ من الحالات تترافق مع داء فون  
ريكلينغ هاوسن وفي هذه الحالة يتظاهر بكم كبير حجم الورم الليفي الموجود سابقاً مع الألم  
ولذلك يجب اجراء الخزعة لوضع التشخيص .

٦ - Haemangio Endothelioma :

وهو ورم متوسط الخبث نادر الحدوث ويصيب كلا الجنسين بنفس النسبة ونادر  
الحدوث عند الأطفال .

٧ - الغرن الوعائي angioarcoma :

ويشكل ١٪ من كل أنواع الغرن

ثلث الحالات تتوضع في الجلد ( وخاصة بعد الوذمة الناجمة عن تجريف العقد  
الابطية في سرطان الثدي Lymphangio sarcoma ربع الحالات تصيب باقي الأعضاء مثل  
الثدي - الكبد - الرئة - القلب ( يعتبر أشيع أورام شغاف القلب البدئية ) .

٨ - غرن كابوزي Kaposi's Sarcoma

ويتظاهر سريرياً بأفات جلدية حمراء مزرقة ( blue - red ) مسطحة وتتطور  
بشكل خفي إلى عقيدات أولويحات في أعلى أو أسفل الطرفين السفليين عند الكهول  
وخاصة في حوض البحر الأبيض المتوسط تستجيب هذه الآفات عادة للمعالجة  
الشعاعية أو للجرعات المنخفضة من الفنبلاستين Vinblastine أو الأدرياميسين  
Adriamycin

يمكن أن يحدث بنسبة ٤٪ عند المرضى المعرضين لعمليات زرع الكلية  
( بعد ٦ أشهر تقريباً من العملية ) وهو أشيع عند الرجال وقد يستجيب ويتراجع

بتخفيض جرعة الأدوية المثبطة للمناعة . الأنواع الشديدة الخبيث تصيب مخاطية الفم  
المعدة - الرئة - الجلد والعقد اللمفاوية وتترافق هذه الأنواع مع متلازمة عوز المناعة  
المكسب ( AiDS ) وخاصة عند المنحرفين جنسياً Homosexual وبشكل أقل الحالات  
الناجمة عن نقل الدم ويفيد في هذه الحالة الانتقرون ألفا كمعالجة ملطفة .

٩ - Haemangiopericytoma :

ويصيب المرضى في العقد الخامس من العمر وينشأ من الخلايا المحيطة ببطانة  
الأوعية الدموية .

٣٥٪ من الحالات. تصيب الفخذ و ٢٥٪ من الحالات تتوضع خلف اليرتوان  
وقد تتوضع داخل القحف ويسمى في هذه الحالة angioblastic Meningioma .

١٠ - الأنواع الشائعة التي تصيب العضلات Comone Sarcomas of Muscle :

أ - الغرن العضلي الأملس Leio Myosarcoma :

ينشأ من العضلات الملساء وهو أشيع الأنواع التي تصيب الجهاز الهضمي  
والرحم .

السن المتوسط للإصابة ٦٠ سنة .

بأنسبة للجهاز الهضمي ٦٢٪ تتوضع في المعدة ( ٣٪ من أورام المعدة هي من  
نوع الغرن ) ٢٩٪ تتوضع في الأمعاء الدقيقة ( ٢٠٪ من أورام الأمعاء الدقيقة الخبيثة )  
و ١٠٪ في الكولون ( ١٪ من أورام الكولون والمستقيم ) .

- أكثر من نصف المرضى يكون لديهم نقائل إلى الكبد والرئتين عند وضع التشخيص .  
- أكثر التوضعيات عند النساء هي الرحم وخلف اليرتوان .

- الآفات الجلدية وتحت الجلدية تصيب الرجال عادةً وتترافق بانذار جيد أما الآفات  
الجلدية المتعددة فقد تمثل نقائل لآفة متوضعة خلف اليرتوان أو داخل جوف البطن .

ب - الغرن العضلي المخطط Rhabdomyosarcoma :

ينشأ من العضلات الإرادية المخططة النوع الجنيني يصيب الأطفال في سن الأربع

سنوات وبشكل خاص الحجاج ويصيب المراهقين ويتوضع في الجهاز الهضمي خاصة النوع السنخي يصيب الشباب والمراهقين ويتوضع في الاطراف واندازه سيء .  
٨٠٪ من الحالات تتوافق بوجود النقائل البعيدة إذا لم تعطى المعالجة الكيميائية .  
حتى ولو تمت السيطرة الموضعية على الورم والمعالجة الكيميائية عادة تكون بالمشاركة مابين الأكتينومايسين مع السيكلوفوسفاميد والفنكرستين ويمكن اعطاء الافوسفاميد if osfamide بدلاً عن السيكلوفوسفاميد ويمكن استخدام الادريامايسين أيضاً . النقائل للعقد اللمفاوية شائعة وتعطى المعالجة الشعاعية بعد استئصال الورم .

#### - الجراحة Surgery :

الآفات المتوضعة خلف البريتوان أو في الرأس والعنق يصعب استئصالها بشكل تام بينما آفات الجذع السطحية قابلة للاستئصال الجراحي التام آفات الاطراف تعالج إما بالبتر أو بالجراحة المحافظة على الطرف مع المعالجة الشعاعية وفي معظم الحالات وعلى الرغم من السيطرة الموضعية على الورم إلا أن غالبية المرضى تموت بسبب النقائل البعيدة لذلك فإنه من الضروري اعطاء المعالجة الكيميائية المتممة .

#### - المعالجة الكيميائية المتممة Adjuvant chemotherapy :

وهي مستطبة في الغرن العضلي المخطط والغرن العظمي واوبونغ أما تأثيرها على باقي أنواع الغرن غير مثبت حتى هذا الوقت . وعلى الرغم من جود أكثر من ١٢ دراسة سريرية تقيم دور المعالجة الكيميائية إلى أن اثبت منها أثبت أن هناك فائدة من ناحية معدل الحياة . استخدمت في هذه الدراسات عدة أنظمة علاجية منها CYVADIC ( سيكنو فوسفاميد + فنكرستين + أدريامايسين + DTIC ) ويعطى كل ٤ أسابيع ومنها أيضاً النظام العلاجي CAV ( سيكنو فوسفاميد + أدريامايسين + فنكرستين ) .

أما في دراسة المعهد الوطني لبحوث السرطان National cancer institute استخدم الأديريامايسين بجرعة ٥٠ - ٧٠ مغ/م ( جرعة تراكمية كلية ٥٥٠ مغ/م ) مع



السيكلوفوسفاميد بجرعة ٥٠٠ - ٧٠٠ مغ/م<sup>٢</sup> ثم يتبع ذلك ٦ أشواط من الميثوتركسات بجرعة ٥٠ إلى ٢٥٠ مغ/م<sup>٢</sup> شهرياً وفي بعض الدراسات استخدم الأدريناميسين بمفرده .

#### - معالجة الحالات المتقدمة من الغرن Advanced soft tissue sarcomas :

١- المعالجة بدواء وحيد single agent :

أكثر الأدوية فعالية كدواء وحيد هو الأدريناميسين Doxorubicin ومعدل الاستجابة ١٥ - ٣٥٪ ويتناسب هذا المعدل طردياً مع الجرعة الدوائية التي تتراوح ما بين ٦٠ و ٧٠ مغ/م<sup>٢</sup> كل ٣ أسابيع ومعدل الاستجابة أفضل من اعطائه بجرعة أقل من ٥٠ مغ/م<sup>٢</sup> .

الدواء الثاني هو الـ DTIC ( Dacarbazine ) معدل الاستجابة ١٦٪ وهو فعال خاصة في معالجة الغرن العضلي الأملس .  
الافوسفاميد ifosfamide أثبتت فعالية في المرضى المعالجين سابقاً بالأدريناميسين وجرعته الدوائية هي ٥ غ/م<sup>٢</sup> .

وهناك عدة أدوية أخرى تم اختبارها إلا أنه لم يحقق أي منها معدل استجابة أعلى من ٢٠٪ ( ماعدا دواء carminamycin ) .

٢- المشاركات الدوائية الحايية على الأدريناميسين :

لوحظ أن اضافة الـ DTIC الى الأدريناميسين يزيد من معدل الاستجابة ( المشاركة AD ) كما لوحظ أن هذا المعدل لا يختلف إذا اعطيت المشاركة بالحقن الوريدي أو بالتثريب الوريدي المستمر continuous infusion ولكن الطريقة الاخيرة أقل سمية .

ومن المشاركات الأخرى المشاركة CYVADIC والمشاركة IA ( فوسفاميد + أدريناميسين ) المترافقة مع معدل استجابة أعلى من ٣٥٪ وعند اضافة الـ DTIC ( المشاركة IAD ) يصبح معدل الاستجابة ٥٠٪ .

من المشاركات الخاوية على الافوسفاميد ifosfamide نذكر أيضاً المشاركة مايينه  
وبين الأكتينومايسين والفنكرستين وال Etoposide ( VP16 ) ومعدل الاستجابة في هذه  
الحالة يتراوح ما بين ٥٤ و ٩٤٪  
أما أعلى معدل استجابة فلقد لوحظ في المشاركة ما بين الأدريامايسين بجرعة  
٧٠مغ/م<sup>٢</sup> وال DTIC بجرعة ١ غ/م<sup>٢</sup> مجزأة على ٤ أيام .  
عند فشل المعالجة بالأدريامايسين أو بالمشاركات الخاوية عليه يمكن في هذه  
الحالة استخدام دواء الافوسفاميد ifosfamide .

# المعالجة الكيميائية لأمراض الدم الخبيثة

## chemo therapy of Hematologic Malignancies

١- داء هودجكن HodgKin's disease :

لاتزال المعالجة الشعاعية هي المعالجة الأساسية للمراحل المبكرة ( مرحلة أولى A و B والمرحلة الثانية A ) .

المرحلة المتقدمة ( مرحلة ثالثة B و المرحلة الرابعة ) تعالج بالمعالجة الكيميائية ما بين الحالتين السابقتين هناك المرحلة الثانية B والمرحلة الثالثة A ( STII B و STII A ) حيث يمكن أن نحقق نتائج مرضية بالمعالجة الشعاعية أو الكيميائية أو بالمشاركة ما بينهما .

بالنسبة لفتح البطن الاستقصائي نلاحظ أن ٣٠ ٪ من المرضى قد يحتاجون لهذا الاستقصاء فيما عدا المرضى الذين تقرر معالجتهم كيميائياً دون النظر للموجودات الناجمة من فتح البطن وفي هذه الحالة يمكن إجراء التصوير الطبقي المبرمج C.T.Scan أو تصوير لأوعية اللمفاوية Lympho gram أو المرنان ( MRI ) لتقييم مدى انتشار المرض وبعض الباحثين يفضلون استخدام الأمواج فوق الصوتية أو الدراسة بالغاليوم وخاصة لدراسة المنصف Mediastnum .

- خزعة العظم والنقي Bone Marrow biopsy مستطبة في جميع الحالات وعند كونها ايجابية يلغى فتح البطن الاستقصائي .

- عوامل الانذار السيء :

- ١ - كبير حجم الورم ٢ - الأعراض الجهازية ٣ - إصابة الذكور خاصة أقل من ٦٠ سنة ٤ - النوع النسيجي ( فقدان اللمفاويات Lymphocyte depletion ٥ - النكس ٦ - عدم استمرار المحجوم التام لأكثر من ١٢ شهر .
- المرحلة الأولى والثانية ( stI و stII ) تعالج شعاعياً ولكن الصعوبة تكمن بوجود

الكتلة المنصفية الكبيرة ويفضل معظم الأطباء وفي هذه الحالة اعطاء المعالجة الكيميائية لتصغير حجم الكتلة المنصفية وبالتالي تصغير الساحة العلاجية عند اعطاء المعالجة الشعاعية فيما بعد للاقلال من الاختلاطات المترافقة مع الساحات الشعاعية الكبيرة . وعادة ماتعطى المشاركة ABVD + MOPP قبل المعالجة الشعاعية .

بالنسبة للمرحلة الثالثة والرابعة ( st III - IV ) فعلاجها الأساسي كيميائياً وأول المشاركات المستخدمة MOPP و لم تكن نتائجها مرضية من ناحية دوام الهجوم التام كما في المشاركات COPP و MVPP ( فنبلاستين ) .

ثم قامت بعد ذلك عدة محاولات لايجاد مشاركات أكثر فعالية من MOPP وفعالة عند حدوث المقاومة الدوائية وأفضل هذه المشاركات هي ABVD التي وصفت لأول مرة عام ١٩٧٥ والمشاركة SCAB ( streptozotocin + CCNU + أدرياميسين + بليومايسين ) التي وصفت عام ١٩٧٧ .

من المشاركات الأخرى التي حققت هجوعاً تاماً أكثر من ٢٥٪ هي المشاركة BCPVP ( بليومايسين + CCNU + فنبلاستين + بروكاربازين + بريدنيزون ) والمشاركة B-CAVc ( بليومايسين + CCNU + أدرياميسين + فنبلاستين ) .

لقد بينت الدراسات على أن فعالية المشاركة MOPP والمشاركة ABVD متعادلة ولكن كلا المماركتين لاتترافق بمعدل استجابة أكثر من ٢٠ - ٣٠٪ عند حدوث النكس لذلك تم التفكير باعطائهم بشكل متناوب ABVD/ MOPP أو بشكل متعاقب حتى نضيل مدة الهجوم التام الا ان أكثر من نصف هؤلاء المرضى سوف يتعرض للنكس لذلك تم تكثيف الجهود لايجاد أنظمة علاجية منقذة ( salvage ) . يفضل بعض الباحثين اعطاء المعالجة الشعاعية عند عدم حدوث الهجوم التام بالمعالجة الكيميائية .

إذا حدث النكس بعد عام من حدوث الهجوم التام يمكن اعطاء نفس النظام العلاجي المستخدم سابقاً ويمكن أن يؤدي للهجوع لفترة طويلة .

يلجأ بعض المعاهد للمعالجة بالانترلو كين ( 2 - interleukin ) أو بعوامل النمو GM - CSF وقد تتم المعالجة بواسطة الأضداد الموسومة مثل Polyclonal Yttrium . antiferritin

يمكن اللجوء أيضاً للمعالجة الكيميائية التجريبية مثل استخدام دراء Fludarabine وعامل التمثوت الورمي Tumor necrosis Factor هناك بعض الأنظمة العلاجية لانتزال قيد الدراسة مثل EVA ( VP16 + فنبلاستين + أدرياميسين ) و ProMACE ( سيكلوفوسفاميد + أدرياميسين + VP16 + بريدنيزون + ميثوتركسات ) والمشاركة VIC ( CCNC + ifosfamide + velban ) .

بالرغم من كل هذه المشاركات إلا أنه يبقى زرع نقي العظم هو العلاج الأفضل والمشاركة التي تعطى قبل عملية الزرع هي CBV ( سيكلوفوسفاميد + BCNU + VP16 ) أو BEAC ( VP16 + BCNU + سيلكوفوسفاميد + ستيارابين ) أو يستخدم السيلكوفوسفاميد لوحده مع تشعيع كامل الجسم .  
- الخطوط العاملة للمعالجة :

١- المرحلة الأولى A والمرحلة الثانية A ( STIA and STII A ) :  
تعالج شعاعياً وفق ( مانتيل + عقد حول الأبهري أو مايسمي بتشعيع العقد تحت التام subtotal nodal irradiation وفي بعض حالات الإصابة تحت الحجاب تتم المعالجة وفق Y المقلوبة بالنسبة للمرحلة الأولى وتشعيع العقد التام total Nodal irradiation للمرحلة الثانية .

٢ - المرحلة الثانية مع كتلة منصفية كبيرة :  
بالرغم من امكانية المعالجة الشعاعية إلا أن معظم الأطباء يفضل اعطاء المعالجة الكيميائية أولاً ( ٤ - ٦ أشواط ) ثم تعطى المعالجة الشعاعية ( تشعيع العقد تحت التام ) .

٣ - المرحلة الاولى B والثانية B ( stBI - stII B ) :

إن وجود الأعراض السريرية يزيد من معدل النكس بعد المعالجة الشعاعية وفي هذه الحالة يمكن انقاذ المريض باعطاء المعالجة الكيميائية .

٤ - المرحلة الثالثة A ( stIII A ) :

يمكن أن يحدث المهجوع بواسطة المعالجة الشعاعية أو المعالجة الكيميائية بمشاركة الأسلوبين .

إذا كان المرض محدوداً في العقد اللمفاوية لأعلى البطن ( stage III A1 ) فإن نتيجة المعالجة هي نفسها للمرحلة الثانية A أما إصابة العقد البطنية السفلية أو الحرقفية ( st III A2 ) فتحتاج لمعالجة اضافية ومعظم الأطباء يفضلون إعطاء المعالجة الكيميائية مع أو بدون المعالجة الشعاعية مع ازدياد امكانية حدوث ابيضاض الدم في هذه المشاركة لذلك يفضل تجنب استبعاد العوامل المقلونة مع المساحات الواسعة والممتدة . EXTENDED FEILD

٥ - المرحلة الثالثة B والرابعة :

تعالج بالمشاركات الدوائية وتشجع الدراسات المبدئية اعطاء المعالجة الشعاعية على الإصابة البدئية .

## ٦ - لمفوما لا هودجكن non HodgKin's Lymphoma

إن مبادئ التصنيف staging للحالات المشخصة حديثاً هي نفس المبادئ المطبقة في داء هودجكن ويجب أن يتم تحديد درجة انتشار الورم قبل البدء بالمعالجة .  
الفرق الأساسي ما بين داء هودجكن واللمفوما هو ان الإصابة خارج العقد شائعة في اللمفوما ونادرة في داء هودجكن وحدثت الإصابة العصبية المركزية في اللمفوما وخاصة إذا كانت خزعة العظم والنقي ايجابية .

٨٠ - ٩٠ ٪ من الحالات تشخص بمراحل متقدمة ( مرحلة ثالثة ورابعة ) .

إن تصوير الأوعية اللمفاوية Bipodal Lymph angio gram استقصاء ضروري في

اللمفوما ولكن نظراً لشيوع إصابة الأحشاء ، والعقد المساريقية فإن التصوير الطبقي المبرمج C.Tscan أكثر أهمية من تصوير الأوعية اللمفاوية .

عوامل الانذار في اللمفوما أقل وضوحاً من داء هودجكن ولكنها تشمل :  
النوع النسيجي - امتداد المرض - وجود أو غياب الأعراض الجهازية الحالة العامة -  
وجود أو غياب الورم الكبير Bulky disease .

<u>Working Formulation</u>	<u>Kiel equivalent or related terms</u>
<u>Low grade</u>	
A . Malignant lymphoma	
Small lymphocytic	ML lymphocytic . CLL
consistent with CLL	
plasmacytoid	ML lymphoplasmacytic / lymphoplasmacytoid
B . Malignant lymphoma . follicular	
Predominantly small cleaved cell	
diffuse areas	
sclerosis	ML centroblastic - centrocytic ( small ) ,
C . Malignant lymphoma . follicular	follicular ± diffuse
Mixed , small cleaved and large cell	
diffuse areas	
sclerosis	
<u>Intermediate grade</u>	
D . Malignant lymphoma . follicular	
Predominantly large cell	
diffuse areas	ML centroblastic - centrocytic ( large ) ,
	follicular± diffuse
E . Malignant lymphoma . diffuse	
Small cleaved cell	
sclerosis	ML centrocytic ( small )
F . Malignant lymphoma . diffuse	
Mixed , small and large cell	ML centroblastic - centrocytic ( small ) , diffuse
sclerosis	ML lymphoplasmacytic/ - cytoid,
epithelioid cell component	polymorphic
G . Malignant lymphoma . diffuse	
Large cell	
cleaved cell	ML centroblastic - centrocytic ( large ) . diffuse
noncleaved cell	ML centrocytic ( large )
sclerosis	ML centroblastic
<u>High grade</u>	
H . Malignant lymphoma	
Large cell	ML immunoblastic
plasmacytoid	
clear cell	

polymorphous epithelioid cell component	T-zone lymphoma. Lymphocithelioid cell lymphoma
I. Malignant lymphoma	
Lymphoblastic	
convoluted cell	ML lymphoblastic , convoluted cell type
nonconvoluted cell	ML lymphoblastic, unclassified
J. Malignat lymphoma	
Small noncleavev cell	
Burkitt s	ML lymphoblastic, Burkitt type and other B- lymphoblastic
follicular areas	
<u>Miscellaneous</u>	
Composite	-
Mycosis fungoides	Mycosis fugoides
Histiocytic	--
Extramedullary plasmacytoma	ML plasmacytic
Unclassifiable	--
Other	--

جدول رقم ( ٩ ) تصنيف اللمفومات وفق نظام ( Kiel ) ونظام Working Formulation

المرض الموضع localized Disease :

على الرغم من شيوع المرض المنتشر في العقد إلا أن ١٠ - ٢٠٪ من الحالات يكون المرض فيها من المرحلة الأولى والثانية وفيما عدا التوضعات البدئية خارج العقد ( المعدة - الدرق - الامعاء - العظم ) فإن المعالجة الشعاعية لهذه المرحلة يمكن أن تكون كافية إلا أن النكس شائع وفي مناطق بعيدة وتم الحصول على نتائج أفضل في المعالجة الكيميائية بمفردها أو بالمشاركة مع المعالجة الشعاعية ويتم حالياً المقارنة ما بين اعطاء النظام العلاجي CHOP ( سيلكوفوسفاميد + أدريامايسين + فنكركستين + بريدنيزون ) لثمانية أشواط متتالية وما بين اعطاء ٣ اشواط ثم اعطاء المعالجة الشعاعية بمساحات محدودة involved feild .

في الحالات النسيجية المفضلة يمكن أن تكون المعالجة الشعاعية كافية عند كون المرض في المرحلة الأولى أو الثانية .



- المرض المتقدم ( الحالات المفضلة نسيجياً ) (Favorable Histology ) Advanced Disease :  
وهي الحالات التي تكون نسيجياً من النوع قليلة الخبت Low - grade والاسلوب المتبع في علاجها هو نفس اسلوب معالجة ابيضاض الدم اللمفاوي المزمن أي أن المعالجة لاتعطى إلا إذا كان هناك زيادة في حجم العقد اللمفاوية وانخفاض في تعداد الدم العام وحدوث الأحماج بشكل متكرر مع انخفاض الغاما غلوبولين في المصل .

ولقد جرت عدة دراسات لاييجاد النظام العلاجي المناسب الذي يتوافق بنسبة عالية من المهجوع التام والشفاء من هذه الأنظمة C - MOPP ( سيلكوفوسفاميد + فنكرستين + بروكاربازين + برينديزون ) والنظام العلاجي CHOP وهناك أنظمة علاجية شديدة أكثر فعالية مثل BACOD - m ( مثو تركسات + بليومايسين + أدريامايسين + سيلكوفوسفاميد + فنكرستين + ديكساميثازون ) .

ويتم حديثاً مشاركة المعالجة الكيميائية مع معدلات الاستجابة الحيوية biological Response Modifiers وخاصة الانترفيرون ألفا ( كمعالجة صيانة) إلا أن هذه المعالجة لاتزال قيد البحث ولايستطب استخدامها سريرياً حتى ظهور نتائج الدراسات المختلفة لذلك يمكن أن نقول أن المعالجة في هذه الحالة إما بدواء وحيد أو بالمشاركة COP مع أو بدون المعالجة الشعاعية بجرعات منخفضة .

- المرض المتقدم ( غير المفضل نسيجياً ) (unFavorable Histology ) Advanced disease :  
معظم الحالات تكون من هذا النوع سواءً بالمرحلة الثالثة أو الرابعة ونسيجياً من نوع اللمفوما متوسطة أو عالية الخبت .

أكثر الأنظمة العلاجية شيوعاً هو CHOP والنظام العلاجي + ( COP - BLAM ) ( سيلكوفوسفاميد + فنكرستين + أدريامايسين + برينديزون + بروكاربازين + بليومايسين )

والمشاركة BACOD . m و M-BACOD و cytaBOM - proMACE ( سيلكوفوسفاميد + أدريامايسين + VP16 + برينديزون + سيتارابين + بليوماستين + فنكرستين +

ميثوتركسات مع Leucovorin ) في حال حدوث النكس بعد العلاج بأحد هذه  
الانظمة يمكن اجراء زرع نقي عظم او استخدام معدلات الاستجابة الحيوية أو  
الانظمة العلاجية البديلة مثل BBVP-M ( BCNu + بليومايسين + VP16 + بيردينيزون  
+ ميثوتركسات ) أو FAMP- HU ( Flu darabine + Hydroxyurea ) أو ara /Hu  
( سيناراين + هيلوركسي يوريا) أو VAD ( فنكرستين + أدريامايسين +  
ديكساميثازون ) .

الخلاصة : للمفوما قليلة الخبث نسيجياً والموضوعة تعالج إما شعاعياً أو بالمعالجة  
الكيميائية أما الحالات المتقدمة فتعالج معالجة ملطفة وعلى الرغم من أن هناك أبحاث  
عديدة لدراسة المعالجة المكثفة ونتائجها .

للمفوما عالية ومتوسطة الخبث تعالج إما بـ النظام العلاجي CHOP أو بالانظمة  
الايخرى المكثفة وفي حال عدم تحمل الانتراسيكلين فيعالج المرضى بأحد النظامين  
COMLA ( سيكلوفوسفاميد + فنكرستين + ميثوتركسات + Leucovorin + arac ) أو  
النظام COPP

للمفوما البدئية في الجهاز العصبي تشكل ٢٪ من كل أورام الدماغ و ٢٪ من كل  
للمفوما وهي أكثر شيوعاً عند مرضى نقص المناعة ( AIDS ) الغالبية العظمى  
تستجيب للمعالجة الشعاعية أو المعالجة الكيميائية .

## ٢ . ابيضاض الدم النقوي الحاد ( AML ) :

وهدف المعالجة هو ازالة الخلايا الابيضاضية واعادة الخلايا الدموية الطبيعية ويمكن تحقيق ذلك بالمعالجة الكيميائية المنقصة للخلايا cytoreductive chemo therapy وأكثر الأدوية استخداماً هي المشاركة مابين السيتارابين ( ara-c ) مع الانتراسيكلين ثم تعطى المعالجة التالية للهجوم وهي معالجة التكيف consolidation ومعالجة الصيانة Maintenance يقسم التصنيف الفرنسي - الأمريكي - البريطاني French American - British classification - ابيضاض الدم النقوي الحاد الى ثلاثة أنواع:

M3 - M1 : وتكون الخلية الورمية من نوع الحبيبي Granulocyte .

M4 : ابيضاض الدم النقوي بالخلايا وحيدة النوى الحاد Acute Melomono ytic Leukemia .

M5 : ابيضاض دم بخلايا وحيدة النوى Acute Monocytic Leukemia .

M6 : ابيضاض دم بالخلايا الحمراء Erythro Leukemia .

M7 : ابيضاض بأرومة النواءات Acute MegaKaryoblastic Leukemia

وأضيف لهذا التصنيف MO ويتميز بوجود أرومة الخلية النقوية Myloblast غير النشطة كيميائياً ولكن يمكن أن يلاحظ وجود ال peroxidase أو ال Myeloid anti gen على سطح الخلية ويدعى هذا النوع ابيضاض الدم النقوي الحاد قليل التميز Minimal differentiated A . M . L

إن اكتشاف السيتوزين cytosinarbinside في عام 1960 كان أهم تطور في معالجة ابيضاض الدم النقوي الحاد حيث يعتبر الدواء الأكثر فعالية . الجرعة تتراوح بين ١٠٠ - ٢٠٠ مغ/م/يومياً تريب وريدي لمدة ١ - ٢ ساعة أو بتريب وريدي مستمر لمدة ٢٤ ساعة على ٥ - ١٠ أيام .

يمكن اضافة الأدريناميسين أو Daunorubicin بجرعة ٤٥ - ٧٠ مغ/م/٢ على ثلاثة أيام متتالية ويمكن أن يحدث الهجوم التام عند المرضى تحت سن ال ٥٠ سنة بمعدل

٧٥٪ أما عند المرضى أكبر من ٦٠ سنة فإن حدوث الهجوع التام صعب يتراوح ما بين ٣٥ و ٥٠٪ .

بعض الأدوية الأخرى التي يمكن استخدامها لاحداث الهجوع الفكريستين - برينيزون - thioguanine - 6 - amsacrine - Etoposide و mitoxantrone .

يمكن اعطاء السيتاراين بجرعة عالية ( H.D ara-c ) ١ - ٣ غ /م/ ٢ - ١٠ - ١٢ جرعة ولكنها طريقة قيد الدراسة ولم تصدر نتائجها النهائية .

- معالجة التكثيف « intensification » وهي اعطاء المعالجة الكيميائية مع الهجوع التام المستمر او تعطى بعد الهجوع التام وهذه المعالجة هي عبارة عن شوتين من السيتاراين ( arac ) بجرعة اعتيادية او شوط واحد بجرعة عالية .

يختلف AML عن ابيضاض الدم اللمفاوي الحاد بعدم شيوع اصابة الجهاز العصبي المركزي ولذلك فإن اعطاء المعالجة الوقائية بالحقن داخل السيساء غير مستطبة في AML

معدل الهجوع التام ل ٥ سنوات بعد المعالجة الكيميائية يبلغ ٢٥ - ٣٥٪ ولكن معدل النكس عالي يصل حتى ٧٥٪ مما يستوجب البحث عن العناصر الفعالة في معالجة النكس أو اجراء زرع نقي العظم ومن الادوية التي يتم اختبارها في معالجة النكس نذكر السيسبلاين thioguanine - 6 - وال VP16 بجرعة عالية مع اوبدون السيسبلاين وبالرغم من أن هناك نسبة لا بأس بها تدخل في الهجوع لمرة ثانية إلا أن مدته قصيرة .

- عسر التنسج النقوي ، Myelo Dysplasia ،

وهي مرحلة ما قبل ابيضاض تعالج بشكل داعم بنقل الدم والصفائح واعطاء الفيتامينات وحديثاً يتم استخدام عوامل النمو CSF-GM أو CSF-G مع السيتاراين بجرعة نظامية أو عالية إلا أن نتائج هذه الطريقة لم تكن مرضية لذلك يكتفى بالمعالجة الداعمة .

#### ٤- ابيضاض الدم النقوي المزمن : chonic Myeloid Leukemia ( CML )

يشكل ٢٥٪ من حالات الابيضاض التي تصيب البالغين والرجال اكثر اصابة من النساء . متوسط سن الاصابة ٤٥ - ٥٠ سنة .

أهم تطور طرأ على معالجة هذا النوع هو فهم النواحي الحيوية الجزيئية لصبغي فيلادلفيا حيث يحدث انتقال للمورثات ما بين الصبغي ٩ و ٢٢ وهذا التشوه يلاحظ أيضاً في ابيضاض الدم للمفاوي الحاد .

المعالجة الفعالة للطور المزمن تتضمن استئصال الطحال - تشجيع الطحال دواء Busulfan أو hydroxyurca - المعالجة بالفوسفور المشع P22 نتائج هذه المعالجات المختلفة متساوية مع أرجحية لاستخدام الـ Busulfan لترافقه مع تحسن معدل الحياة .  
بالاضافة للمعالجات الاعتيادية السابقة هناك بعض التقارير تشير الى أن مشاركة استئصال الطحال مع السيتاراين و 6-thioguanin أو مع Lasporaginase قد تكون مفيدة في زيادة معدل الحياة . بعض المركز قد يلجأ لتشجيع الطحال مع اعطاء المشاركة COAP ( سيكلوفوسفاميد + فنكر ستين + Daunorubicin ) .

المعلومات السريرية الحديثة تدعم استخدام الانترفيرون وخاصة في الطور المزمن ونتائج هذه المعالجة قيد الدراسات المكثفة وأخيراً فإن الأضواء تسلط في الوقت الحاضر على زرع نقي العظم كمعالجة لكل من الطور المزمن والحاد .

## ٥ - ابيضاض الدم اللمفاوي المزمن ( CLL ) Chronic Lymphocytic Leukemia

على الرغم من كون هذا النوع من أشيع الابيضاضات التي تصيب البالغين إلا أن معالجة هذا المرضي تتطور ببطء . وذلك لسببين الأول نقص في الأدوية الفعالة والثاني وهو الأكثر أهمية عدم معرفة طبيعة هذا المرض كما لوحظ أنه بالرغم من أن معدل الاستجابة للعلاجات المختلفة عالياً إلا أن حدوث الهجوع التام غير شائع ولا يوجد تحسن في معدل الحياة .

تعطى المعالجة في CLL للسيطرة على الأعراض مثل انخفاض الغاما غلوبولين في المصل - الانتانات المتكررة - فقر الدم ونقص الصفائح - ارتفاع اللمفاويات وضخامة الطحال الشديدة .

المعالجة التقليدية تكون باستخدام دواء وحيد من العوامل المقلونة الـ *alkylating agents* أو عدة أدوية من هذه المجموعة مع أو بدون الستيرويدات القشرية *Corticosteroids* ومن المشاركات المستخدمة نذكر *CVp* ( سيكلوفوسفاميد + فنكروستين + بريدنيزون ) والمشاركة *CHOP - MOPP* والنظام العلاجي *M2* ( فنكروستين + *BCNu* + سيلكوفوسفاميد + ميليفالان + بريدنيزون ) .

يمكن اعطاء المعالجة الشعاعية بأساليب مختلفة منها المعالجة بالفوسفور المشع *P22* - التشعيع بساحات محددة *involved field* - تشعيع الطحال - تشعيع كامل الجسم *Totalbody irradiation* إلا أن هذه الأساليب لم تساهم في تحسن معدل الحياة ولكنها كانت فعالة كمعالجة ملطفة .

ويتم حديثاً في دراسات سريرية المقارنة ما بين اعطاء دواء وحيد من العوامل المقلونة وما بين اعطاء دواء *Fludarabine* مع الـ *interferon* أو الـ *interleukin* .

## ٦- ابيضاض الدم ذو الخلايا المشعرة Hairy cell Leukemia

وصف هذا النوع لأول مرة عام ١٩٥٨ والصورة لسريرية له تشابه ابيضاض الدم اللمفاوي المزمن ولكن معظم المرضى عند وضع التشخيص يعانون من الأعراض مثل ضخامة متوسطة الى شديدة في الطحال مع أوبدون الضخامة الكبدية أو من ضخامات عقدية متعددة أما الميزة الثانية فهي وجود نقص الخلايا الشامل المترافق مع وجود الخلايا المشعرة وتكون في معظم الحالات من نوع B على الرغم من وصف بعض الحالات من النوع خلايا T .

العلاج في السابق كان يعتمد على المراقبة واستئصال الطحال أما الاستجابة للعوامل المقلونة فهي ضعيلة وعند اكتشاف دواء deoxycoformycin أصبح بالامكان احداث الهجوع التام بسهولة ويمكن أيضاً احداث الهجوع بواسطة الانترفيرون ويتم حديثاً المقارنة ما بين هذين الدوائين مع أو بدون استئصال الطحال .

## ٧ - ابيضاض الدم للمفاوي الحاد ( ALL ) Acute Lymphocytic Leukemia

يشكل ٢٠٪ من حالات الابيضاض عند البالغين و ٩٠٪ من حالات الابيضاض عند الأطفال .

٨٠٪ من الحالات تنشأ من الخلايا B وتترافق بارتفاع Common All antigen ( CALLA ) و ١٠ - ٢٠٪ من الحالات تنشأ من الخلايا T وتترافق بارتفاع Tcell antigen وهناك عدد قليل من الحالات ليس لها صفات الخلايا B أو الخلايا T وتدعى null ALL يصنف ALL وفقاً لتصنيف French - American - British واعتماداً على شكل الخلية إلى L1 - L2 و L3 .

L1 : أشيع الأشكال عند الأطفال وتكون الخلية فيه صغيرة

L2 : أشيع الأشكال عند البالغين وتكون الخلية فيه متعددة الأشكال Pleomorphic Lymphoblast أما L3 فخلاياه تشابه خلية لمفوما بوركيت يتراق هذا النوع بوجود صبغي فيلادلفيا في ٢٥٪ من الحالات .

عوامل الانذار عند البالغين والاطفال تتضمن : السن - تعداد الكريات البيض - التشوه في الصبغيات - الجنس - العرق - اصابة الجهاز العصبي المركزي والنوع المناعي immunphenotype وهذه العوامل تحدد ديمومة المهجوع التام ومعدل الحياة وليس لها أي فائدة في تحديد معدل الاستجابة للمعالجة .

المعالجة تتضمن احداث المهجوع induction وتسم باعطاء الفنكرستين مع الانثراسيكلين واليريدنيزون وقد يستخدم عند الأطفال دواء L-Asparaginase مع الانثراسيكلين حيث يزداد معدل المهجوع التام وتزداد مدته .

من الأدوية الأخرى التي يمكن استخدامها نذكر السيكلوفوسفاميد - الميثوتركسات ، Etoposide VP16 - سيتاراين و VM 26 إن وجود أحد العوامل الانذارية التالية يضع الطفل في الزمرة المعرضة للخطر High Risk .

١ - العمر أكثر من ١٠ سنوات أو الرضع



٢ - تعداد الكريات البيض أكثر من  $50 \times 10^9$  /ليتر

٣ - الاضطرابات الصبغية أو وجود CALL antigen

إن التطور الهام في معالجة ALL هو اعطاء المعالجة التالية للهجوع Postremission therapy التي تكون في الزمرة قليلة الخطر باعطاء دواء Mercaptopurine - 6 يومياً والمثيوتريكسات اسبوعياً مع المعالجة الوقائية للحملة العصبية المركزية ( حقن المثيوتريكسات داخل السيساء + تشعيع القحف ) .

بالنسبة للزمرة المعرضة للخطر فإن هذه المعالجة تشمل اعطاء المشاركات الدوائية المستخدمة في احداث الهجوع كمعالجة تكثيف ثم تعضى معالجة الصيانة كما في السابق . المعالجة اثنائية للهجوع عند البالغين لم يتفق عليها حتى الان فبعض التقارير في نهاية اثنمانينات تشير إلى استخدام البروتوكول L10/L10M حيث أشارت الدراسة التي أجريت من قبل المجموعة الجنوبية الغربية للاورام Group wetren oncology أن استخدام البروتوكول L10 OM يمكن أن يترافق بمعدل الهجوع التام ٦٨٪ ويستمر هذا الهجوع وسطياً لمدة ٢٣ شهر ومعدل احياء الوسطي ١٨ شهر والمهم في هذه الدراسة أن ٣٥٪ من المرضى فقط الذين تزيد أعمارهم على ٥٠ سنة دخلوا في الهجوع التام ولذلك فالانذار افضل عند المرضى تحت سن ال ٥٠ سنة وإذا كان تعداد البيض عند التشخيص أقل من  $10 \times 10^9$  /ليتر يكون الانذار أفضل أيضاً .

إن المشكلة في حدوث النكس حيث يصعب في هذه الحالة تحقيق نتائج جيدة بالمعالجات المختلفة إلا أن حدوث النكس خارج النقي ( الخصية - الجهاز العصبي المركزي ) يمكن في هذه الحالة أن يحدث الشفاء وتبقى المشكلة الخطيرة هو النكس في النقي .

الأدوية التي يمكن استخدامها في النكس هي المثيوتريكسات بجرعة عالية السيتاراين arac بجرعة عالية - idarubicin - mitoxantrone وعادة ما يحدث الهجوع للمرة الثانية ولكن لفترة قصيرة والتقارير تشير إلى أن مشاركة السيتاراين بجرعة عالية مع

دواء amsacrine يمكن أن تترافق بمعدل للمهجوع التام أعلى من ٧٥٪ وهي نتائج مشجعة ومن النتائج المبشرة بالامل هي نتائج اجراء زرع نقي العظم ولايزال غمد معروف حتى الآن هل يجرى الزرع في فترة المهجوع الأولى أو بعد حدوث المهجوع للمرة الثانية وهو نفس السؤال المطروح بالنسبة لايضااض الدم النقوي الحاد .

## ٨ - الاضطرابات التكاثرية في نقي العظم Myeloproliferative Disorders

أ - تليف النقي الذاتي idiopathic Myelo Fibrosis

يدعى أيضاً agnogenic Myeloid Metaplasia وقد يتظاهر بأحد الأعراض التالية :  
الألم العظمي - نقص الوزن - التعب العام - الألم البطني وضخامة الطحال العرطلة .  
فقر الدم من أحد التظاهرات الهامة وقد ينجم عن نقص تصنيع في نقي العظم أو  
عن زيادة نشاط الطحال .

اللطاخة الدموية تبدي وجود اختلاف شديد في الكريات الحمر anisocytosis  
وتشوه فيها PoiKilocytosis مع وجود أرومات للكريات البيض والحمر Leuko  
Eeythroblasts .

تعداد الكريات البيض يكون عادة أقل من  $50 \times 10^9$  /ليتر ويمكن أن تشاهد  
كريات بيضاء غير ناضجة immature .

يتم تميزه عن ابيضاض الدم النقوي المزمن بكون الفوسفاتاز القلوية داخل الكرية  
البيضاء طبيعية بالنسبة لتعداد الصفائح فيمكن أن يكون منخفضاً أو طبيعياً ويشير  
بزل نقي العظم لوجود التليف Fibrosis .

لا توجد معالجة نوعية ويمكن اجراء نقل كريات حمراء أو الصفائح عند  
اللزوم وقد يفيد الاندروجين في بعض الحالات .

تشير بعض التقارير إلى فائدة استخدام المعالجة الكيميائية أو المعالجة الشعاعية  
على الطحال العرطل وقد يستطب استئصال الطحال خاصة إذا أصبح مؤلماً .

### ب - زيادة الصفائح الأسامي Essential Thrombo cythemia :

ويتميز بارتفاع الصفائح أكثر من  $600 \times 10^9$  /ليتر وزيادة النسوءات  
Mcgakaryo cyte في نقي العظم وتتميز عن احمرار الدم بأن الكريات الحمر طبيعية  
وغياب صبغي فيلادلفيا .

الأعراض إذا وجدت غير نوعية مثل الضعف العام - الصداع - النعاس

واضطرابات بصرية مع ضخامة الطحال . في ٥٠٪ من الحالات المعالجة تكون بالفوسفور المشع P32 ويمكن اعطاء الهيدروكسي يوريا وحديثاً يتم اعطاء الدواء الجديد anagrelide الذي يؤثر على الصفائح دون أن يؤثر على الكريات البيض أو الحمراء .

#### جـ - احمرار الدم Polycy themia Vera

يتميز بفرط التنسج hyperplasia لجميع عناصر نقي العظم إلا أنه يتظاهر سريراً باضطراب في كتلة الكريات احمر .

الأعراض غير نوعية كالصداع - الضعف العام - اخكة والدوار - اضطرابات بصرية والنعاس ويمكن أن يحس الطحال في ثلثي المرضى . مخبرياً يلاحظ زيادة تعداد الكريات احمر وقد يزداد تعداد الكريات البيض والصفائح .

المعالجة تكون بالفصادة المتكررة حتى يصبح الهيماتوكريت ٤٠ - ٤٢٪ ثم يوضع المريض بعد ذلك تحت المراقبة .

يمكن أن يعالج بالفوسفور المشع P32 أو بالهيدروكسي يوريا .

## الداء النقوي العديد Multiple Myeloma

إن اكتشاف العوامل المقلونة في الستينات من القرن العشرين كان له دوراً كبيراً في تطوير علاج الداء النقوي العديد وساهم في ذلك أيضاً فهم بعض الآليات الفيزيولوجية المرضية لهذا المرض فمثلاً إفراز الخلية الورمية للانترولوكين 1 وللمفوتوكسين Lymphotoxin ولعامل التمثوت الخلوي Tumor Necrosis يعتبر السبب المعقول لحدوث الألم العظمي وآفات العظم الانحلالية وارتفاع كلس المصل وبالتالي فإن تصحيح هذا الارتفاع يعتمد على الاستعداد المبكر للمعالجة الكيميائية .

إن نقص المناعة المرافق يجعل المريض مستعداً للإصابة بالأحماض المختلفة كما أن استجابته لتمييع غير كافية وقصيرة الامد وذلك لانخفاض الغلوبولين المناعي . immunoglobulins

كما أن السلاسل الخفيفة Light chain تتمتع بتأثير سام على الكلية ولهذا فإن أحد التظاهرات السريرية لهذا المرض هو اضطراب وظيفة الانابيب الكلوية ( فشل كلوي ) الذي عادةً ما يظهر بعد حدوث التحفاف التالي للاسهال أو الاقياءات ( سبب الفشل الكلوي هو ترسب بروتين بنس جونز Bence - JONSE ) .

إن أكثر الانظمة العلاجية المتوفرة حديثاً قادرة على انقاص عدد الخلايا البلازمية الخبيثة عند غالبية المرضى إلا أنها غير قادرة على احداث الشفاء وقد يكون من المتوقع أن هذه المعالجة الكيميائية لا تؤثر على الخلايا الورمية الجذعية malignant stem cell كما أن فشل المعالجة قد يكون ناجماً عن المقاومة الدوائية البدئية أو المكتسبة للخلية الورمية .

عوامل الانذار : هي ١ - ارتفاع في مستوى B - 2 microglobulin في المصل

٢ - مرحلة متقدمة من المرض High stage ( مرحلة ثالثة )

٣ - وجود الفشل الكلوي

٤ - الاستجابة السريعة للمعالجة الكيميائية

٥ - السن المتقدم

٦ - انخفاض ألبومين المصل

٧ - الخلية الورمية من نوع أرومة الخلية البلازمية Plasmoblastic

٨ - إيجابية CALLA

٩ - ارتفاع الخميرة LDH في المصل

١٠ - إيجابية Multiple Myeloid antigen

- تصنيف الداء النقوي العديد Staging of Multiple Myeloma

الدرجة الأولى stI : وجود كل مايلي :

الخضاب أقل من ١٠ غ

كالسيوم المصل أقل من ١٢/مغ/مل

لا يوجد آفة عظمية انحلالية أو وجود بؤرة انحلالية وحيدة

IGG - mCOMPONENT أقل من ٥ غ/مل أو IGA أقل من ٣ غ/مل .

بروتين بنس جونس في أقل ٤ غ في بول ٢٤ ساعة

الدرجة الثانية stII : الموجودات ليست من موجودات الدرجة الأولى ولا الثالثة

الدرجة الثالثة st III : وجود واحد أو أكثر من الموجودات التالية :

الخضاب أقل من ٨,٥ غ .

الكالسيوم في المصل أعلى من ١٢ مغ/مل .

آفات عظمية حالة متعددة ومتقدمة .

IGG - m أكثر من ٧ غ/مل أو IGA < ٥ غ/مل .

بروتين بنس جونس في بول ٢٤ ساعة أكثر من ١٢ غ .

## - المعالجة الكيميائية البدئية للداء النقوي العديد

### Primary chemotherapy Regimens For Multiple Myeloma

إن اختيار النظام العلاجي الأساسي يعتبر من أهم المسائل التي لاتزال قيد المناقشة والجدال مع العلم أن المعالجة النظامية ومنذ فترة طويلة هي المشاركة ما بين المليفالان والبريدنيزون (MP) التي تترافق مع معدل استجابة يتراوح ما بين ٥٠ - ٦٠٪ ومعدل حياة وسطي ٣٠ - ٤٠ شهر .

ولقد أجريت عدة دراسات للمقارنة ما بين هذه المعالجة وبين المشاركات الدوائية لأربعة أو خمسة أدوية ولوحظ أن المعدل العالي للاستجابة ترافق مع المشاركات الدوائية وعند المرضى من المجموعة ذات الخطر العالي High Risk أو عند كون الورم من الدرجة الثالثة stIII ولسوء الحظ ورغم هذا المعدل العالي للاستجابة إلا أن الفائدة في اطالة معدل الحياة لم تلاحظ إلا في دراسة واحدة .

في الدراسة التي أجرتها المجموعة الجنوبية الغربية للأورام ( SWOG ) تم اختبار المشاركة VMCP ( فنكرستين + مليفالان + سيكلوفوسفاميد + بريدنيزون ) بالتناوب مع المشاركة VCAP ( فنكرستين + سيلكوفوسفاميد + أدرياميسين + بريدنيزون ) أو اعطاء المشاركة VCMP لثلاثة أشواط ثم تتبع بـ ٣ أشواط من المشاركة VBAP ( فنكرستين + BCNU + أدرياميسين + بريدنيزون ) وبينت التقارير النهائية لهذه الدراسة أن هناك زيادة في معدل الحياة للمشاركات الدوائية مقارنة مع اعطاء المليفالان كلواء وحيد .

أخيراً يمكن القول أن المليفالان مع البريدنيزون هي المعالجة البدئية لمعظم حالات ورم النقي المتعدد ويجب أن يعطى المليفالان على معدة فارغة لتحسين الامتصاص المعوي للدواء ويفضل اعطاؤه كل ٦ اسابيع لتمكين نقي العظم من الشفاء التام من التأثير المثبط للدواء وهذا يسمح باعطاء جرعة أعلى من كل شوط ويجب أن نوضح أنه قد يعطى عدة جرعات قبل ظهور مؤشرات الاستجابة ( كإنخفاض مستوى 1gG -

M إلى ٥٠ ٪ ) وإذا حدث أن تطور المرض بعد اعطاء شوتين أو ثلاثة فإن هذا مظهر من مظاهر المقاومة الدوائية للنظام العلاجي المستخدم ويمكن معالجة هذه الحالات بالمشاركة CAD ( فتركستين + أدرياميسين + ديكساميثازون أو بجرعة عالية من الديكساميثازون التي تعتبر أفضل فرصة لحدوث الاستجابة .

في حال كون المرض من الدرجة الثالثة st III أو أن هناك عوامل سوء الانذار فإن المعالجة تكون إما وفق النظام العلاجي M2 أو المشاركة VMCP / VBAP .

- الانتفرون ألفا في معالجة الداء النقوي :

يمكن أن يؤدي الانتفرون ألفا عند المرضى غير المعالجين سابقاً إلى الهجوع في ثلث الحالات إلا أن معدل الحياة الوسطي في هذه الحالة أقل من المعالجة بالميلفالن أو بالمشاركات الدوائية .

جرعة الانتفرون هي ١٠ مليون وحدة يومياً لمدة ٧ أيام تكرر كل ٣ اسابيع وهناك عدة محاولات لمشاركة الانتفرون مع المعالجة الكيميائية الأساسية مثل المشاركة مع الميلفالن أو مع المشاركة VMCP ولوحظ زيادة معدل الاستجابة عند اضافة الانتفرون ولكن دون تأثير على معدل الحياة .

عند المرضى المعالجين سابقاً سواءً عند وجود مقاومة أو عند حدوث النكس فإن الانتفرون يمكن أن يطيل من فترة الهجوع ( كما أظهرت الدراسة الإيطالية ) إذ لوحظ أن اعطاء الانتفرون بعد انتهاء المعالجة الكيميائية وجرعة تتراوح ما بين ٣ - ١٠ مليون وحدة /م ٢ ٣ مرات اسبوعياً يمكن أن يطيل من مدة الهجوع .

- معالجة الألم العظمي :

مركبات الـ Salicylate أو Acetaminophen بالمشاركة مع الكودائين يمكن أن تكون معالجة فعالة للألم كما يمكن السيطرة على الألم بالمعالجة الشعاعية إذا كان الألم موضعاً ويجب تجنب اعطاء ساحات علاجية كبيرة أو تكرار المعالجة الملطفة للآلام العظمية .



### - معالجة ارتفاع كلس المصل hyper calcemia :

في حالة الارتفاع المتوسط ( أقل من ١٢ مغ/ مل ) تكون المعالجة بالسوائل الوريدية ١٠٠ - ١٥٠ مل/ ساعة مع المدرات مثل Furosemide ويجب الانتباه عند كبار السن لمنع حدوث قصور القلب ويمكن اعطاء الستروئيدات القشرية ( البريدنيزون بجرعة ١ - ١,٥ مغ / كغ ) وتسحب تدريجياً بعد عودة الكلس لمستواه الطبيعي كما يمكن استخدام الكالسيومونين Calcitonin مع الستروئيدات وجرعة ٢٠٠ - ٤٠٠ وحدة تحت الجلد أو عضلي كل ١٢ ساعة وهناك دواء آخر يمكن استخدامه في هذه الحالات هو Etidronate بجرعة ٧,٥ مغ/ كغ في ٢٥٠ مل سيروم ملحي لمدة ٣ ايام وأخيراً Mitramycin المثبط للامتصاص العظمي لاستخدام لسميته على الكية .

### - معالجة الفشل الكلوي Renal Failar

من أسبابه حدوثه في الداء النقوي العديد ارتفاع كلس المصل - ارتفاع البولة الدموية ( uremia ) - الأحماج amyloidosis - infections - فرط اللزوجة hyper viscosity أو السبب الرئيسي فهو بروتين بنس جونس ذو التأثير السام على الكية .  
الفشل الكلوي الحاد عادة مايتظاهر بعد الاسهالات والاقیاءات المتكررة بسبب التجفاف وقد يساهم في ذلك استخدام مضادات اللالتهاب غير الستيروئيدية ( NSA ) أو بعض الصادات الحيوية وكذلك استخدام الأدوية المستخدمة في تصوير الجهاز البولي الظليل تجنب كل مايسبق والحفاظ على كمية كافية من السوائل اليومية هو أهم خطوة في المعالجة .

الفشل الكلوي الناجم عن ارتفاع الكالسيوم عادة مايتراجع بعد اعطاء المعالجة المناسبة ويمكن اللجوء إلى الاماهة وقلونة البول وأحياناً لغسيل الكية hemodialysis .

## - معالجة الاختلالات العصبية

من الحالات الاسعافية انضغاط النخاع الشوكي بأفة خارج السحايا وفي هذه الحالة يستطب اجراء خزع الصفيحات ثم المعالجة الشعاعية هذا في حال كون المرض مجهولاً أما إذا كان المرض مشخصاً فإن المعالجة الشعاعية تعطى فور ظهور الاعراض ( ٤٥ غري) ويمكن أن تحدث اصابة خلف المقلة تؤدي للجحوظ وفي هذه الحالة تعطى المعالجة الشعاعية لتخفيف الضغط على العين المصابة .

# الأورام الصلبة عند الأطفال

## Pediatric solid tumors

### أولاً : ورم الأرومة العصبية Neuroblastoma

وهو من أشيع الأورام خارج القحف عند الأطفال تحت سن الـ ٥ سنوات ومن عوامل الانتذار الهامة هي سن الإصابة ومدى انتشار المرضي .

وأشهر التصنيف staging التي وضعت لهذا الورم هو تصنيف مجموعة الأورام عند الأطفال pediatric oncology Group ( POG ) ويتطلب التصنيف مجموعة من الاستقصاءات منها :

- مخبرياً : تعداد دم عام C . B . C - وظائف الكبد والكلية - معايرة الكاتيكول أمين في البول - بزل نقي عظم .

- شعاعياً : صورة صدر بالوضعين - ومضان عظام - طبقي مبرمج للبطن والحوض وفيما يلي نستعرض تصنيف الـ POG :

- المرحلة stA : - الورم البدئي : استئصال تام للورم مع أو بدون بقايا ورمية مجهرية  
Microscopic Residual tumor  
- العقد اللمفاوية غير مصابة  
- الكبد غير مصاب

- المرحلة st B : - الورم البدئي : استئصال مع بقايا ورمية عيانية  
- العقد اللمفاوية والكبد غير مصابة

- المرحلة st C : - الورم البدئي مستاصل بشكل تام أو غير تام  
- العقد اللمفاوية : مصابة مجهرياً ( غير ملتصقة بالورم )  
- الكبد : غير مصاب

- المرحلة st D : إصابة الكبد - الجلد - العظام ونقي العظام

## المعالجة :

- المرحلة A : ٩٠٪ من المصابين ودون النظر لعمر الطفل يتمثلون للشفاء بعد الاستئصال التام للورم ودون أي معالجة أخرى والمعالجة الكيميائية بعد العمل الجراحي غير مفضلة في هذه المجموعة .

- المرحلة B : الاستئصال التام للورم لا يمكن أن يكون موقفاً به أو لا يمكن تحقيقه ولذلك فإن المعالجة التالية للعمل الجراحي تهدف لازالة البقايا الورمية إما بالمعالجة الكيميائية أو الشعاعية أو كليهما وتشير مجموعة الأورام عند الأطفال ( POG ) بدراسة حديثة أنه يمكن السيطرة موضعياً على الورم بواسطة المعالجة الكيميائية بعد العمل الجراحي حيث تعطى المشاركة ما بين السيلكوفوسفاميد والأدرياميسين .

السيلكوفوسفاميد بجرعة ١٥٠ مغ/م/ ٢ يومياً لمدة ٧ أيام والأدرياميسين بجرعة ٣٥ مغ/ ٢م/ ويدي في اليوم الثامن ويكرر كل ٣ - ٤ أسابيع وغالباً ما يحدث الهجوع التام عند معظم المرضى وإذا لم تحدث الاستجابة يمكن استخدام مشاركة أخرى هي السيسبلاتين مع VP16 ( Etoposide ) أو مع ال VM26 ( tinectside ) ثم تعطى المعالجة الشعاعية .

- المرحلة C : وهنا يلعب عمر الطفل دوراً هاماً من ناحية الانذار : الأطفال الرضع ( أقل من سنة ) الانذار أفضل لديهم بكثير من الأطفال الأكبر سناً وتهدف المعالجة في هذه الحالة إلى السيطرة على البقايا الورمية أو الاقلال من حجم الورم غير القابل للاستئصال وتحويله لورم قابل للاستئصال بشكل تام وهذا يمكن تحقيقه بالمعالجة الكيميائية ولو حدها أو بالمشاركة مع المعالجة الشعاعية ويمكن استخدام عدة أدوية فعالة في مشاركات مختلفة من هذه الأدوية :

السيلكوفوسفاميد - الأدرياميسين - السيسبلاتين - VP16 ومن المشاركات نذكر المشاركة ما بين السيسبلاتين بجرعة ٩٠ مغ/ ٢م/ في اليوم الأول و VM26 ١٠٠ مغ/ ٢م/ في اليوم الثالث تكرر كل ٣ أو ٤ أسابيع .

عند الأطفال الأكبر سنًا يمكن استخدام المشاركة ما بين أربعة أدوية من الأدوية المذكورة سابقاً مع التأكيد على أن تدبير هؤلاء الأطفال يتطلب تعاوناً قوياً بين كافة الاختصاصات ( الجراحة - المعالجة الكيميائية - المعالجة الشعاعية ) لتحقيق المجموع التام

- المرحلة D : كما هو الحال في المرحلة C الانذار افضل عند الأطفال الرضع ويمكن استخدام عدة مشاركات مثل OPEC ( فنكرستين + سيكلوفوسفاميد + سيسبلائين + VM26 ) أو OPEC - D حيث يضاف الأدريناميسين للمشاركة السابقة أو المشاركة MADDOC ( الخردل الآزوتي + أدريناميسين + سيسبلائين + فنكرستين + سيكلوفوسفاميد + DTIC )

كل هذه المشاركات يمكن أن تعطي استجابة رائعة إلا أن النتيجة تبقى سيئة وخاصة عند الأطفال الكبار .

في حال وجود اصابة ضاغطة على النخاع الشوكي فإن المعالجة تكون بخزع الصفيحات ثم المعالجة الشعاعية والانذار عادةً جيد إلا أن اختلاطات المعالجة الشعاعية شديدة وخاصة تأثر نمو الطفل ولذلك يتم حديثاً اعطاء المعالجة الكيميائية ويمكن أن تكون هذه المعالجة هي البديلة عن المعالجة الشعاعية .

ثانياً : ورم ويلمز Wilm's tumor

ثاني أشيع أورام البطن عند الأطفال تحت سن الـ ١٥ سنة ولقد ساهم التطور في التقنيات الجراحية وفي المعالجة الشعاعية وادخال المشاركات الدوائية في زيادة معدل الحياة ومعدل الشفاء ( أكثر من ثلثي المرضى يتمثلون للشفاء ) ويعود هذا النجاح الرائع إلى التجارب السريرية المكثفة للدراسات الوطنية لورم ويلمز ( NWTS ) National wilm's tumor studies ثلاثة من هذه الدراسات وحالياً ينتظر انتهاء الدراسة الرابعة التي بدأت في عام ١٩٨٧ .

من الناحية النسيجية هناك ثلاثة أنواع غير مفضلة نسيجياً ( UH ) un Favorable

Histology هي Clear cell Sarcoma و Rhabdoidsarcoma والورم اللامصنع anaplastic  
يميل النوع الأول للانتقال للعظم أما النوع الثاني فيميل للانتقال للدماغ .

#### التصنيف Staging :

وسوف نستعرض تصنيف ( N . W . T . S )

- المرحلة الاولى StI : الورم محدود في الكلية ومستأصل بشكل تام - سطح المحفظة  
الكلوية سليم ولم يتمزق الورم خلال العمل الجراحي أو قبله ، لا يوجد بقايا ورمية  
بعد الاستئصال .

- المرحلة الثانية stII : الورم يمتد خارج الكلية ولكن تم استئصاله بشكل تام ( الورم  
يحتاج النسيج حول الكلية ) - الأوعية الدموية خارج الكلية مرتشحة بالورم أو حاوية  
على صمات ورمية - الورم تم خزعه قبل العمل الجراحي - لا يوجد بقايا ورمية بعد  
الاستئصال .

- المرحلة الثالثة st III : بقايا ورمية غير دموية في البطن وتشمل الحالات :  
- إصابة العقد اللمفاوية ( حول سرة الكلية - حول الأبهرة )  
أبعد من ذلك ) .

- إصابة شديدة للبريتوان بواسطة الخلايا الورمية ( تمزق الورم أثناء  
وقبل العمل الجراحي )

- انزراع الورم على سطح البريتوان  
- بقايا ورمية عيانية أو مجهرية بعد الاستئصال الجراحي ( كوجود  
إصابة مجهرية لحواف الاستئصال .

- الورم غير قابل للاستئصال لارتشاحه في الاعضاء المجاورة  
- المرحلة الرابعة : st IV : نقائل دموية بعيدة Distant Metastases ( رئة - كبد - عظام -  
دماغ ) .

- المرحلة الخامسة st V : إصابة ثنائية الجانب عند وضع التشخيص ويجب تصنيف

كل كلية على حدة .

إن المرحلة الأولى والثانية من الأنواع المفضلة نسيجياً لا تحتاج للمعالجة الشعاعية بعد العمل الجراحي وتعالج هاتين المرحلتين كيميائياً بالمشاركة ما بين الفنكرستين والاكيتنومايسين وذلك لزيادة معدل السيطرة المرضية .

- المرحلة الأولى : في الحالات المفضلة نسيجياً تعالج هذه المجموعة بالمشاركة ما بين الفنكرستين والاكيتنومايسين د لمدة ٦ أشهر المعالجة الشعاعية غير مستطبة .

- المرحلة الثانية : تمديد المعالجة المذكورة سابقاً إلى ١٥ شهر

- المرحلة الثالثة والرابعة : تعالج بمشاركة ثلاثة أدوية ( فنكرستين + أكيتنومايسين د + أدرياميسين وإن اضافة السيكلوفوسفاميد لم يغير من النتائج ورغم هذه المعالجة الشديدة إلا أن أكثر من ثلث المرضى يتعرضون للنكس .  
المعالجة للحالات غير المفضلة نسيجياً :

بالنسبة للمرحلة الأولى المعالجة هي نفسها والنتائج متشابهة مع الحالات المفضلة نسيجياً .

أما في باقي المراحل فإن الانذار يكون سيئاً لذلك يتم اضافة السيكلوفوسفاميد إلى المشاركة الثلاثية المذكورة سابقاً ( خاصة للمرحلة الثالثة والرابعة للحالات غير المفضلة نسيجياً .

الجدول التالي يلخص المعالجة الكيميائية للمراحل المختلفة وفقاً للدراسة ( NWTs )

درجة الورم	نسيجياً	النظام العلاجي
المرحلة الأولى st I	مفضل نسيجياً	فكرستين ( VCR ) اسبوعياً حتى الاسبوع العاشر ثم في اليوم الأول والخامس مع الاكتينومايسين د اكتينومايسين - ٥ ( AMD يومياً ٥ x أيام في الاسبوع صفر - ١٣ و ٢٤
المرحلة الثانية stII	مفضل نسيجياً	VCR اسبوعياً حتى الاسبوع العاشر ثم اسبوعياً ٦ x جرعات في الاسبوع ١٥ - ٢٤ - ٣٣ - ٤٢ - ٥١ AMD يومياً ٥ x أيام في الاسبوع صفر - ١٣ - ٢٢ - ٣١ - ٤٠ - ٤٩ و ٥٨ .
المرحلة الثالثة st III	مفضل نسيجياً	VCR اسبوعياً حتى الاسبوع العاشر ثم في اليوم ١ و ٥ مع AMD يومياً x ٥ أيام في الاسبوع صفر - ١٣ - ٢٦ - ٣٩ - ٥٢ و ٦٥ . أدريامايسين يومياً ٣ x أيام في الاسبوع ٦ - ١٩ - ٣٢ - ٤٥ و ٥٨
المرحلة الرابعة st IV	مفضل نسيجياً	نفس ماسبق مع اضافة السيكلوفوسفاميد في كل شوط مع AMD والأدريامايسين
المرحلة الخامسة st IV	غير مفضل نسيجياً	نفس المعالجة في المرحلة الرابعة

### ثالثاً ، الغرن العضلي المخطط Rhabdomyosarcoma

أشيع أنواع الغرن عند الأطفال واليافعان ويمكن أن يصيب الراس والعنق - خلف البريتوان Retroperitoneal - الحوض والأطراف والتظاهرات السريرية تعتمد على موقع الإصابة

لقد ساهم التعاون الكبير ما بين الاختصاصات المختلفة ( جراحة - أشعة معالجة كيميائية ) في رفع معدل الحياة خلال العقدين الماضيين من ٢٠٪ الى ٦٥٪ .  
وسائل التشخيص والتصنيف :

- ١ - الفحص السريري الدقيق لمعرفة حجم الورم ومدى انتشاره
- ٢ - الفحوص المخبرية : تعداد دم عام C . B . C - وظائف الكبد والكلية



٣ - الفحوص الشعاعية : صورة صدر بالوضعين - طبقي مبرمج C . T . scan المرنان MRI - ومضان العظام .

ونظراً لارتفاع معدل الإصابة للعقد اللمفاوية فإنه يجب تحري هذه العقد بالوسائل المختلفة ويجب أخذ عينات منها أثناء العمل الجراحي  
إن موقع الإصابة ضروري لتحديد الانذار فأفات الحجاج تحمل انذاراً أفضل بينما الآفات المتوضعة خلف البريتوان والحوض والأطراف تحمل انذاراً سيئاً .  
التصنيف staging

وسوف نستعرض تصنيف intergroup Rhabdo Myosarcoma study I . R . S  
المجموعة الأولى Group I : الورم موضع - قابل للاستئصال التام ( العقد اللمفاوية سليمة ) .

الورم محدود بالعضو المصاب أو العضلات أو منشأ الإصابة .  
المجموعة الثانية Group II : - الورم مستأصل بشكل تام مع بقايا مجهرية - لا يوجد إصابة للعقد اللمفاوية الناحية Regional Lymph Nodes  
- الورم ينتشر للأعضاء المجاورة أو للعقد اللمفاوية ولكن يستأصل بشكل تام دون بقايا ورمية مجهرية .

- الورم كما في السابق ولكن يوجد بقايا مجهرية بعد الاستئصال الجراحي  
المجموعة الثالثة Group III : استئصال غير تام للورم - أو أن الورم لا يستأصل ولكن يؤخذ منه خزعة فقط .

المجموعة الرابعة Group IV : نقائل بعيدة ( رئة - كبد - عظام ، نقي العظم - دماغ )  
المعالجة الكيميائية :

وتعطى في كل المراحل ولكافة الأنواع النسيجية مع تكثيف المعالجة للحالات ذات الانذار السيء ويتم حديثاً استخدام عدة أدوية منها : الفنكرستين - السيكلوفوسفاميد - cyclophosphamide - الأدريناميسين - الأكييتينومايسين د -

السيسلاتين - Etoposide ( VP16 ) وتعطى هذه الأدوية بمشاركات مختلفة .

- المجموعة الأولى GI : تعالج بعد العمل الجراحي بالمشاركة ما بين الفنكرستين (VCR) والأكتينومايسين بـ ( AMD ) وإضافة المعالجة الشعاعية لتغير من النتائج

- المجموعة الثانية GII : وتشارك المعالجة الشعاعية مع المشاركة المذكورة سابقاً ولكن تعطى هذه المشاركة لمدة سنة في هذه الحالة ومعدل الحياة بدون نكس لمدة سنتين يصل حتى ٨٠٪ .

- المجموعة الثالثة والرابعة : المعالجة تكون مكثفة وبالمشاركة VAC ( فنكرستين + أكتينومايسين د + سيكلوفوسفاميد ) أو بإعطاء الادرياميسين بالتناوب مع المشاركة VAC . والجدول التالي يبين المعالجة الكيميائية للمراحل المختلفة حسب الدراسة الثانية للـ IRS

التصنيف staging	المعالجة treatment
المجموعة الأولى GI	فنكرستين VCR ٢ مغ/م <sup>٢</sup> أسبوعياً × ١٢ جرعة تبدأ من الأسبوع صفر أكتينومايسين د AMD ٠.٠١٥ مغ/كغ يومياً × ٣ أيام في الأسابيع صفر - ١٢ - ٢٤ - ٣٦ و ٤٨
المجموعة الثانية GI	VCR ٢ مغ/م <sup>٢</sup> أسبوعياً × ٦ أسابيع في الأسابيع ٣ - ١٢ - ٢١ - ٣٠ و ٣٩ AMD ٠.٠١٥ مغ/كغ يومياً × ٥ أيام في الأسابيع صفر - ٩ - ١٨ - ٢٧ - ٣٦ و ٤٥
المجموعة الثالثة والرابعة GIII - 6 IV	VCR ٢ مغ/م <sup>٢</sup> أسبوعياً × ١٢ جرعة تبدأ من الأسبوع صفر والمشاركة VAC في الأسابيع صفر و ١٢ ثم كل ٤ أسابيع لمدة ٢ سنة أو ADR - VAC ( AdR أدرياميسين ) في الأسبوع صفر و ١٢ ثم VAC بالتناوب مع AdR - VAC كل ٤ أسابيع كل ٤ أسابيع لمدة سنة
مجموعة أولى وثانية مع إصابة الاطراف من نوع alveolar	VAC كما في المجموعة الثالثة والرابعة
إصابة حول السحايا Parameningeal	VAC أو AdR - VAC كما في المجموعة الثالثة والرابعة + معالجة شعاعية للقفص + حقن الأدوية الكيميائية داخل السحايا

### بعض الحالات الخاصة :

في المجموعة الأولى والثانية في اصابات الأطراف وإذا كان النوع النسيجي alveolar ( السنخي ) الانذار في هذه الحالة يختلف عن باقي الحالات من نفس الدرجة لذلك تعالج باعطاء المشاركة VAC لمدة ستين ( معدل الحياة بدون نكس ارتفع من ٤٣٪ الى ٦٩٪ ) .

- الإصابة المجاورة للسحايا Parameningeal Primaries ( بلعوم أنفي - الجيوب الأنفية - الأنف Nasal cavity - الأذن الوسطى - الخشاء pterygopalatine في هذه الحالة يشمع القحف وقائياً ويعطى الميثوتركسات + هيدروكورتزون + سيتارابين arac حقناً داخل السيساء وانخفضت اصابة السحايا بهذه الوسائل الى ٦٠٪ .

في حال وجود اصابة السحايا تعطى المعالجة داخل السيساء لمدة سنتين بالرغم من هذه التحسن في معدل الحياة عند الأطفال المصابين بالغرن العضلي المخطط إلا أن نتائج المعالجة للحالات غير المفضلة نسيجياً لاتزال غير مرضية .

بالنسبة لدور السيسبلاتين والـ VP16 والـ Diac فلايزال قيد الدراسة المكثفة وهناك نتائج تبشر بالأمل لدواء الافوسفاميد ifosfamide وبالنسبة للجرعة العالية من الميثوتركسات مع زرع نقي العظم .

#### رابعاً - ورم الأورمة الشبكية Retinoblastoma

أشيع أورام داخل المقلة الخبيثة عند الأطفال وإن تأثير الوراثة القوي وارتفاع معدل حدوث ورم خبيث ثاني عند المصابين يكسب هذا الورم أهمية خاصة .  
في حال وجود قصة عائلية أو في حال كون الإصابة ثنائية الجانب فيام نسبة إصابة أبناء هؤلاء المرضى تصل الى ٥٠ ٪ .

إن التحسن الكبير لنتائج المعالجات الحديثة التي تشمل اقراغ الحجاج - التخثير الضوئي Photocoagulation أو الـ Cryotherapy يجعل من الصعب تحديد دور المعالجة الكيميائية وهناك دراسات سريرية قليلة تقيم دور المعالجة الكيميائية عند كون المرض منتشرأ أو عند كون الورم خارج المقلة إلا أن عدم وجود نظام تصنيف Staging يجعل تقيم نتائج المعالجة صعبأ .

تشير عدة تقارير على أن الورم حساس للمعالجة الكيميائية وأكثر الأدوية فعالية هو السيكلوفوسفاميد وشبيهه الإفوسفاميد ومن الأدوية الأخرى نذكر الأدريامايسين - VP16 - VM26 والسيسبلاتين .

- عند وجود إصابة للسحايا فإن المريض يجب أن يعالج بالحقن داخل السيساء وتشعيم القحف ويمكن اعطاء الميثوتركسات + السيترابين + هيدروكورتيزون حقناً بالسيساء.



## المراجع الأجنبية

The chemotherapy Source book « Michael C. perry » 1992 .

- pediatric Hematologic oncology 1986 .

- Cencer 1985

- clinical Obstet Cynecology 1984.

- Text book of Radio theraoy ( walter and Miller ) 1994.

- Scientific basis of chemotherapy perry Mc 1991

\_ Cancer chemo therapy 1975

\_ Radio ther oncol . 1989 .

\_ cancer chemotherapy and pharm acology 1987 .

\_ chemo Radio therapy for squamous cell head and Neck  
cancer 1989.

\_ Blood 1989

\_ clinical onclogy pro AM soc . 1989

\_ ann internal Medincine 1988.

# المراجع

الصفحة	الموضوع
٥	- الأسس العلمية للمعالجة الكيميائية
١٧	- مبادئ علم الأورام والخراجات الدوائية
٣٧	- المعالجة الكيميائية المتممة أو الداعمة
٤٧	- المعالجة الكيميائية بالمشاركة
٦١	- المشاركة ما بين المعالجة الشعاعية والمعالجة الكيميائية
٦٩	- مبادئ المعالجة المناعية - معدلات الاستجابة الحيوية
٧٩	- الأدوية المستخدمة في المعالجة الكيميائية
٩٧	- الصادات المضادة للأورام
١١٧	- القلويدات
١٣١	- مجموعة انتروسيوريا
١٣٥	- الأنظمة ومركبات أخرى
١٤٥	- الأدوية الهرمونية في معالجة السرطان
١٥٧	- الأنظمة العلاجية في المشاركة الكيميائية
١٩٣	- المعالجة الكيميائية للميلانوم
١٩٧	- المعالجة الكيميائية لأورام الدماغ
٢٠٧	- سرطان الرأس والعنق
٢١٣	- المعالجة الكيميائية لسرطان الرئة

- ٢٢٥ - المعالجة الكيميائية لسرطان الثدي
- ٢٣٩ - المعالجة الكيميائية لسرطانات الجهاز الهضمي
- ٢٤٧ - المعالجة الكيميائية لأورام الغدد الصم
- ٢٥١ - المعالجة الكيميائية لسرطانات الجهاز البولي والتناسلي
- ٢٦٩ - المعالجة الكيميائية لأورام الأعضاء التناسلية عند الإناث
- ٢٨٧ - أورام العظم والنسج الرخوة
- ٢٩٩ - المعالجة الكيميائية لأمراض الدم الخبيثة
- ٣٢٣ - الأورام الصلبة عند الأطفال

# Cancer Chemotherapy

by :

Dr . M . AL shekhyousef

Radiation oncologist

Nuclear Medicine centre - Damas

## هذا الكتاب

يحتوي هذا الكتاب على دراسة علمية مفصلة عن الأمراض السرطانية ، وطرق تشخيصها بدءاً من المراحل المبكرة للإصابة ، والتدخل الجراحي لتجنب الانتشارات .

كما يحتوي الكتاب على مواد غنية لمعالجة الأورام بالأدوية الكيميائية المختلفة ، إذ يبين المؤلف الطرق العلمية التي تخصص للمريض في مختلف مراحل إصابته حسب برامج محددة .

- الكتاب مفيد لأوساط واسعة من المتخصصين في أمراض الدم ومعالجة الأورام ، وكذلك للطلاب الدارسين في كليات ومعاهد الطب .

الناشر



يطلب الكتاب على العنوان التالي :

دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة

دمشق ص.ب : ٣٠٥٩٨

هاتف : ٢٣١٧١٥٨ - ٥٦١٧٠٧١

تلكس : ٤١٢٥٤٥ - فاكس : ٢٣١٧١٥٩